

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1786/A/1







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1786/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1786/A/1







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1786/A/1


1786  
A/1  
L













55450

PEDANIA  
DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE

MEDICA MATERIA

LIBRI SEX,


Ioannē RVELLIO Sueſſionenſi  
interprete.

HIS ACCESSIT, PRÆTER  
*Pharmacorum simplicium catalogum,  
copiosus omnium ferme medela-  
rum siue curationum  
Index.*



LVGDVNI,  
Apud Ioannem Frellonium.

1547





NAENIA IN OBITU  
RVELLII.

Cesserat è viuis ad celsa Ruellius astra,  
Constitit atq; alii clarus in arce patris:  
Cum perisset hominē rata Mors, ait, Ecce triumphe  
Clamet io, cuius victima grata cadit.  
Vicimus, en nostras toties qui eluserat artes,  
Qui toties mortem vicerat, interijt.  
Ast ubi in ore virū versari auditq; videtq;  
Hunc magis atq; magis viuere, victa fremit.  
Cui Pæa, quibus ortus erat mihi redditur astra,  
Quemq; putas victum, bina trophæa refert.  
Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:  
Altera, quod moriens nunc quoq; mille rapit:  
Nempe Dioscoride Romana per oppida ducto,  
Cui toga, cui potior lingua Latina, sua est.  
Cætera quid memorem victuri scripta laboris,  
Naturam & stirpes, pharmacaq; omne genus?  
Non villas, nec equos, nec curam diuitis agri,  
Nullaq; vitæ hominis commoda præterijt,  
Quæ non tractarit, sapientibus edita Græis,  
Quæ non reddiderit, vel meliora suis.  
Vtq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis  
A mille haud quisquam tanti opus ingenij.



*EPITAPHIVM*  
*Ioannis Ruellij, Diony-*  
*sio Corronio au-*  
*thore.*

*Hic situs est, in quo vixit medicina, Ruellus:*  
*In quo naturæ notitia, atque poli.*  
*In quo prima fuit dos, Graiū vertere scripta*  
*In Latium, ac Latio scribere digna Ioue.*  
*Olim erat affinis, nunc est conuiua deorum,*  
*Præmiâque illa sui grata laboris habet.*

PEDANIE  
**DIOSCORIDIS**  
**ANAZARBEI, DE**  
*Medicinali materia, libri*  
*primi præfatio,*  
**Ioanne RVELLIO Sueßionensi**  
*interprete.*



Vanquam, amicissime Aree, com-  
plures non veterum modò, sed  
recentiorum quoque, de medi-  
camentorum compositione, viri-  
bus, atque probatione commenta-  
ti sunt: nobis tamen nec vanum, nec à ratione ab-  
horrètem impetum animi ad hoc opus incessisse,  
tibi ostendere tentabimus: quòd eorum nonnulli  
absolutum nihil ediderunt, alij quàm plurima,  
quæ auditu percunètando didicerant, scriptis tra-  
diderunt. Siquidem Bithynus Iolas & Heracli-  
des Tarentinus, omissa prorsus herbarum tra-  
datione, rem sanè quàm paucis perstrinxerunt.  
Neque verò omnes illi de metallicis quicquã re-  
bus aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Cra-  
teus autem herbarius, & Andreas medicus,  
qui cæteris diligentius hac in parte versati viden-  
tur, radices multas apprimè vtileis, herbásque  
haud quaquam adnotatas, reliquerunt. Verumta-



men priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiade omnes, medicinalem materiam vernaculam cognitamque vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & ut medicamentorum vires probationesque cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani verò reddendarum causarum studio verba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemque controversiarum extulerunt. Siquidem, qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascentis in Italia, chamæleæ succum esse contendit: androsæmonq; eadem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloen in Iudæa fossilem nasci, & pleraque his similia exponit, reclamante euentia, quæ prorsus veritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine idem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes nullaq; cognatione coniunctis vireis collidentes: par-

Dioscoridis tim per elementa literarū scripta in ordinem dig-  
cognoscentes, quò facilius memoria mandarentur, ge-  
dorum sim nera & eorum effectus à sua cognatione disim-  
plicium stugentes. Nos verò ab iuuentute, ut ita dicam, iunen-  
dum. ta, iungi desiderio cognoscendæ materiæ allecli,  
perinul



permultis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem vitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum, quo nos prosequeris, affectum. Etenim natura cum in omnis eruditione excultos, tum verò in eos quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquantò peculiaris. Enimvero non parum praebebat tuae probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singulari erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes novimus, cum mutuam inter vos benevolentiam emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosque, qui in hosce commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima visu ipsi exactissime cognovimus: quaedam etiam ex ea, de qua inter omnes concucit, historia, percunctationeque rerum apud singulos vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine tradito, genera medicinarum viresque describantur. Quòd autem necessaria sit medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret: quòd ea & toti arti coniuncta sit, universisq; eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atque mixturas, & facta in morbis pericula extendi, & incre-



mentum capessere potest, quàm plurimum conferente singulorum medicaminũ cognitione. Quin etiam vernaculam familiaremq; materiam complectemur, ut perfecta sit quæ à nobis relinquetur doctrina. Verum in primis curã impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recondantur. certè pro horum ratione aut valent viribus, aut evanido nullòque munere funguntur. Serena igitur cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si vel squalores vel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & ventis exposita sint & perflata, frigidaque & aquis carentia: in his enim locis vires eorum longè validiores intelligimur. Contrà, quæ in campestribus, riguis, & opacis, ceterisq; locis à vento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus viribus valent: multoq; magis, si non suo tempore nec opportunè colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandum, sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius aut serius adolescere. Nonnulla propria vi, hyeme florent, & filia pariunt: quædam bis annis, ut non florifera. Quare cui in animo est horum per exactè cognitionem assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis & senescentibus omni tempore adesse. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat adspiceret, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem

nos



noscet. Quo sit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli, qui olim has rerum varietates non perspexerunt, magno in errore versentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, verbi gratia, gramen, quinquefolium, & tusilaginem emittere florem, fructum & caulem negant. Ergo qui saepius ad visendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum, inquam, & candidum multis educere annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae vero fruticosa sunt, sicut stoechas, trixago, polium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine praegnantia demetantur. Flores quoque antea, quam sponte sua decidant. Fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lacryma excipiantur, inciso per summum adulescentiae vigorem caule. Radices, & lingua menta, corticesve ut recondantur, eximere conuenit cum herbae suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatae inibi, locus asperginem non redolentibus: sed quae luto aut puluere sunt obsitae, aqua elui debent. Flores & omnia quae incundum



odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obdu-  
ctis, reponantur. Nonnunquam charta aut folys se-  
mina, ut perennent, aptè involuuntur. Liquidis  
medicaminibus densior materia, argentea, vitrea  
aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara  
non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è bu-  
xo: sed ænea vasa ocularijs medicamentis liqui-  
disq; & omnibus ijs, quæ aceto, piceliquida, aut  
cedria componuntur. Adipem autem & medullas  
stagnæ vasis recondi conuenit.

## Iris.

## CAP. I.



**I**RIS à cœlestis arcus simili-  
tudine nomen accepit. Folia ferè  
gladioli, sed maiora, latiora,  
& pinguiora. Flores in caule  
equalibus inter se spatijs di-  
stant, incurui, varij: siquidem candidi, pallen-  
tes, \* μίλινα, tes, \* lutei, purpurei, aut cœrulei conspiciun-  
tur: non μέλα= tur: quæ diuersi coloris specie, quædam cœlestis  
va. arcus imago representari videtur. Radices subia-  
\* ἑπεία, id cent geniculatæ, \* duræ, odoratæ: quæ frustatim  
est, solida. dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino re-  
conduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: &  
\* Τῆ γούσῃ inter has laudatissima, quæ pumila ferè & den-  
πυρρίρα, sa constat radice, fragentis contumax, subrufo  
id est, gu= colore, \* gustu amaro, odore perquàm sincero, ita  
stu feruen= ut nullum prorsus situm redoleat: quæ dum tun-  
uore. ditur, sternutamenta mouet. Secundum locum ha-  
bet



bet Africana, candicans. gustuq; amara. Teredines in vetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excelsa, extenuas, contra tussim efficax: humorum qui agrè reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epota purgant, somnum conciliant, lacrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem pota ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex vino pota pellunt. Decoctum earum, feminarum fotibus vtiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis venarum spiracula: ischiadicis infunditur, fistulas, ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ, strumæ, vetresq; durities emolliunt. Siccæ quoq; vlceræ replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna vtilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie à sole contracta emaculat: pestus, malagmatis, & acopis inseruntur. In vniuersum, magni ad omnia usus.

## ANNOTATIO.

Censetur Galanga officinarum. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam vulgus herbariorum hoc nomine solet indicare.

Aco



## ACORUM. CAP. II.

**A**corum folia iridis habet, angustiora tamē:  
radices non dissimiles, complicatas, non in  
rectum sed obliquum actas, & summo capite  
sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu a-  
cres, odore non ingratas. Optimum est densum,  
candidum, plenum, carie non exesum, odoratum,  
cuiusmodi Colechidicum & Galaticum, quod  
aspletion dicunt. Radici vis calfactoria. Deco-  
ctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus,  
& iocineris atque thoracis: item torminibus, vul-  
sis, ruptis: lienem absomit, urinae stillicidio & ser-  
pentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad mulie-  
bres affectus iridis modo utiliter imponitur, ocu-

\* Plinius lorum caligines succo discutit, antidoti radix ma-  
aniso ha= gno vsu commiscetur.

bet: ac sic e=

Meum.

CAP. III.

riā Marcel= **M**eon, quod Athamanticum vocant, in Ma-  
lo in cōmēt. Mcedonia & Hispania plurimum gignitur,  
teste, Graci \* anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. bi-  
quidam ve nūm ferme cubitorum altitudine attollitur, spar-  
tustissimi sis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenui-  
codices, quæ bus, odoratis, linguam excalfaciuntibus. Quæ fer-  
diuersitas uestiæ ex aqua, vel trita citra coctionem, præ-  
facit, ut qua clusorum renū vesicæq; farta vitia potu leniunt,  
lis herba sit urinae difficultati medentur, stomachi inflationes  
Meon, non discutunt. Torminibus, affectæ vuluæ, articulo-  
facile quis rum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trita  
coniecerit. cum melle in eclegmate auxiliantur, sanguinem  
per



per menstrua pellunt, de sectionibus ferue facta: infantibus autem illis & imo ventri, urinas mouent: quod si plus quàm deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Cypirus. CAP. IIII.

**C**Ypirus, quem aliqui erysiceptrum, ut aspalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est vsus, coherentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotunda, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis enascitur. Optima est grauiissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia incundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis inest. Venarum spiracula laxat, urinam ciet, ad calculos aquamq; subter cutem utilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est, perfrictionibus vuluæ & præclusionibus fotu prodest, pellit menses. Contra ulcera oris etiam si depascent rorentq; , farina eius efficax est. Malagmati calfacientibus, & vnguentorum spissamentis bene adijci solet. Aliud cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illud præsentem psilotri vim exhibet.

Card



## Cardamomum.

## CAP. V.

**C**ardamomum optimum est, quod ex Coma-  
gene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur: in In-  
dia quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet ple-  
num, frangenti contumax, occlusum, fæctumque  
(quod enim huiusmodi non est, exoletum iudica-  
tur) & gustu acre, subamarum, & odore caput  
tentans. Excalfactoriam vim habet, potumque ex  
aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruo-  
rum resolutionem. Item ad rupta, valsa, tormina:  
lata ventris tineas excutit. Ex vino autem po-  
tum, renibus, difficultati vrinae, à scorpione ictis,  
neque non omnibus venenum vibrantibus, auxi-  
lio est. Cum cortice radice lauri epota drachma  
calculos cõminuit, partus suffitu enecat, scabiem  
ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum spiss-  
samenta additur.

## Nardum.

## CAP. VI.

**D**vo nardi genera: vnum Indicum, alterum  
Syriacum appellatur, non quod in Syria  
proueniat, sed quod montis, in quo oritur, pars  
vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex  
hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue,  
largam gerens comam, flauum colore, perquam  
odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, ama-  
ro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odo-  
ris gratia permanear. Ex Indici autem nar-  
dum quoddam Gangitis vocatur, à fluuio Gange,  
apud quem enascitur, montem præterfluente: quod  
gen



genus ob multam loci, in quo prodit, viginem, viribus infirmius est, atque procerius adolescit, plures ferens spicas ab vnica radice comosus, vnâque conuolutas, ac grauitè olemes. Montanum autem odoratiùs, spica breui ac mutila, odore cypero vicino, ceteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum virus supermodum redolente: quod improbat. Madefactum vendi solet: quod vitium ex eo deprehenditur, quòd candida sit spica, & squalida, \* *ἡγεῖται μὲν* puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua, aut *ἡ χερὶ τὸν* palmeo vino, inspissationis ponderisq; causa *ἡ χυμὸς*, idrato. Intueri autem oportet siluum radicibus inest, & quod sideas, & incerniculo puluerem excutere, eluenatua cadis manibus vtilem. Vim habent excelsioriam, reat lanugi & exiccantem. Vrinam mouent, aluum potius siue. stunt, vuluæ profluvia, sanienque apposita supprimunt. Nausea ex aqua frigida auxiliatur, & Stomachi rofionibus, inflationi, iocineri, regio morbo, renum vitijs. Aquæ autem incoctæ solæ ad infessum, vuluæ inflammationibus medentur: ad glabras oculorum genas valent: siquidem eas ad densiorem pilum reduciunt. persusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & infetili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

Nard



## Nardum Celticum. CAP. VII.

**C**elticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, saluunca patrio nomine appellatum, prouenitque in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suauitas: unde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra pauito solo atque humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem utile, cum aceroso, alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate. sed facilis cognitio: namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, uti verum nardum est. Itaque radices, atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, assernari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absynthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

Morr



## Montanum nardum. CAP. VIII.

**M**ontanum nardum, quod ab aliquibus thymolacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, surculo & folijs eryngio similibus, minoribus, minime tamen spinosis, asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulae regiae, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Ad eadem, ad quæ Celticum, efficax.

## ANNOTATIO.

\*Minoribus. ] Fuchsius in opere de Stirp. maioribus legendum suspicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus est, mollioribus habet quod sanè vtrunque herbae, quàm aptissimè quadrat.

\*Cytino hyoscyami. ] Id est, flori hyoscyami, qui veri cytini, quem domesticæ punicae florem esse nouimus, aliquam exprimit effigiem, vt in eius descriptione author est Dioscorides.

## Asarum. CAP. IX.

**A**sarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hederæ folijs \*minoribus multò, & humidioribusq;, floribus\* cytino hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. [Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in & molles] radices numerosas, geniculatas, te Græco.

nues, obliquus, gramine non dissimiles, longè  
tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, &  
quæ linguam vehementer mordent. Excalfacto-  
riam vim habet: urinam cit, hydropicus & vetu-  
sto coxendicum dolori prodest. Radices sensu dra-  
chmis ex aqua mulsâ pot. e, menses trahit, & vera-  
tri albi modo purgant. In vnguenta adlitur. Vm-  
brosis montibus provenit, sed plurimum in Ponto,  
Phrygia, Illyrico, & Italia Iustinienst agro.

## ANNOTATIO.

\* Maioribus] Rectius fortè minoribus le-  
gas, ut Ruellius quoque monuit. Flores siqui-  
dem Valerianæ nunc dictæ, quam Phu esse  
omnes ferè suspicantur, Narcissum effigie  
expressissimè quidem referunt, eo tamen lon-  
gè sunt minores: ni fortè soli diuersitati id im-  
putandum censeas.

## Phu. CAP. X.

\* Hippose-  
lini. **P**HU, quod & aliqui syluestre nardum appella-  
nt, nascitur in Ponto, folio \* olusatris, aut elæ-  
phobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo,  
molli, in purpuram vergente, geniculis interce-  
pto, floribus narcissi proximis, \* maioribus, tene-  
rioribus, & ex albicante purpureis: radice supe-  
rius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo  
villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum:  
capillamentis inuicem contextis, flavescentibus,  
odoratis, cum quadam odoris gravitate nardum  
am.



amulantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potui detur. Delectum eadem prestare potest. ad lateris etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur quoniam hac dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

Malabathrum. CAP. XI.

**M**alabathrum arbitramur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum plu, asarum, nirus. secus autem res se habet. Nanque malabathrum folium sui generis est, quod Indice gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuietur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis aestiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in sua vi odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirum verò & minutim contusum, praesertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Easdem nardo sortitur vires, sed efficacius omnia praestat. Urinam vehementius citet, ac stomacho magis prodest malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusque tritum & in vino feruesfactum commodè illinitur: subditum linguae, oris halitum & suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum



seruat, & ab erosione tuetur.

ANNOTATIO.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Cassia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & aliis veteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Cassia. CAP. XII.

**C**assia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fulvescens, \*μῆλα ποτ pulchri coloris, coralli æmula, perquam angusta, Añs. i. cum longa, crassa, & fistulosa, gustum mordens & \*cum multo. aliquanto feruore adstringens, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis, achy appellatur, ab Alexadria negotiatoribus, daphniis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta.

\*Græcus Tertia, cui Museletico blasto, id est germini, cognomen est. Reliquæ viles, & quæ \*aphemum dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca, & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quàm ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, levis, surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candicans, sca

scabra, hircinum virus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra viperarum ictus potius auxiliatur, aduersus intestinas inflammationes omnes & renum vitia, potius proficit. Fœminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem vuluæ. Ea duplo pondere medicamenti mista, cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis.

## Cinnamomum. CAP. XIII.

**C**innamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, minus, ex vinoso in cinereum vergens, laue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens, Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cū optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadantenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, lauibz tamen internodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscel-



lanea quaedam esse videntur. Quæ autem melius  
 spirant, suo halitu cum nares primum consulun-  
 tur, olfactum expleant, deterioris dignotionem  
 impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumi-  
 lum, fulvescens admodum. Tertium à Mosylli-  
 co, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum,  
 paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fun-  
 gosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac fri-  
 abile, magnam habens radicem, quæ cassiam pla-  
 nè repræsentat. Quintum genus, odore nares fe-  
 riens, subrusum & cortice fulvæ cassiæ simile,  
 tangenti firmum, minus nervosum, densa radice  
 firmatum. His quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amo-  
 mi odorem spirant, minus suavitatis inest. Deli-  
 cito scabrum, album, rugosum: at læue, & ligno-  
 sum circa radicem, ut inutile reijcito. Est etiam  
 num simile aliud, cui pseudocinnamomo cognō-  
 men est, vile, invalidi odoris, solutarumq; virium.  
 Vocatur etiam zingiber, cum tamen sit xylocin-  
 nomum, præbens quandam cinnamomi faciem.  
 Est autem lignosum cinnamomum, sarmenta lon-  
 ga robustaque ferens, odore longè cinnamomo in-  
 seriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnamo-  
 mo genere differre dicant, quod à natura eius ab-  
 horreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit,  
 & concoquit, urinam ciet: tam menses, quàm par-  
 tus potum aut ex myrrha impositum pellit, con-  
 tra bestias, quæ virus ei aculantur, venenaq; con-  
 venit: caliginem pupillis oculorum obuersantem  
 discut



discutit, crassitiem extenuat, lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renum vitia, & urinæ difficultatem efficax est, vnguentis pretiosis inferi solet. & in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, vmbraque siccatur, quò diutius eduret, reconditur.

[Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui Desunt in pseudocinnamomum appellant, perquam denso Græco, atque crasso sarmento, longè tamen inualidius cinnamomo, & odore, & gustu.]

## Amomum. CAP. XIII.

**A**momum exigue fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modum, flore, ceu candidæ violæ, paruo: folijs \* vitis albæ similibus. \* bryoniæ. Laudatur quam maximè Armeniacum, \* fuluo \* χρυσοῖον auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Mediæ τῆς χροῖας, id cum, quoniam in campestribus, & aquis enascitur, colore scitur, infirmius esse constat. Est autem maior aurum imitatum, subuiride, tactu tenerum, frutice venoso, tans. odore origani. Ponticum verò subrusum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum vel subrubrum, quod nec adstrictum cohereat, nec conuoluatur, sed solum diffundatur: seminis plenum, vuis paruis simile, graue, valde odoratum, modò cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non exariente. Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi. Somnum al-



licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitq;: iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum, viscerumque lenit ex rina passa, ad vuluarum vitia in pessus, aut in seffionibus vtile est. Decoctum iocineri, renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis vnguentis. Adulteratur amomum herba simili, quæ amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nasctur in Armenia flore origani. Quare in huiusce modi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab vna radice integros surculos emittunt.

Costus. CAP. XV.

**P**racellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber, vt ferula niger. Teratius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excalfactoria, urinã ciet, menses pellit, vitis, quæ vuluam malè habent, tam impositu quàm fôtu & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq;: ex vino & absinthio: venerem ex mulso stimulat, latas ventris tinas ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrinus



rium accessiones, & neruorum resolutionibus blinuntur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus emēdat. Additur in antidota & malagma. Sunt qui admistis helenij comageni præduris radicibus, adulterent, quod deprehensu facile est: siquidem neq; gustu feruet helenium, neque validum odorem vibrat, vt caput tentare possit.

Odoratus iuncus. CAP. XVI.

**O**doratus iuncus, in Africa & Arabia nascitur. Officinis scitur. Laudatissimus ex Nabathea, proximus squinantiū. Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij techitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando roseæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguā. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Vim vrinæ ciundæ habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijciētibz, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum miscetur antidotis. Radix adstringentior est, ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma vna cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad deficiēdium fetus, vtile est.

Calamus odoratus. CAP. XVII.

**C**alamus odoratus in India nascitur: melior est fuluus, dense geniculatus, & qui



assulse frangitur, plena araneorum fistula, albi-  
cans, lenius in mandendo, & adstringens, ac cum  
aliquanta acrimonia amarus. Vrinam potu ciet:  
quare cum graminis aut apij semine coctus, in a-  
qua subter cutem fusa morbo, renum vitij stilli-  
cidio vrinae, ruptusq; commodè bibitur: menses &  
potu & appositu pellit, in si suffitu medetur per  
se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundi-  
nem fumo: ad muliebres infessus decoquitur, &  
clysteribus imponitur. Suffusionibus, malagma-  
tisq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum. CAP. XVIIII.

\* Marcello **B**alsamum, arbor \* albae violae, lycij, siue  
locus hic su **B**pyracanthae magnitudine conspicitur. Fo-  
spectus. lium rutae proximum longe candidius, perpetuo  
virens: in Iudaea solum quadam valle & Aegy-  
pto nascens, his differens modis: scabritia, proceri-  
tate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea  
coma est, theristum vocant, quasi demessile: for-  
tassis quoniam ob gracilitatem facile demeta-  
tur. Aestius sub ortu Canis ardoribus, arbor un-  
guibus ferreæ inciditur, manâtque è plaga suc-  
cus, quem Opobalsamum vocant: sed iam exiguo  
stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quin-  
seni septemve congruuntur, inibiq; pondus du-  
plo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit  
recens, validi odoris, sincerus, non ad acorem  
vergens, dilui facili, lenis, adstringens, ac modi-  
cè mordens gustu. Sed variè vitatur, misto ab  
aliq



quibus terebinthi, cypri, lentisci, balani m-  
mento: item susino, metopio, melle, aut Cypria  
raliquida. quod maleficium facile deprehen-  
tur. Nanque merus in laneam vestem fusus,  
que maculam facit, neque si eluatur notam re-  
quirit: vitiatum autem inhaeret, & lac instilla-  
us coagulat, quod adulteratus non efficit. Quin-  
tiã syncerus in aqua aut lacte celerrimè liqua-  
ur, coloreq; lactescit: vitiatum verò dei modo in-  
atatur, se conuoluens, aut in stelle modum diffundens.  
syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur.  
Hallucinatur, qui aqua concretum pessum ire, et ad  
ima fidere arbitrantur, postea dissipatum superna-  
rare. E ligni genere, quod xylobalsamum vocant,  
probatum recens, sarmento tenui, folium odoratum,  
quadamtenus opobalsamum spirans. Necessarius  
etiam seminis erumpit usus, quare eligatur fla-  
uum, plenum, grande, ponderosum, mordens gu-  
stu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens.  
Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra  
oppido desertur. Sed coarguitur magnitudine,  
inanitate, virium ignauia, sapore piperis. Effi-  
cacissima vis inest succo, & quam maximè cal-  
faciens: abstergit quæ tenebras oculorum pupil-  
lis offundunt, medetur persictionibus vuluæ cum  
rosaceo cerato appositus: menses quoque, secun-  
das & parius extrahit, horrores illitu discutit,  
ulcera sordida expurgat & cruda concoquit, vri-  
nam potu ciet, agrè spirantibus prodest: datur  
in



in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium  
ictus: miscetur acopis, malagmati, & antidotis.  
In summa, præcipua auctoritas succo, secunda se-  
mini, minima ligno. Semen commodè potui datur  
doloribus lateris, pulmonum vitis, tussi, ischiadi-  
cis, comitialibus, vertiginosis, orihopnoicis, vrina  
difficultati, torminibus ac serpentum moribus:  
ad muliebres suffitus perquam utile est: vulnam  
aperit in desensionibus balnearum decoctum, &  
humorem euocat. Lignum easdem habet vires,  
aliquantò minores. Ex aqua potum cruditatibus,  
torminosis, vulsis, venenatorum ictibus opitula-  
tur, vrinam cit, ad capitis vulnera cum sicca iri  
conuenit, squammas ossium extrahit, & ad vn-  
guentorum spissamenta additur.

Aspalathus.

CAP. XIX.

<sup>\* ξυλῶδης</sup> **A**spalathus, alijs erysiceptron, frutex est  
id est, ligno in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula:  
<sup>sus.</sup> quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij  
vuntur. Optimus est grauis, detracto cortice  
rubens, aut in purpuram vergens, densus, odora-  
tus, gustatu amarus. Est & alterum genus can-  
didum, lignosum, sine odore: quod deterius habe-  
tur. Vim calfaciendi cum adstrictione obtinet.  
vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera col-  
luenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordi-  
da vlcera infunditur, subiectum in pessa, partum  
extrahit, aluum sistit eius decoctum: & sangui-  
nis



reiectionem potu colibet, vrinæ difficultatem  
flationesq; discutit.

Muscus.

CAP. XX.

**B**Ryon, id est muscus, à quibusdam splachnon  
appellatur: in cedro arbore, populo alba, &  
quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proxi-  
mum populneum: in quo genere candidum &  
doratius præstat, nigricans improbatur. Adstrin-  
gendi vim habet. Decoctum insidentium vuluis  
utile: vnguento balanino, oleusq; inspissandi gra-  
tia inseritur: thymiamatum, acoporumq; compo-  
sitionibus conueniens.

Agallochum.

CAP. XXI.

**A**Gallochum, lignum est, quod ex India atq; Putatur li-  
Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, ma-  
gnum aloës  
culatum, odoratum, gustu adstringens, cum qua-  
dam amaritudine, cute verius quam cortice vesti-  
tur, aliquantulum versicolore. Manditur, aut de-  
cocto os colluitur, commendandi halitus gratia.  
Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure ad-  
suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ  
vnius pondere, humida stomachi vitia, & imbe-  
cillitatē, feruoremq; mulcet: si lateris, iocinerisve  
dolor excruciat, si dysenterię, aut tormina infe-  
stant, ex aqua bibere prodest.

Narcaphthum.

CAP. XXII.

**N**Arcaphthum ex India defertur, cortico-  
sum, simile sycomori libro: quod iucundi odo-  
ris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis com-  
pos



positis : constrictiōibus vuluæ suffitu prodest.

Cancamum. CAP. XXIII.

Videtur **C** Ancamum Arabici ligni lacryma est, myr-  
quibusdam. **C** rhæ quodammodo similis, virosi gustus.  
Lacca offi- quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, additu  
cinarum. **S**tyrace & myrrha, suffiuntur. Vim proditur ob-  
tinere extenuandi obesos, si ternum obolorum  
pondere ex aqua, aut mulsa aceto, plusculos dies  
ebibatur : liencsis datur, comitialibus, & suspi-  
riosus : menses cum aqua mulsa pellit, oculorum ci-  
catrices confestim emendat, vino madefactum  
medetur eorundem hebetudinibus, aduersus gine-  
cuias humore pregnantibus, doloresq; dentium, nō  
aliud efficacius.

Cyphi. CAP. XXIII.

**C** Yphi odorati suffimenti compositio est, di-  
cata dys, qua abunde Aegyptij sacerdotes  
utuntur. In antidota misceri solet, suspiciosus da-  
tur in potu. Permultæ componendi rationes, qua-  
rum una hæc est : Sumito cyperi dimidium sexta-  
rium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo-  
rue passæ pinguis, exemptis vinaceis, minas duo-  
decim : resina repurgata minas quinque : calami  
& iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum  
minam : myrrhæ duodecim : vini veteris sexta-  
rios nouem, cum duabus mellis minis : ruam pas-  
sam detractis vinaceis tusam, cum vino & myr-  
rha subigito : cætera tusa & cribrata adycito, die  
uno humorem combibere. finito, dein mel coquito  
dum



um sibi glutinis asciscat crassitudinem, eliquatā  
resinam accuratè permisceto cum reliquis diligen-  
ter contritus, & in fictile vas recondito.

## CROCUM. CAP. XXV.

**C**Rocum, optimum in medendi usu Cory-  
ceum, recens, & boni coloris, paulum can-  
lidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis  
partibus constans, non fragile, plenum à quo de-  
tractum est nihil, quod mades factum manus infr-  
git, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacree  
sim huius generis non est, aut vetus, aut humo-  
re perfusum creditur. Secundus locus datur Co-  
ryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Ly-  
cio, è monte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ.  
Cyrenicum & Centuripinum inter Sicilica o-  
mnia viribus infirmius est. Omnium natura ole-  
racea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris ve-  
nustatem, tingendis mortarijs dilexerunt: qui-  
bus de causis magno venditur. Vtilissimum in  
medicina quod antè descripsimus. Adulteratur  
immiſto crocomagmate tuso, atque etiam sape  
sublitu: contrita, quò pondus adijciatur, simul  
argenti spuma, aut plumbagine: sed maleficium  
declarat insidens pulvis, præsertim si deſputum  
in odorando subolet. Theſſalus ipsum tantum o-  
doratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus  
drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim co-  
quendi, emolliendi, atque subſtringēdi habet: vri-  
nam cit, elegantem colorem præſtat, qui ex paſſo  
liber



biberint, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, colubet: additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur: ad vuluæ etiam sedisq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerem stimulat, vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularijs collibombus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; versari.

Vrinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressus unguenti crocini odoramentis, & in formas digestus, quod crocomagma vocat. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, læue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumq; vehe-

\* Rectius menter dentes ac linguam insicit, \* multis durans Marcellus annis, quale est quod à Syria defertur. Habet aliquot ho suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuerras perma sant: vrinam cit, calfacit, concoquit, & emollit, vinente colo- res croci proportionem quadam tenus repræsentat, re.

quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

Vulgò Enu

Helenium.

CAP. XXVI.

la cāpana.

\* ἐν ὀφθαλμοῖς = **H**elenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga, caulem quibusdam vōis, nō in locis non emittit, radicem suballidam, inter- scissis, id dum subrusam, odoratam, subacrem, vegetam, ma est, in mon- gniam, ex qua agnatae propagines lilioris aut ari- tosis ac opa modo feruntur. \* Montibus in vmbrosis, siccoq;

eis. solo prouenit. Foditur æstate radix, particula- timq;



imq; dissecta siccatur. Potum radicis decoctum nenses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex mel = e prodest tussi, orthopnœa, ruptis, conuulsis, in = lationibus, & serpentium morsibus. In summa ex calfaciens. Folia ex vino cocta utiliter ischia = licis illinuntur. Helenium stomacho utile in pas = o conditum: siquidem salgamarij paululum sic = atam radicem, mox decoctam, & frigida aqua na defactam, in sapam conijciunt, & ad vsus re = condunt. Truta potaque ad cruentas excreationes efficax est. Alterum helenij genus in Aegypto gi = ni Cratenus tradit: herba est cubitalibus ramu = is, serpylli modo per humum repentibus, folijs len = ticulæ circa ramos, sed longioribus crebrisq; radi = ce pallida, digiti minoris crassitudine, per ima te = nui, supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum oleum. CAP. XXVII.

**O**leum, quod ex immaturis oliuis exprimi = tur, ad multos vsus rectè valentibus accom = modatissimum: omphacinum id appellatur. Præ = stat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligi = tur. Stomacho utile est, quod adstringat: gingi = uas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore, sudores cohibet, & quò vetustius ac pinguius, eò ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in com = mune dicantur) omne oleum cal facit, emollit ren =



trem, à persictionibus corpus tuetur, ipsūque promptius ad obeūda munera reddit, alium emollit, vlceraantium venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur, assidue potum reddit, tumque vomitionibus, soluit alium heminae mensura cum pari ptisanæ succo aut aqua potum, ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextariis in potu datur, ventris animalia pellit, idē maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si vetustas non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut vetustatem representet.

Oleum sylvestris oliuæ.

CAP. XXVIII.

**O**leum, quod sylvestres oliuæ fundunt, vehementer adstringit, & ad sanorum vsus secundum sibi locum veniat. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet, fursures, vlcera capitis manantia, scabiem, leprāsque abstergit: tardius curationem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo vetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur: ex altoque demittitur, ut assidua deuolutione, icluque agitatam respumet: octaua die fixum græci mundum quinquaginta denariorum pōdere, calida aqua madefact



Etum donec emolleſcat, in ſupradictū oleum deij-  
tur, ita ne extillet aqua: poſtea tede præpinguis  
ceæ, aſſulatim caſæ æquale pondus adijcitur, &  
anſactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi  
indorem contraxerit, in vas nouum vetere vino  
ſuſum recondi debet, ſubſtratus ſertulæ campa-  
æ corollis drachmas vndecim pendentibus, cum  
iri iridis pondere ſin minus, rurfus Soli mandan-  
um, & idē munus obeundū, uſq; dum inalbeſcat.

## Sicyonium.

## CAP. XXIX.

Sicyonii componendi ratio hæc eſt: In lebetem  
Soris lati ſtanno inductum, funditur olei albi  
quod cruda oliuæ reddiderūt, congius vnus, aquæ  
micongius: leui id igne coquitur, leniter mouen-  
do: at ubi buſ efferbuit, & ſubſtracto igne refrigit,  
matans oleum concha decapulatur, & adiecta  
nova aqua conſerueſcit, & reliquis, vt diximus,  
eractis reponitur. In Sicyoniæ maximè fieri con-  
ueuit, Sicyonii inde accepto cognomine. Calſactio-  
iam ad quendam uſque modum vim habet. Febrē  
c neruorum vitijs prodeſt. ſexminæ ad commen-  
dum faciei nitorem eo vtuntur.

## Strigmenta balneorum.

## CAP. XXX.

Strigmenta à balneis calſaciunt, mollunt, di-  
ſcutiunt: ad ſedis rimas & condylomata illi-  
untur. Illa verò quæ ex paleſtris puluerem ſibi  
iſciuerunt, in ſordis ſpeciem redacta, articulorum  
nodos impoſita adiuuant: iſchiadicis in ſotus aut  
malagmatis locum, calida commodè ſufficiuntur.



Deraſæ gymnaſiorum parietibus ſimulacrisq; ſordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægrè ad coctionem perducuntur, diſſipant: deſquammatiſ & vlceribus ſenum profunt.

Elæomeli.

CAP. XXXI.

**I**N Palmyra Syria, quod elæomeli vocant, ex quodam caudice manat, oleum melle craſſius, ſapore dolci. Bilem, cruditatēſque detrahit, ſextario cum vna aquæ hemina dato. Sed qui ſumpſerent, torpeſcunt & viribus deſciuntur: quod minime vereri oportet, verum crebro excitare, ne veterino preſſi ſomnos captent. Fit & oleum è pinguitudine ſurculorum oleæ: optimum vetus, craſſum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimq; caliginibus oculorum illinitur: lepras, nervorumque dolores illitum emendat.

Cicinum oleum.

CAP. XXXII.

**C**icinum oleum hoc modo temperatur: Maturi ricini, qua voles quantitate, torrido ſole flacceſcunt, & vuarum more inſtrati tatiſper inſolantur, dum veſtiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur poſtea in lebetem ſtanno illito, qui aquâ habeat, demittitur, ſubiectoq; igni ferueſcunt: & ubi inſitum proſuſ humorem reddiderunt, ſublato ab igni vaſe, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit uſus, longè ſecus fieri ſolet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accuratè molitos perſport



Sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cū continentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vulnus conuersis atque præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum, potu aquam alio extrahit, ventris animalia pellit.

Amygdalinum. CAP. XXXIII.

**A**mygdalinum oleum, quod aliqui metopium vocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatusq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in ossis, aque, quæ serbuerit, sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quā antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitus hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aque inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum. Singulis heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: vitis renum, calculosis, difficili vrinæ, suspiriosis, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, timitusq; discutit: maculas & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lily & Cypria cera aut rosaceo cerato, & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & fures cum vino abstergit.



## Balaninum. CAP. XXXIII.

**S**imili modo fit balaninum oleum, quod repur-  
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices  
in gr. ss. Aluum soluit, stomacho aduersatur, contra  
aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum  
anserino adipe instillatum. Similis sesamini ratio.  
Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod caryinum  
vocant. Eandem vim habet quam balaninum.

## Hyoscyaminum. CAP. XXXV.

**H**YOSCYAMINUM sic fit: Semen candidum, res-  
cens ac siccum tunditur, & calida asper-  
gitur aqua, ut in amygdalino diximus. dumque  
insolatur, siccata, quæ sub manu sunt, partes cum  
reliqua massa permisceantur hoc in ante fieri oportet  
dum nigrescat & grauiter oleat: mox pres-  
sum atque excolatum reconditur. Ad aurium do-  
lores efficax est, pessis miscetur, ad emolliendum  
utile. Fit & è grano gnidio purgato & tuso. Vis  
ei aluum soluere potius. Non secus cnicinum oleum  
temperatur: cui facultas eadem est, quæ facta  
è gnidio grano, verum inualidior. Rhaphaninum  
è rhaphani semine fieri solet, cæterorum more.  
Phthiriasis mala valetudine contractas tollit, sca-  
bitias cutis in facie emendat. Ad obsonia vti-  
tur Aegyptij. Melanthinum idem quod rhapha-  
ninum potest. Tritum sinapis semen, & calida  
aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimi-  
tur. Id ad diuturnos dolores efficax est, transfert  
humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Myr



## Myrteum. CAP. XXXVI.

**M**yrtei faciendi ratio hæc est: E myrto nigra syluestri, aut satina, foliorum mollissima quæque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectusq; carbonibus inferuescunt, donec concoquantur, innatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc compositio: Tenera folia cōtusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum inspissant malicorio, cupresso, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu & oleosum, viride, translucens, & olens myrtum. Adstringit & indurat, ideò medicamentis miscetur, quæ cicatricem obducunt: prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & surfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores compescit, & omnia quæ ad strictionem inspissationemque desiderant.

## Laurinum. CAP. XXXVII.

**L**aurnum fit hoc modo: Lauri bacca cum matura sunt, in aqua coquantur: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia cōcoquant, alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit, alij styracem & myrtum addunt.



Optima laurus ad id latifolia & mōtana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quòque viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam e maturo fructu temperatur, factus prius spissamentis, ut in laurino diximus. Hoc scabiē iumentorū canumq; sanat: vtilissimum pēsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & adstringit.

Mastichinum. CAP. XXXIX.

Mastichinum è trita sit mastiche, quod contra omnia vuluæ mala efficax est: mediocriter calfacit, adstringit, & emollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorum compositio. CAP. XL.

De ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidē ea in nonnullis corporū vitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt: in quorum probationibus cōsule-

re



re nares oportet, an ea oleāt, ex quibus temperan-  
tur. Optimum huiusmodi iudicium, quod in qui-  
busdam planè observari nō potest, propter ea quæ  
admiscētur odore cæteris prævalentia: ut in ama-  
racino & crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ cre-  
bra circa hæc meditatione experiri conveniet.

Rosaceum.

CAP. XLI.

**R**osaceum sic fit: Iunci odorati quinque li-  
bras & bessē tundito, & subactas aqua  
in viginti olei libris & quincunce subinde mouen-  
do, coquito: dūmq; percolaueris, in olei libras vi-  
ginti & quincuncem, adijcito rosas non madesa-  
ctas numero mille, & manibus melle perunctis  
identidem moueto, interdū premens, finito no-  
cte tota macerari, postea exprimito: & ubi re-  
cremētum pessum ierit, mutato vase, in craterem  
melle illitum recondito. Cæterū rosas, quæ an-  
tea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affu-  
sis octo libris & quadrante spissati olei, iterum  
premito, eritq; secundarium oleum. Quod si ter-  
tias vsq; quartasve perfusiones infundens expri-  
mere voles, secundarium fiet, tertiarium, & quar-  
tarium unguentum. Sed quoties id feceris, vasa  
melle oblini debent. Si verò secundam infusio-  
nem instituere libet, in expressum oleum, numero  
pari recentes rosas, nullo humore imbutas inij-  
cito: manibus melle præmadesactis, agitans pre-  
mito: & iterum, tertio aut quarto simili modo  
exprimens facito, totiesq; recentes rosas detra-



Etis vnguibz immittit: fiet enim ita oleum multo validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibz, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo: Rosæ quæ sēlibram pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescunt, & vsq; tertiam persusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim adstringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus vtile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, vlcera cana replet & mulcet, quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficacis est, ad laceßita interanea & concitata vulnus utilissimè subicitur.

## Elatinum.

## CAP. XLIII.

**F**Racta elate tusa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent vtriusq; portiones, dein mundo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionere spondet: aluum tamen non mollit.

Mel



## Melinum.

## CAP. XLIII.

**M**elinum hoc modo temperatur: Olei cōgiuntur decem aquæ sextarijs admiscetur. Adyctur elatæ palmarum fractæ quadrans, & iunci odorati vncia: quæ die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut vetustâ tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operta tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decem dierum spatium operimentis inuolunt, ut contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumque reconditur. Id vinum refrigeratorium & adstringentem habet. Contra scabiosa vlcera, & quæ serpunt, ac furfures, perniunculósque effectum præbet: exulcerati vultus infunditur, citatam vrinam sistit infusum, sudores cohibet, contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quod cotonea mæla olet.

## Oenanthini compositio. CAP. XLV.

**O**enanthe è labrusca, optimè olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, voluiturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Adstringit proximum rosaceo effectum præbens: sed alium non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore oenanthen refert.

Tel



Telini componendi ratio. CAP. XLVI.

**F**oenigraci libræ quinque, calami libra una, cypiri libræ duæ, olei libris nouem, septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur. postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituum, & cypiri loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato fœnumgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, omnibus vuluarum duritijs magnopere conuenit, fœminis difficilè parientibus subijcitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenasmo subditum prodest, vlcera capitis manantia fursuresq; expurgat, ambustus, & perionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recēs, quod non vehemēter fœnigraci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

Sampsuchini compositio. CAP. XLVII.

**S**erpylli, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrij, frōdium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro viribus ipsorum comectatione, vntuntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non euincat: hæc post quadriduum exprimuntur. Denuò noua alia, simili mensura, & equali tempore macerata premuntur: ita enim validius reddi solet. Eligi oportet



tet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus vuluæ præclusiones conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, vuluæ strangulatus recreat, lumborū inguinumq; dolores lenit: sed cum melle vti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, vulsorūq; cataplasmata vtilissimè additur.

## Ocimini compositio. CAP. XLVIII.

**O**cimum oleum sit vt cyprinum: Ocimi folia decerpta librarū vndecim, & beſſis pondō, die noctūque viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhauseris quallum, rursus parem olei modum fundito, exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perſuſionis non est capax. Deinde recens ocimum equali pondere, vt in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

## Abrotonini compositio. CAP. XLIX.

**O**lei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctūq; madefactas premito. Quod si in longum



gum tempus oleum velis asservari, eiectis prioribus folijs, nova appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritias præclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

Anethini compositio. CAP. L.

**O**lei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & bessem, maceratas in oleo die una, manibus premito & recondito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vulvarum duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitus redeuntes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Susinum. CAP. LI.

**S**usinum, quod alij liliinum appellant, sic temperatur: Olei libræ novem cum quincunce, calami libræ quinque & quadrans, myrrhæ uncia quinque, permisto odorifero vino decoquuntur, &colato oleo, cardamomi tusi & cælesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq; tres libræ cum semisse spissari olei assumuntur: mille lilia decerpitis folijs in latum, non tamen profundum, labellum demittuntur: iniectum oleum, manibus melle perunctis agitur: die noctuq; conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet: (non enim, ut rosaceum, moram tolerat: nam concalfactum  
fer



et & computrescit : quare sepius decapulan-  
lum) vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus,  
& si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda.  
Odoramentis iam expressis ex quasillo in label-  
um transfusis, rursum olei prius odoribus imbuen-  
ti, quod primum pōdus æquet, & cardamomi tu-  
si drachmæ decem coniunguntur. Hæc manibus sci-  
è pressa, interiecta breui mora exprimuntur :  
quod profluit, repurgatur. Tertiò eadem infundun-  
tur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle  
le madefactus. Longè optimū erit, quod prius ex-  
primitur : secundum, quod sequitur : tertium la-  
cum sibi vendicat, quod nouissimum prodit : De-  
quò in mille lilia emulsis solus expressum primò o-  
leum infunditur : tum eadem ratione prosequen-  
lum, idemq; faciendum, ut prius, addito cardamo-  
mo, dein expresso : & quò frequentius recentia li-  
ta maceraueris, eò validius vnguentū efficies. De-  
nique cum factum abundè videbitur. singulis com-  
positionibus miscere conuenit myrrhæ quatuor opii-  
mæ duas & septuaginta drachmas, & croci de-  
cem, cardamomi quinq; & septuaginta : croci re-  
tò & cinnamomi parces portiones tunduntur, & cri-  
brate in lutrā cum aqua demittuntur, expressumq;  
primò vnguentum infunditur, & paulo post exci-  
piuntur vasculis siccis, myrrha aut gummi antea  
perfusis, & croco, melle & aqua madefactus. Ea-  
dem sunt in altera aut tertia expressione. Aliqui  
implex ex balaino, aliòve oleo, & lilijs cōponūt.  
Opt



Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum primus laudatur quod lilia redollet. Excalfacit, emollit vulvæ præclusiones, & collectiones aperit, vtilissimum ad muliebria mala: ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, furfuresq; emendat: vibices cicatricēsque celerrimè ad colorem reducit, ita ut sepe fallant. In summa extenuat, potum bilem per alium extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

## Narcissinum.

## CAP. LII.

**N**arcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ aspalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncis quinque assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinque libris, & besse adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum ijs efferverit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quàm plurimi coniunguntur, qui bidui spatio (ut in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vulvæ duritias, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

## Crocium.

## CAP. LIII.

**C**um crocium componere voles, prius olei, ut in susino diximus, spissamenta facies, eisd



eisdem ponderibus, & mensuris: cuius olei libras tres & semissem, croci vnciam vnam assumes, identidem quotidie moueto, & sexta die, quàm hoc assiduo peregeris, oleum à croco colis incernito, eidem croco parem olei modum adycito, moue triduo, dein contusæ myrrhæ atque cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitatum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprium imbuto in crocini compositione vtuntur. Optimum est, quod abundè crocum spirat, in medendi vsu expetitur. Proximum, quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit, quare persepe phreniticus subuenit, persusum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, vlcera purgat, contra vuluæ duritias atque præclusiones, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere. Concoquit enim, emollit, humefiat, & permulcet: ad oculorum glauцитates ex aqua illinitur. Huic autem proportionem respondent butyrium, onychinum & styracinum: quæ & si nominibus distant, viribus & compositione cognata sunt.

## Cyprini spissamentum. CAP. LIIII.

**O**lei omphacini eloti pars vna, aquæ celestis tantundem cum semisse, cuius vna parte oleum diluitur, altera adyciendis odoramenti admiscetur: dein assumptus aspalathi libris quinque, & semisse, calami libris sex, & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris tribus, & do-



drante, olei libris nouem, & uncis quinque. Aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo donec conferuescat, myrrha autem vino vetere odorifero subacta, contususque simul calamus, digeruntur in offulus, quæ exempto aspalatho immittuntur: & ubi efferbuerint, sublato alieno, oleum percolatur. Cardamomum tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla, dum refrixerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprum vocant, sex & quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per storiulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum simili modo pressatur: & iterum aut tertio si quis velit, madescere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calscit, emollit, orarum venarum adaperit, vuluæ neruorumque vitij conuenit, pleuriticis, fractisque per se vel cerato immixtum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationique inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

Irini spissamentum. CAP. LV.

**S**pathæ quàm minutissimè contusæ sex libræ cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromati-

bi



bus imbuto oleo, irinum primò temperatur, iride  
ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia  
est componendi ratio: In olei septuaginta libris &  
quincunce, xylbalsami (ut dictum est) confusi, li-  
bras quinque & sextantem excoquito, postea de-  
tracto xylbalsamo novem libras & dextantem  
aducito, & myrrhæ glebam vetere vino odorato  
persusam, & in olei illa odoribus imbuti quatuor-  
decim libris, totidem tussæ iridis, binis diebus ac  
noctibus madesfacito, strenuè & vehementer di-  
stringito. Quod si vis validius fieri, par pondus  
iterum ac tertio similiter maceratum exprimito.  
Longè optimum est, quod solam irin olet, quale est  
in Perga Pamphyliae, & Elide Achaiæ natū. Vim  
habet calfactoriam atque emollientem, crustas  
adimit, sordida ulcera & putrida purgat: confert  
fæminis vulvæ causarum: item inflammationibus  
eiusdem atque præclusionibus, partus eicit, hæ-  
morrhoidas recludit, contra aurium sonitus exace-  
to, rursus & amaris nucibus, prodest: diuturnis  
destillationibus, naribus illitum, & contra gra-  
ueolentia earum ulcera, quas oxenias vocant, aux-  
iliatur: alium purgat cyathus epotus, facit ad ilei  
cruciatum, urinam movet, difficileis vomitiones  
adiuvat, periculis eo digitis & immixtis, vel ijs quæ  
ad vomitum ciendum induntur: anginae etiam illi-  
tur, aut ex aqua mulsa gargarizatur: item contra  
arteria scabritiam. datur etiam ijs, qui cicutam,  
coriandrum, aut venena fungorum hauerunt.



## Gleucinum. CAP. LVI.

**G**leucinum absolute constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celtica nardo, spatha, asspalatho, fertula campana, costo, & musto: circumdatus interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vulneq; vitis auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

## Amaracinum. CAP. LVII.

**A**maracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentus è xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis, conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassia, carpobalsami & myrrhae odoribus. Aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitionem, illud ad cogentis tusorum aromatum offus. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vrinam cit, putrilaginibus ac fistulis perquam utile: nec non humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustis, & tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit: difficili vrinae, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vulnus subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vulnus tumores discutit, vulneratis nervis, & mu-  
scu



sculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

Megalinum. CAP. LVIII.

**F**Actitabatur olim megalinum, sed nunc compositio exoleuit, & prorsus obliterata est. Cuius ad hystoriæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leniter emollit. Resina vnguentu, neque tutelæ neque voluptatis gratia adijcitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Hedychroum. CAP. LIX.

**Q**uod hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem præditum viribus & misturis, quibus amaracinum, sed suavius spirat.

Metopium. CAP. LX.

**F**it in Aegypto vnguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mistionem: nam lignum, in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat aniaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsami semine, galbano & resina. Probatum pingue, grami odore, quod magis cardamomum & myrrham, quam galbanum respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atque extrahit, ora venarum aperit, vlcera purgat, extrahitque: ad præcisos nervos, & musculos, ad



hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inservitur, horroribus, convulsisq; præsertim quibus cervix in scapulas dejecta, & retrorsum contracta est, utile habetur sudores ciet, vulvae spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat: in summa, molliendi naturam habet.

## Mendesium. CAP. LXI.

**M**endesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vin obtinet, sed inferiorem multo.

## Stacte. CAP. LXII.

**S**tacte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tuse, & organo expressæ. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque vnguentum per se facit, quod stacte nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei mixturem admisit, cuius minima portio compos est viriū plurimarum. Vim calfactoriam myrrhæ & calidis vnguentis respondentem habet.

## Cinnamominum. CAP. LXIII.

**C**innamominum confit è balanino oleo, & xylobalсами, calami, iunci odorati spissamentis, atque cinnamomi, & seminis balsamini suavitæ conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamominum portione, mel ad cogenda omnia adijcitur.

Laud



Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham  
redolens, crassum, odoratum, gustu perquam ama-  
ro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obti-  
nuit: resina enim neque amaritudinē præbet, ne-  
que ullam odoris gratiam aducit. Vim habet admo-  
tum acrem, amarā, & calfacientem. Itaque ora  
venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humo-  
res & spiritus attrahit, caput aggrauat, contra  
vulnē vitia cum duplo oleo, cera, & medulla effi-  
cax est. Ita enim ferè multum acrimoniæ exolefcit,  
& quedam emolliendi vis contrahitur. alioqui  
adurit, & præ omnibus crassis vnguentis indurat.  
Facit mirum in modum ad fistulas & vlcera, quæ  
putredinis vitium senserunt: item ad hernias hu-  
midiores, carbunculos, februm horrores, tremores,  
gangrenasq; cum cardamomo: aduersus serpen-  
tium morsus illinitur, scorpionum & phalangio-  
rum ictibus cum tritis grossis imponitur.

## Nardinum. CAP. LXIII.

**R**atio nardini faciendi euariat. Nam aut  
malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunq;  
autem balanno oleo, aut omphacino, iuncus odora-  
tus spissamenti gratia adiicitur: sicuti propter odo-  
ris suauitatem, costus, amomum, nardum, myr-  
rha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi  
aride aut amomi odorem referens. Vis et exte-  
nuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget hu-  
mores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet  
strigimenti crassitudinem, nisi resinam recipiat.



Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinum. CAP. LXV.

**M**alabathrinum spissamenta nardini habet, insuper myrrhae plusculum additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

Iasminum. CAP. LXVI.

**A**puà Persas fit, quod iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorum sextans in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemque desiderant: grauius enim spirat, quam ut libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. CAP. LXVII.

**M**yrtha lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spina non dissimilis: è cuius vulnere defluit lacryma in subiectis tegetes, alia circum caudicem concrescit. Dicitur ex his aliqua pediasmos præpinguis, quæ expressa, stacte emittitur. Alia gabirea pinguisima, læto & pingui solo nascent, ea copiosam sudat stactem. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit: splendens, subuiridis, ac mordens.



dens. Quinetiam legitur tenuis quedā, quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricus nascens. Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur, pingui carēs, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è siccioribus haudquaquam pingues, & inodorati: minus odore pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, vndique concolor, quæ confracta venas vnguium modo candidas & laues ostēdat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: supernacua & inutilis est ponderosa, coloris picei. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccatur, adstringit, vulnam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit, cum absynthio, lupinorum cremore, vel succo rutæ admota: tuberculo fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnœa, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profluvio, & dysenteria: horrores discutit, duabus horis ante februm accessiones, fabæ magnitudine pota cū pipere & aqua: subdita linguæ liquataq; scabritiæ arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra grauem oris halitum man-



ditur, & aduersus alarum tædia cum liquido alu-  
mine illinitur: gingiuis & dentes stabilit, colluto  
cum vino & oleo ore: vulnera capitis illieugluti-  
nat, modetur fractis auribus ac ossibus nudatis,  
peruncta cum crechle & carnibus. Item purulentis  
auribus inflammatisq; cum meconio, castorio, &  
glaucio: ad varos autē cum cassia & melle illini-  
tur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capil-  
los cum lactura & vino myrteo illita, firmat: diu-  
turnas destillationes lenit, illitis penna naribus:  
oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginē  
discutit, scabritiē laeuigat. Fit ē myrrha, perinde  
atq; thure, siligo, & ut postea ostendemus, ad ea-  
dem conueniens. Bæotica myrrha, dissecta radix  
est arboris cuiusdam in Bæotia nascentis. Melior  
est, quæ myrrham odoris suauitate repræsentat.  
Vis ei calfactoria inest, emollit discutitq; suffimē-  
tis commodissime inferitur.

## Styrax.

## CAP. LXVIII.

Λιπαρὶς, **S** Tyrax lacryma est arboris malo cotoneæ si-  
milis. Præfertur \* sordescens, flauus, resinosus  
id est, pin-  
sus, albicantibus grumis, quā plurimum in sua  
gus. odor gratia permanens: qui dum molitur, mel-  
leum liquorem reddit: qualis ē Cataballis, Pisi-  
dia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, sursuro-  
sus, friabilis, canoque sitis obductus. Cæterum la-  
cryma inuenitur gummiū similitudine, perluci-  
da, & myrrhæ æmula: verum per pauca manat.  
Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi eroden-  
tes



es excasserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoratus imbutum, flagrantissimis solibus cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos exprimunt, venundantque. Styracem hunc [quoniam in vermiculorum speciem contrahatur] scolecitem cognominant, tanquam syncerum imperiti approbant, non animadvertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, rancidini, grauedini, & interceptæ voci: vtilis præclusæ duritiæ vel laboranti conuenit, cui menses potu appositusq; alium leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapoti modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopisque. Adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniens ad quaethuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauatq; & soporem adfert.

## Bdellium. CAP. LXIX.

**B**dellium alij bolchon appellant, alij madelcon: lacryma est \* saracenicæ arboris. Pro= \* Vox adu-  
batur gustu amarum, translucentum, taurini glutinerina Martini in morem. intus pingue, liquescens facile, ligni cello.  
ac sordis expers, suffiu odoratum, vngui simile.

Est



Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, vberioribus glebulis in offas conuolutum, asspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiam à Petra oppido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum nō perinde gustui amaritudinē repræsentat, nec vsque adeo suffitionibus odoratum. Calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humidâsque hernias discutit, cum ieiuna salua dilutum: vuluæ spiracula laxat appositum & suffitum, & partus humiditatesq; omnes extrahit, calculos potu comminuit, urinam mouet, tussientibus & à serpente percussis, vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmati inseritur, quæ contra duritias & neruorum nodos prosunt: contusum resoluitur affuso vino, aut aqua calida.

\* ὑπὲρ

Thus.

CAP. LXX.

ῥο, id est, subrusum est.

**T**Hus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum verò \* fuluescit, & colore liuid est, Aræuet, sed rotundum industria facitanti: nam in quibus dictū, drangulares formæ dissectum fictilibus versant, & quod in donec rotunditatem contrahat: verum huiusmodi Smilo pro- thus tempore flauescit, quod atomum aut syagriū uenit. appellant. Secundum locum habet \* Arabicum,

ῥ



& in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vocat,  
 minus multò & fuluius. Est & genus aliud, cui  
 amomite cognomen est, alioqui candidum: quod  
 lum mollitur, mastiches more digitis cedit. Adul-  
 teratur \* in itinere, pini resina & gummi, quod \* μισθὸς ὄνομα  
 facile deprehendi potest: siquidem suffitum gum-  
 mi flammam non eiaculari, & resina in fu-  
 mum euanescit, illius verò statim ardet: idem ma-  
 ciosè confor-  
 lesicium odor prodit. Ad calfaciendum & adstrin-  
 gendum pollet, oculorum caliginem discutit, caua Marc.  
 ulcera complet, & ad cicatricem perducit, cruen-  
 ta vulnera glutinat, infranatque cunctas sangui-  
 nis eruptiones, etiam si cerebri membranis effluat:  
 ulcera, quæ cacoëthe vocantur, & sedis & reli-  
 quarum partium permulcet tritum cum eo & la-  
 ste linamentum, formicantes verrucas inter ini-  
 tia, impetiginēsque, ex aceto & pice illitum, tollit:  
 umbusta igni, pernionēsque cum sullo adipe aut  
 inferino, & ulcera in capite manantia cū nitro,  
 si infricetur, sanat: paronychys cū melle, auribus  
 fractis cum pice, medetur: ad reliquos aurium do-  
 res cum dulci vino infunditur, inflāmata à par-  
 uā māmā cum cimolia & rosaceo magna utilita-  
 te perunguntur, additur ad arteriæ viscerūque  
 medicamenta, prodest sanguinis excreationi pro-  
 num: sed in secunda valetudine haustum insaniam  
 nouet, & largius cum vino potum interficit. In  
 scitili mūdo thus crematur, flagrans glebula suc-  
 censum à lucerna, donec exuratur post perfectam  
 vstionem



ustionem operire oportet, usque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem; ut in eius mentione mox ostendimus. Alii crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporisve emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. CAP. LXXI.

**P**resertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lauis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admixto pini aut nucis eiu cortice, sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem ei aculat. Thuris modo utitur, & us eadem quae thuris sed validior adstringentioreque. Quare potus cruentis excreationibus, vulnus fluxione laborantibus in pectus confert, ad cicatrices oculorum, & caui sordisque efficax est. totus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris. CAP. LXXII.

**M**anna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eam quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui contrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris confusi adulterant: sed haec igne deprehenduntur.



tur. Neque enim aquæ suffiu aërium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permixtum suauolentiaë halitus virus habet.

Thuris fuligo. CAP. LXXIII.

**F**uliginem thuris sic facito: Forcipicula, lincernis accensus singulatim thuris glebas, in nouam fictilem ollam cocauam imposito: & arceovase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito: alteram admoneto, ex altera eius parte aut utraque, subiectus quaternum digitorum altitudine lapillus, quò facilius perspici queat, si uratur: & qui locus capax fuerit, glebularum alias supposito, & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem videaris coëgisse. Continuo tamen externæ aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim temperato aeris fenore, fuligo omnis inherebit: quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cineribus admiscetur. Deorsum itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum subtrahendus est. Idem opus, quoad satisfactum tibi videtur, obeundum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, caua explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. CAP. LXXIIII.

**P**inus & Picea generi eidem adscribuntur, sed quandam flagitat specierum distinctionem.

arbor



arbores vulgò cognita: quarum cortex adstrin-  
git, prodest tritus & illitus intertrigini, vlceri-  
bus summum corpus occupantibus, ambustisque,  
cum spuma argenti & manna. Vlcera delicatu-  
lorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino  
exceptus, ad cicatricem perducit: tritus cum su-  
torio atramento serpentina cohibet, suffitu partus  
& secundas eicit, potus aluum sistit, vrinam  
mouet. Folia eorum trita & illita inflammatio-  
nes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicât,  
trita autem & decocta aceto, feruenti collutione,  
dentium dolores mulcent: hepaticis vtilia sunt,  
drachmæ pondere in aqua aut mulsâ pota. Pineæ  
nucis cortex & folia potu idem præstant. Teda ea-  
rum particulatim secta si in aceto coquatur, &  
decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam  
fit spatha acoporum pessorumque cõpositionibus  
idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad  
librarij atramenti confectiõnem excipitur: ea cir-  
cumlutionibus efficacissimè imponitur, quibus  
palpebras ornant, colorémque mentiumtur, calli-  
brephara Græci vocât: arrosis oculorum angulis,  
callofis glabrisque genis, & collacrymationibus  
opitulatur. Pityides appellantur pinorum piceæq;  
fructus, qui in conis inueniuntur. Vim adstricto-  
riam habent, & aliquatũ excalfacientem tussi  
& pectoris vitis auxiliantur, per se, aut ex melle  
sumpti. Noces pineæ cum strobili repurgatæ  
manduntur, aut cum passo aut cucumeris semine  
bib

Pityides.



bibuntur, urinam cient: acrimonias in renibus & vesica hebetant, stomachi rofiones leniunt: datæ cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ vetustæ tussæ ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

## Lentiscus.

## CAP. LXXV.

**L**entiscus nota arbor est, cui toti vis inest adstringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liguamentum autem ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquantur, & ubi abundè coctæ refrigeratæque sunt, folia abijciuntur: aqua denuò coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciæ & hypocistidis vicem repræsentat. Idem facit succus è tritis folijs. Decoctum soti caua explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, urinam pellit, motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, \* quod *gummi* prodest, cum quid adstringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, Mastix of & ab aliquibus, \* mastiche. Pota vilis est sicinis.



sanguinem reiicientibus, & tussi veteri stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia & illutiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat, manducata halitumoris commendat, gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula *Inseru* ab Chio prouenit. Praefertur [nitedula modo] reinterprete. splendescens, & candore Tyrrhenicae cerae similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinaeque pineae nucis mistura.

## Terebinthus.

CAP. LXXVI.

**T**erebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex adstringunt, & ad eadem ad quaelentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaque. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, urinam mouet, venenem excitat, contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia Petraea defertur. Prouenit etiam in Iudaea, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis: sed praevalet candida, perlucida, vitreo colore, & inceruleum vergente, odorata, terebinthum olens.

*Officinis,* \* Terebinthina resinas omnes antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle, vitia pectoris expurgant, urin



urinant, cruda concoquunt, veniorem emol-  
liunt, palpebras commodissime replicant, lepras  
tollunt, cum æruginè ac sutorio atramento, nitroque  
auribus saniem emanantibus cum melle & oleo,  
item in pruritu genitalium utiles: malagmatis,  
acopisque admiscuntur. Laterum doloribus per se,  
illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. CAP. LXXVII.

**L**iquida resina est pinu & picea, à Gallia &  
Hetruria conuehi solet, atque olim à Colo-  
phone petebatur: hinc Colophonie sibi cogno-  
mentum vendicauit. A Gallia quoque subalpina:  
quam vernaculo nomine laricem appellant inco-  
e. Ea in linclu, & per se, magnopere prodest  
ussi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia  
 candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris simili-  
 tudine, ut larigna. Cupressus etiam liquidam sum-  
 it resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ verò ari-  
 larum generi adscribitur, quædam ex pincis nu-  
 ibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt.  
 eligi debet longè omnium odoratissima, translu-  
 ens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ  
 aciem præbens, & friabilis. E picea & abiete re-  
 sine cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atque  
 bus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa  
 nsula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita  
 st. Sed quæ est picea, nucibus pineis & cupresso  
 ianarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potius  
 ur. Veruntamen eorumlem gratia, quorum &



illa sumi solent. Lentiscina terebinthina respon-  
det. Vritur resina omnis liquida in vase quadru-  
pla capacitatis ad humorem, qui infunditur: ita-  
que resinae congius, in duobus aquae pluviae coqui-  
tur, subiectis leuibus prunis, resina assidue moues-  
tur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis &  
retorrida reddatur, ac digitus cedat. Caterum ubi  
refrixit, in fictile non picatum, quod aconitum vo-  
cant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij  
candoris, si resina omnis eliquata praeoletur, quod  
feculenta sordes excernatur. Vruntur quoque sine  
aqua, primum lento igne: & ubi coire ceperunt,  
maior carbonum strues supponitur, & triduo ci-  
tra intermissionem discoquuntur, usque dum an-  
tedictas naturae suae notas exuerint: mox, ut dictum  
est, reponuntur. Aridas unius diei spatium decoxisse  
satis est. Vsta odoratis malagmatibus, & acopis,  
& unguentorum colorationibus magnopere utile  
sunt. E resinæ perinde atque ihure fuligo excipie-  
tur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebrae  
fucant, & colorem mentiuntur. Prodest glabris gen-  
is, collacrymationibus, erosisque oculorum angu-  
lis, ex ea sit atramentum scriptorium.

Pix liquida. CAP. LXXVIII.

**P**ix liquida, quam alij conum vocant, est pin-  
guissimis pini piceaeque lignis congregatur.  
Optima est splendens, sincera, levis. Contr-  
venena, phthisim, purulentam excreationem, tuss-  
ses, suspiria, & pectoris humores, qui difficile ex-  
tussiu



tussiuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & vuae inflammationes, anginaeq; vtiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium morsibus: adiecta verò pariter cera scabros vngues extricat, impetiginesq; emendat: vuluae duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinâque hordeacea & pueri impubis vrina lecocta, strumas rumpit: cohibet vlcera, quae ferunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Caterum cum thuris manna & cera toto profundos vlcum sinus conglutinat, rimis seculi & pedum, magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cum vua pasta, & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, disrumpitq; erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probè immiscetur.

## Picinum oleum. CAP. LXXIX.

**E**Pice sit quod pisselæon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serui aëti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra ortinam vellera pura madescunt, acceptoq; haec de utu eius exprimuntur in vas. \* Quas pix liquida sunt, habet utilitates. alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix metur, iumentorum vlcera scabiemq; emendat.

## Fuligo liquida picis. CAP. LXXX.

**E**It hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna nona, quae ellychnium habeat, non nihil picis.



incendito, lucernamque fictili vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibanus esse solent, operiato, & adoleri finito: consumptoque liquore novum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisque. Usui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt & venustant, & ad circuncisiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososque oculos, insuper ad eorundem ulcera non inutilis est.

Pix arida. CAP. LXXXI.

**L**iquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam: quo in genere quaedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrusa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæque simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus movet, tubercula pamosque discutit, ulcera replet, vulnerariis medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa. CAP. LXXXII.

**Z**opissam aliqui aiunt derasam navibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. CAP. LXXXIII.

**B**itumen Indicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpure modo splendeat, sitque ponderosus.



ponderosum, ac validum odorem vibret. Nigrum autem & sordidum, vitiosum est. Adulteratur picce. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sidone. Liquidum inuenitur in Acragantino Siciliae, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

## Pissasphaltum. CAP. LXXXIIII.

**N**ascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunij montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

## Naphtha. CAP. LXXXV.

**N**aphtham vocant Babyloni, bituminis coalamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio proximis in eam transfiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, impoſitu, emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, gagata lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit, tussim veterem & anhelum adiuuat, serpentium moribus, toxendicum laterumq; doloribus auxiliatur, datur coeliacis in catapotio deuorandum, cum aceto potum discutit sanguinem concretum, dysen-



tericis cum ptisana liquatum infunditur, de stillationibus suffitione medetur, mitigat dentium dolores oblitum, ceterum pilos incommodos siccum replicat, specillo impositum: concalfactum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissa asphaltose eadem, quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

## Cupressus.

CAP. LXXXVI.

**C**upressus refrigerat, & adstringit. Cuius folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & urinae difficultati auxiliantur. Pilulae autem ex vino tuscæ in dysenteria, alni fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, convenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdè præbet effectus: tuscæ cum fico duritias emolliunt, nariumque polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinus detrita scabros ungues ejiciunt, hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulae cum arboris coma suffita, culices abigere existimantur. Folia trita & imposita, vulnera conglutinant: sanguinem supprimunt, capillum ex aceto tingunt, illinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus, quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota cum cerato stomachum corroborant.

## Juniperus. CAP. LXXXVII.

**J**uniperi genera duo: altera maior, altera minor,

not,



cor, vtraque acris est. Excalfacit, & vrinam mo-  
 iet, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ  
 iucis iuglandis magnitudine, nonnunquam gran-  
 lefcere, aliæ \* nucem Ponticam æquare inueniunt \* Auellana  
 ur: rotundæ, odoratæ, in mandēdo dulces, subama- intellige.  
 ræ, quæ arceuthides etiam, id est, baccæ iuniperi  
 uominantur. Modicè calfaciunt, & adstringunt:  
 Tomacho vtilis contra pectoris vitia, tuſſim, infla-  
 tiones, tormina, & ſerpentium ietus efficaciffimè  
 libuntur: vrinam cient, vnde ruptis, conuulſis, &  
 vuluæ ſtrangulatui ſubueniunt. Folia acrimoniam  
 habent: ideo tam ipſa, quàm eorum ſuccus, ex vi-  
 ro contra viperarū morſus illini aut bibi prodeſt.  
 Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ra-  
 zentaligni deuorata interficiunt.

## Herba Sabina.

CAP. LXXXVIII.

**S**abina duorum generum eſt. Vna folijs cupreſſo  
 ſimilis, ſpinis horridior, grauiter olens, acris  
 & feruens: arbor eſt coactæ breuitatis, quæ ſeſe  
 magis in latitudinē fundit: huius folijs nonnulli pro  
 ſuffitu vtuntur. Altera tamarici folio ſimilis eſt.  
 Vtriuſq; folia nomas ſiſtunt, collectiones illitu miti-  
 gant, & cum melle nigrities ſordesq; repurgant,  
 carbunculos cum vino pota rumpunt, ſanguinē per  
 vrinam eliciunt, partus appoſita extrahunt, &  
 ſuffitu idem præſtant, vnguentis calfacientibus  
 immiſcentur, & priuatim gleucino.

## Cedrus.

CAP. LXXXIX.

**C**edrus arbor magna eſt, ex qua picem colli-



gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas  
 parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas.  
 Cedria optima est crassa, perlucida, gravis odo-  
 ris: quæ dum effunditur, guttatim non dissipata  
 Cedrus coit. Cui ea vis inest ut defuncta corpora conser-  
 uentur, & viuientia corrumpat: quæ ex causa mor-  
 tuta dicta. Inuorum vitam aliqui appellare. Vestimenta  
 quoque, & pelles eximia calfaciendi & siccandi  
 dote, corrumpit: magni ad ocularia medicamen-  
 ta vsus, quippe illita oculis claritatem affert, al-  
 bugines cicatricisq; detergit: instillata autem cum  
 aceto vermes aurium necat, cum hyssopi decocto  
 infusa sonitus sibilosq; sedat, canis dentium indi-  
 ta eos frangit, & dolores lenat. Idem facit cum ex  
 aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali  
 abortiuum fieri constat: angina ea perunguntur,  
 tonsillarum inflammationibus auxilio est, lentes  
 pediculosq; illiti enecat, cerastæ moribus cum  
 sale impoſita subuenit, contra hausta leporis ma-  
 rini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in ele-  
 phantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pul-  
 monum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbea-  
 tur, persanat: vermes & tineas subter indita ne-  
 cat, & parius extrahit. Fit & oleum, à cedria  
 separatim, dum coquitur, velleribus supra hali-  
 tum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad omnia  
 vsus: priuatim vehementer perunctum scabiem  
 quadrupedum, canum, bouumq; persanat: inhæren-  
 tes ruginos enecat, vlcera quæ ex tonsura accepe-  
 runt,



runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus  
 vocantur. Calfactoriam vim habent, stomacho ad  
 uersantur, auxilio sunt tussi, cōuulsis, ruptis, stran  
 guriæ: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra  
 haustum leporem marinum in vino sumuntur, ser  
 pentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut me  
 dulla, corpore: in anidota adduntur. Fuliginē, quo  
 modo ex pice, congeri oportet, quæ eandem, quam  
 picea fuligo vim præbet.

Laurus.

CAP. XC.

**L**aurus quædam tenui folio constat, altera la  
 tiore. Viraq; ex calfactoriam naturā habet,  
 & emollientem. Vnde decoctum earum in mulie  
 bres infessus additum, vuluæ & vesicæ vitij con  
 uenit. Virentia folia sensim substringunt: illita  
 quoque ac trita vesparum apiūmq; ietibus opitu  
 lantur, eadem cum plemia & pane illita inflam  
 mationem omnem mitigant, sed pota stomachum  
 effundunt, & vomitiones mouēt. Lauri baccæ ma  
 gis, quā folia calfaciunt: ergo in eclegmale tri  
 ta cum melle vel passo profunt tabi, orthopnææ,  
 & omnibus thoracis rheumatismus: contra scor  
 pionum ietus ex vino bibuntur, vitiligines emacu  
 lant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori,  
 & grauitati instillatur, cum vino vetere, & rosa  
 ceo. In medicamenta autē adiunguntur, quæ neruo  
 rum lassitudines reficiūt, acopa vocant: & ad in  
 guenta, quæ calfaciunt, & discutunt. Cortex  
 radices calculos rumpit, parius necat, hepaticis  
 prodest.



prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

Platanus. CAP. XCI.

**T**enerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in vino potae, serpentium moribus auxiliantur: exceptae autem adipe, igni ambusta sanant. Insidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus. CAP. XCII.

**F**raxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus. CAP. XCIII.

**P**otus albae populi cortex unciae viuis ponderare, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum vino post purgationes pota, idem praestare produntur. Tepens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. Pilulae, quae primo foliorum partu exiliunt, illitae cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae proderunt corticem albae populi, & nigrae particulatim caesum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigrae folia cum aceto illita, magna utilitate podagric



gricis doloribus illinuntur. Resinam populus furni-  
dit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex  
aceto comitialibus utile est. Lacrymam populorū  
commemorant, quæ in Padum amnē defluat, dicitur De ortu ele-  
rari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, Electri multa  
alijs chrysophorum. Id attritu iucundum odorē spi- lib. vlt. cap.  
rat, & aurum colore imitatur: tritum potumq; sto 3. et 4. apud  
machi ventrisq; fluxiones sistit. Plin.

## Macer. CAP. XCIII.

**M**Acer ex Barbaria aduehitur, cortex flau-  
escens, crassus, gustu perquam adstringens:  
qui contra cruentas excreationes, dysenterias, &  
alias fluxiones bibitur.

## Ulmus. CAP. XCV.

**V**Lmi & folia & cortex & rami, vim habent  
spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras effi-  
caciter illinuntur, vulnera glutinant, sed multo ma-  
gis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nam in  
lori morem flecti potest. Crassior cortex in vino  
aut aqua frigida vnciatim potus, pituitas trahit:  
fracta ossa celerius solidesunt, si decocto foliorum,  
corticis aut radice foveantur. Humor in folliculis  
enascens prima germinis eruptione, cuti illitus ni-  
torem inducit, faciemq; splendidiore præstat. Qui-  
dam siccatur, in animalia abit, quæ culicem for-  
mam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum  
more ad obsonia usurpantur.

**E**Lignorum marcor. CAP. XCVI.  
Ex caudicibus lignisq; veteribus caries cõge-  
nitur.



ritur, quæ farine modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cohibet, si cum pari amiso & vino subacta, lintesq; imposita illinantur.

## Harundo.

## CAP. XCVII.

**I**N harundinum genere quædam nastos, id est, farctior, vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia femina, qua tibiærum ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu valateria, gracilis, cædicans, vulgò cognita: cuius trieta radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula, aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborumque dolores cum aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & cæteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur, paniculæ lanugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

## Papyrus.

## CAP. XCVIII.

**P**apyrus, qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipue in medicina utilitatis, ad laxandis fistulis: madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constructa enim atque immissa in hiatum, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaque Ac-

gyp



gyptij eā mandunt, succum tantum deuorantes, & nansam expuunt. Ipsīs radicibus pro ligno vtuntur. Cremata papyri cinis depascentia vlcera cum manium partium, tum oris maximè, colubet: verū melius id combusta charta præstat.

Myrica.

CAP. XCIX.

**M**Yrica seu tamarix arbor vulgò cognita est, Officinis cum apud pigras & stagnantes aquas ena Tamariscatur, fructum quasi florem ferens compage muscus. cosum. Aegyptus Syriæque alteram gignunt nuiorem, syluestri cetera similem. Fructum patit galle proximum, inequaliter adstringentem rursu: quo conuenienter vtimur vice galle in melicaminibus oculorum orisq;. Datur cruenta excretioni in potu, & coliacis, & contra profluentia feminarum, regium morbum, & phalangion morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eosdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino cotum, lienem absūmit: ad dolorem dentium in colutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vuluæ pporitunis in desestionibus, phthiriasi lenilibusq; circumsusum prodest, abundantiam feminarum istit impositus arboris cinis, potorios calices e audice lienosis moluntur, quò datus in his potus roficiat.

Erica.

CAP. C.

**E**rica\* fruticosā arbor, myricæ similis, long\* Plin. frutic minor cuius flore apes reprobiū mel efficiunt, cem dicit. a flos quā comā serpētū ictibus illitū medetur.

Acac



## Acacalis. CAP. CI.

**A**cacalis fructus est nascentis in Aegypto fructus, seminis myricæ quadātenus similis: cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

## Rhamnus. CAP. CII.

**R**hamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alteri ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadātenus rubentibus: cuius rami quinim ferè cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenuem, folliculariq; specie, & verticillo similem. *ῥαμνὸς ἀκανθώδης*. Omnium folia igni sacro, & serpentibus id est, a= vlceribus, efficaciter illinuntur. Fama est rassphodeli fructus huius valuis fenestrisve impositos, veneficia elui simile: depellere.

## Halimus. CAP. CIII.

**H**alimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus: nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquantur ciborum gratia. Radix, conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsa pota: eadem lactis vbertatem facit.

## Paliurus. CAP. CIIII.

**P**aliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius sarsen pingue & fuliginosum inueni-



uenitur: quod potum tussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix adstrictoriam vim habent: quorū decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

Acuta spina. CAP. CV.

**A**cula spina, quam pyrinam aut pityanthen Officinariū aliqui vocant, arbor est pyrastro similis, spi Berberis. nosa valde & minor, baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidam, aliē descendentem. Huius bacca potu aut cibo, alui profluvium, & abundantiam feminarium sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut semel feriatur, aut perungatur.

Rubus canis. CAP. CVI.

**R**utex est arboris instar, rubo longē maior: folia fert multo latiora myrto, robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: seruefacti enim in vino, mox poti, arteriam inestant.

Ligustrum. CAP. CVII.

**L**igustrum arbor est oleæ folijs circum ramis similibus, latioribus, mollioribus, & Alcanna.

f



colore viridioribus flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia adstrictoriam vim habent: quare commanducata ulceribus oris medentur, illita feruidis inflammationibus, carbunculisque profunt, decocto eorundem igni ambusta fouemur, capillum rufant trita folia, quæ in radicis succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollitque; neruus: si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

## Tilia. CAP. CVIII.

*\*Xivw.* **T**ilia arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, nigrioribus & latioribus, fructu *\*len-* tisci, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis nascitur. Huius folia adstringunt: ad eadem uilia ad quæ oleaster, cum adstrictione est opus: maxime ad oris ulcera, commanducata, aut si decocto colluantur: pota urinam ac menses cient.

## Cistus. CAP. CIX.

*\*Vox ex Plinio reposita.* **C**istus, quem aliqui citharon, aut cissaron vocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis. flos *\*masculo* vi mali puniceæ, semina albet. Vis adstringens: vnde flores in vino austero bis in die poti, profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent, vetustati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistus, orobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices



radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liguatur acacia modo. Aliqui tamẽ exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliqua; vi in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, verum aliquantò magis siccatur, & adstringit. Prodest dysentericus, coliacus, sanguinem excreantibus: saninarum profusio & pota & indita.

Ladanum.

CAP. CX.

**E**st & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frut ex simili modo nascens, longioribus folijs & uigrioribus: quæ ueruo tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum vis adstringens, ac eosdem, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti Colligendi frondes pascuntur capræ, hirciq; pinguitudinem ladani non conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis duos. cruribus adhaerescens reportant: quam deperentes incole, colantesq; cognunt in offis, & ita recondunt. Alij verò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinosum, quale in Cypro gignitur. Arabicum verò Libycumque uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit, capillum fluentem continet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit, cum uino illu-

f 2



tum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit, pectus immistum vuluæ duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimq; finiunt, & malagmata vtiliter inferitur: album sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet.

Ebenus.

CAP. CXI.

**E**benus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, factitij cornu laeuore: cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque leniter adstringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tadio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatus segmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis: ceterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebena veneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resolvuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu praeferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres destillationes pustulasq; mirum in modum pollet: si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentave vino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli praetrita ipsa excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. Alij pro vino aqua utuntur. Vritur in fictili no-

uo,



no, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi  
vsti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus  
conducit.

Rosa.

CAP. CXII.

**R**osa refrigerat & adstringit, sed sicca multo  
magis. Succus recentibus folijs exprimitur,  
lesectis forfice vnguibus (sic appellantur candidæ Quid vno  
foliorum partes) reliquum in pila premi & teri quis in ro-  
lebet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculo-  
rum circumscriptiones recondi. Siccantur etiam num-  
olia rosarum, continuo versata, ne muceant, ne ve-  
ritus in ijs insideat. Aridis rosis & in vino decoctis  
expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium,  
oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini ac vul-  
væ, penna illitus aut infusus. Eadem sine expres-  
sione tusa, præcordiorum inflammationibus, hu-  
midis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest: sic-  
is ac tritis femina asperguntur. Misceri solent  
vulnerarijs antidotis, atque compositionibus,  
quas antheras vocant. Folia vruntur in calli-  
lephara. Flos, qui in medijs rosis inuenitur, sic-  
atus, gingivarum fluxionibus efficaciter insper-  
nitur. Capita pota citam aluum, & cruentas reie-  
ctiones sistunt.

Rosei pastilli.

CAP. CXIII.

**P**astilli, quos rhodides vocant, hac ratione  
conficiuntur: Rosarum viridium, quæ nullo  
antea humore madefactæ extabuerint, dra-  
chma quadraginta, Indicæ nardi drachmæ de-



cem, myrrha drachmæ sex, trita digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus æquent: siccatique in umbra, in fictili non picato, atque obturato reconduntur. Alij adijcunt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidem, & vinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium vice collo circumdato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. Tritus etiam vtuntur ad illitiones & diaspasmata, quæ sunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium. CAP. CXIIII.

**L**ycium, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: folijs buxi, densis: fructu piperris, nigro, leni, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi, & antè per multos dies macerati, coquuntur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absynthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamenti additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimũ, quod vri potest, restinctumque rubentẽ spumam ostendit, gle-  
bis



his extrinsecus nigris, intus, cum frigeris, rufis,  
 \*odore minime viroso, cum amaritudine adstringens. \*Ita ex Plin  
 gens, crocino colore (cuiusmodi Indicum est) ceteris nio.  
 praestantius atque efficacius. Lycium adstringit,  
 caliginem oculorum discutit, genarum scabiem,  
 pruritus, veteresque fluxiones sanat: facit ad puru  
 lentas aureis, exulceratas gingivas, tonsillas, labio  
 rum fissuras, sedis rimas, attritusque illi: cœlia  
 cis, dysentericis, potum inditumque conuenit: da  
 tur sanguinem excreantibus & tussi, ex aqua:  
 contra rabiosi canis morsus in catapotio deuor  
 ratur, aut in aqua bibitur: flavos facit pilos: re  
 duunt, ulceribus, quæ serpunt aut putrent, medea  
 tur: sceminarum profluvia appositum sistit: ra  
 biosorum ictibus ex melle potum, aut vice catapo  
 ti deuoratum, auxiliatur. \*Tradunt Indicum fieri Marcello  
 lycium, ex frutice lonchitide appellato: ea spina quæ hinc se  
 rum generi adscribitur, ramos rectos habens ter  
 quantur, no  
 nium cubitorum longitudine, maioresve, rubo cras  
 thia.  
 flores, à radice numerosos. Fractus cortex rubescit,  
 folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur  
 lienis inflammationibus & regio morbo mederi, \*Non est  
 & sceminarum purgationes elicere. Assueuerant genuina of  
 etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare. ficinarum  
 Semen cyathio dimidio potum, pituitam expurga  
 re: venenis quoque auxilio esse.

Acacia.

CAP. CXV.

quâvis ea  
dem vi ac

**A**Acacia in Aegypto nascitur spina instar ar  
 boris, fruticosa, non se in rectum attollens, diu.

f 4



Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in umbra: niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum. vlcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera: procidentes oculos reprimunt, mensuram abundantiam sistit, prociduum vuluam cohibet: citam aluum supprimit, aut potus aut subter inditus: capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Spinae decoctum solutos artus fotu committit. Prasertur eius spinæ gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum verò ac resinofum inutile. Cuius meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustus ex ovo illitum, pustulus non patitur erumpere. Alterum acaciæ genus in Cappadocia Pontoque provenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habens rutæ. Semen lentis  
ticula



icula minus fert autumnno, in loculis cōnexis, ter-  
mū quaternūve capacibus. Succus eius adstrin-  
git, viribus inferior, & ocularibus medicamentis  
inutilis.

Vitex. CAP. CXVI.

**V**itex siue lygos frutex est in arborem assur- Barbaris  
gens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; agnus ca-  
locis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, sin-  
stus. Et peruiaces: folia oliuæ, sed molliora. Duo gene-  
ra eius, vna harum album florem mittit cum  
purpureo: altera tantum purpureum, & semen,  
ut piper. Excalfactorias vires habet, & adstri-  
ctorias. Semen eius potū venenatis ictibus, aqua,  
quæ cutem subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euo-  
cat, menses ciet, drachmæ pondere in vino potum:  
genituram exoluit, caput tentat & soporē affert.  
Decoctum herbæ & seminis in defensione, mulieri-  
bus vuluæ malo opportunus opitulatur, item in-  
flammationibus: purgationes mouet semen cum  
pulegio potum, etiam suffitu vel appositu: capitis  
dolorem dissoluit illitum, instillatur cum aceto &  
oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffi-  
tu aut substratu fugant venenata: illita quoque  
serpentium morsibus auxiliantur: testium duri-  
tias cum butyro & folijs vitium emolliunt: rimas  
sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum fo-  
lijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virgam qui ma Nominum  
nu teneat dum iter facit, negatur intertriginem agni & ly-  
sentire. Agnum, quasi dicas castum, vocant Græci ratio.

f s



ci, quoniam matrone in thesmophorijs Athenien-  
sium castitatem custodientes, filijs huius cubitus  
sibi sternunt. & lygon quasi vimen, propter inui-  
etiam ferè ramorum flexilitatem.

Salix. CAP. CXVII.

**S**alix vulgo nota est: cuius semen, folia, cortex  
& succus spissandi vini habent. Trita folia  
cum exiguo pipere & vino pota, ileosis subueniunt:  
sumpta per se & cum aqua præstant mulieribus  
ne concipiant. Salignum semen in potu sanguine  
expuentibus prodest: cortex eosdem præbet effe-  
ctus. Cortex cinis admixto aceto maceratus, illi-  
tu clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice suc-  
cus cum rosaceo in calyce punici calfactus, au-  
rium doloribus auxiliatur. Decocto eorum poda-  
gras foueri vilissimum: fursures purgat in cor-  
pore. Excipitur succus, qui manat ex ea cum flo-  
ret, exciso cortice: in plaga enim concretus hu-  
mor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant ocu-  
lis, suam vim præbet.

Sylvestris olea. CAP. CXVIII.

**S**ylvestris olea, quam Latini oleastrum appel-  
lant, alij Aethiopiam oliuam, folia adstrin-  
gunt: trita autem & imposita ignem sacrum, vl-  
cera, quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, redu-  
cias nomasque cohibent: crustas emarginant  
cum melle illitæ. Quinetiam sordida ulcera repur-  
gant: inflammationes panosq; cum melle im-  
posita discentiunt: cutem à capite vulsam congluti-  
nant;



ant: oris vlceribus, & prinaalim infantium, com=  
manducata medentur. Succus & decoctum eosde  
habent effectus: sanguinis eruptiones, ac mulie=  
re profluuium, admodum succus inlibet: vna o=  
ulorum, pustulisq; prodest: vlcera & veteres  
lesiones sistit, (que propter in collyria addi=  
ur.) ad genarum erosiones perquam vilis. Ex pri=  
nitur succus iussis folijs, affuso vino aut aqua,  
siccatusq; sole in pastillos digeritur: sed longe va=  
lidior ad recondendum succus habetur, qui cum  
vino quàm cum aqua expressus est. Auribus sub=  
uenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Felia con=  
uenienter coliacis cum farina hordeacea illumi=  
tur: vruntur cum floribus folia, ut spodij vicem  
cinis præstet, in cruda olla, obliuio ore luto, vsque  
dum siglinum percoquatur: restinctaq; vino &  
rursus subacta, eodem modo vruntur, postremò ce=  
russæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusce=  
modi cinerem in medicamentis oculorum constat  
spodio non cedere, sed eisdem viribus præditum  
esse putandum est. Foliorum fatiue olea eadem  
vis intelligitur, sed aliquantò inferior: unde ocu=  
laribus medicamentis ob suam mitiorem vim con=  
uenientior est. Sudor ligno virenti accenso ma=  
nans, illitus sanat lichenas, furfures & scabiem.  
Oleaginum semen illitum medetur surfuribus, &  
vlceribus quæ depascunt vorantq;: quæ autem in=  
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros in=  
gues excutit. Colymbades tritæ & ambustis il=  
lue



lit & pustulas gigni prohibent, sordida ulcera purgant, muriæ succus collutas gingivas contrahit, & motus dentium firmat. Oliva flava, & recens stomacho utilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascentia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris olivæ gingiuis putri vligine laborantibus collinitur, dentium mobilitates stabilis, calfacta fotus gingiuis fluxione laborantibus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admoovere, donec albæ spectentur.

Lacryma Aethiopica olea.

CAP. CXIX.

**L**acryma, quæ Aethiopica olea stillat, scammonio similis quadamtenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax: quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustum mordens, superuacua est. Nostræ res olea, oleastrisque, similem lacrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albuginesq; illitu emendat, urinam & menses ciens, canis dentium impressa ad dolores efficax est: inter venena scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis olea.

**A**murca. CAP. CXX.

Amurca (expressæ olivæ recrementum) decoct



cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insup-  
 dentium dolori & vulneribus, cum aceto, vino  
 aut mulso commodè illinitur: additur in medica-  
 menta ocularia, & meatus inductu suo obstruē-  
 tia. Vetustate meliorem fieri constat. Utiliter in-  
 funditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulceratio-  
 ni. Si verò cum omphacino recoquatur ad mellis  
 crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumento  
 rum scabiem cum decocto lupini, & chamæleonte  
 illitu sanat. Cruda & recenti amurca podagras  
 articulariosque dolores foueri, utilissimum: perũ-  
 cta in villosa pelle, & hydropicis imposta tumo-  
 ris molem reprimat.

Quercus, glans, fagus, ilex.

CAP. CXXI.

**Q**uercus omnis adstrictoriam vim habet,  
 præsertim liber, qui cortici & ligno inter-  
 cedit: quinetiam tunica putamini  
 glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysen-  
 tericis, celiacis, sanguinem excreantibus. Trita in  
 pello, fœminis fluxione vuluæ laborantibus subij-  
 citur. Glâdes eosdem effectus exhibent: urinam  
 ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sumptæ  
 pariunt, resistunt esitæ venenatorum iclibus.  
 Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino  
 potum, prodest contra toxica: intritæ crudæ, in-  
 flammatiores illitu leniunt: ad duritias, quæ ca-  
 coethe vocant, & malefica vlcera cum salsa axũ-  
 gia



gia conueniunt. Iligne & glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & ilex quercus generi asstagnantur, & consimile munus obeunt. Iligne & radicis cortex cum aqua coctus, cum mollius intabescat, & tota nocte illutus, denigrat capillos, prius cimelia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillus membrorum partes corroborant.

Castanex. CAP. CXXII.

**S**ardianæ glandes, quas aliqui castaneas, aut slopima, aut glandes lous appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent: præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercursat. Carobis, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla. CAP. CXXIII.

**G**alla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed taberosa, solidula, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusque vis vehementer adstringere. Trita & excrecentia in carne, fluxiones gingivarum & vnae, atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus, denum cauernis inditus dolorem sedat. Cremata carbombus, donec igne flagrent & vino aut aceto aut acida muria extincta, sanguinem supprimunt. Decoctum, quibus insidetes, fluxionesq; Capillos denigrant, aceto aut aqua macerata, dysentericis celiacisq; cum vin

an



ut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibula  
ir: obsonijs addi debet, aut integra in aqua pre-  
equi, in qua nihil excoquendum est, quod his  
fectibus conferat. In summa, his utendum ad ad-  
ringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

## Rhus. CAP. CXXIII.

**R**HUS quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus Officinis *ser-  
erythros* appellata, semine est coriary fruti- mach, Ara-  
s, sic vocati, quoniam coriorum insectores eo vtun- bum more,  
ur, ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris  
ascens, binum ferè cubitorum altitudine, folijs  
longis, subrubentibus, in ambitu serratis, acina-  
uariu gracilium denso, magnitudine terebinthi,  
uadamtenus lato: cuius corticosa tunica per-  
uam utilis est. Folia vim habent adstringendi,  
& acacie effectus præbent. Decoctum capillos  
emigrat, dysentericus infunditur, & in potu eo-  
um in seßusq; adicitur: insillatur auribus puru-  
ntis. Gangrenæ & pterygia cohibent folia ex  
ceto aut melle illita. Liquamentum sit ex aridis  
lijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctus, ad  
idem, ut lycium, conueniens. Semen eosdem effe-  
lus exhibet: coeliacorum, dysentericorumque ob-  
nijs inspergitur: fracta, desquammata, luida q;  
litum ex aqua, ab inflammatione vindicat: lin-  
ne asperitates cum melle abstergit, candida foe-  
umarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat,  
um querno carbone intrito admodum. Aqua, in  
ua semen maduit, decocta, cogitur coüque effica-  
cior



cior ipso semine. Gummi defert, quod dentium ca-  
vus imprimatur, ad dolores finiendos.

Palma. CAP. CXXV.

**P**alma in Aegypto gignitur. Ea medio matu-  
ritatis vigore, autumnno decerpitur solet, Arabi-  
ci myrobalani similis, pomatis cognomine, colore  
viridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturi-  
tatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet.  
Palma acerba est & adstringens: contra alui  
fœminarumq; profluvia, in vino austero bibitur:  
hæmorrhoidas sistit, vulnera glutinat illitu. Phœ-  
nicobalani recentes plus siccis adstringunt, capi-  
tus dolorem afferunt, copiosiores in cibo inebriant,  
ficciores sanguinem excreantibus, stomachicis, &  
dysentericis utiles in cibo: illinuntur cum coto-  
neo & cerato œnantino vesicæ vitæ. Cariotæ,  
præsertim esu, faucium asperitati medentur. The-  
baicarum decoctum potu æstuationem sedat, vi-  
res recreat cum hydromelite veteri sumptum: ci-  
bo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem con-  
ueniens. Decoctum per se potu & gargari-  
zatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei pal-  
marum, cæterorum more, cremati in crudo fictili,  
& vino restincti, cinere loto, spodij vicē efficiunt:  
miscenturq; in calliblephara. Quod si non iustam  
ustionem acceperint, denuo cremandi. Vim ad-  
stringendi habent, & spiracula cutis obductu suo  
claudunt: contra oculorum ruam & pustulas,  
palpebrarum defluvia, cum nardo effectum præ-  
bent.



bent: corporis excreſcentias cum vino reprimunt, vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. CAP. CXXVI.

**P**alma, quam aliqui elaten aut ſpatham appellant, fructus palmarum adhuc florentium, inuolucrum eſt calyxq; quo in ſpiſſamenta vnguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adſtringens, ponderoſa, præcluſa, intus pinguis. Vis ei adſtrictoria: ſiſtit vlcera quæ depaſcunt, laxatos artus committit, trita miſceitur cataplaſmatis & malagmatis: prodeſt præcordijs, imbecilli ſtomacho, & iocineri affecto, miſta conferentibus cataplaſmatis. Eius decoctum ſubinde deterſum, capillos denigrat: datur bibendum congruè, renum, veſicæ, & viſcerum vitijs: vuluæ ac ventris fluxiones ſiſtit: ſcabiem cum reſina, & cera ſanat, ſi viginti diebus recens apponatur. Inuolutusque in ea elate fructus, quem ſuo amplexu fouet, elate etiam vocari ſolet, & ab aliquibus boraffus. Adſtringit, & ſpathæ effectus præſtat, non ſic vnguentis expetit. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit, quæ boraffus.

Malum punicum. CAP. CXXVII.

**M**alum punicum omne boni ſucci eſt, ſtomacho vulgò malum utile, perexiguum ſufficiens alimentum granatum. Dulcia ſtomacho utiliora habentur, ſed tum. aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, vnde in febre abdicantur. Acida ad-



stringunt, æstuant stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivasq; ledunt. Vinosa verò mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctive, fluentem alium stomachumq; sistunt. Calesci aqua madescent, bibunturq; commodè sanguinem excreantibus: ad desessus dysentericorum, feminarumq; fluxione vulvæ laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis ulcera, nomas, redunias, & ea, quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vitia: præsertim acidorum.

**Cytinus.**

Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant, quas punicum, præstant utilitates: humida gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto colluuntur, herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. memoria tradunt, qui tres quàm minimos cytinos deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exemplum.

**Malicorium.**

Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytino, præbet usus. Deco-

**Balaustium.**

easdem euocat. Balaustum sylvestris punici flos est, cytino similis, cuius complura genera reperiuntur: candidum, fulvum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstri-



adstrictoria vis inest, eadem faciens, quæ hypocias-  
tus, & cytinus.

Myrtus.

CAP. CXXVIII.

**M**Yrtus sativa nigra utilior est medicina  
quam candida, & in hoc genere multo  
magis montana: semen tamen imbecillius parit.  
Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viri-  
de aut aridum in cibo datur sanguinem excrean-  
tibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus  
baccis expressus eosdem effectus exhibet: stoma-  
cho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij  
morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis de-  
coctum capillum tingit, ius decocti in vino ulcera  
in extremis membris nata sanat, oculorum inflam-  
mationes illitum cum polline polentæ lenit, contra  
agilapæ illinitur, crapulam arcet præsumptum  
vinum, quod feruè factum aliquantum eius semine  
exprimatur: alias enim acorem contraheret. Præ-  
stat idem seminis effectus. Utile præcidentiæ vul-  
narum in desectionibus, sedis viri, & feminis flu-  
xione vuluæ laborantibus purgat furfures, ulcera  
capitis manantia, atque eruptiones papularum  
fluentes, cupillos continet. Additur quoque in me-  
dicamenta, quas liparas vacant, uti oleum quod  
ex filis eius factum est. Decoctum foliorum ad  
desectiones balnearum convenit, & contra laxa-  
tos artus, & male solidescentes. Eo facta ferru-  
minationi repugnantia utilissime foveantur, vitili-  
ginem emendat, purulentis auribus infunditur, &

§ 2 capit



capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, celiacusque profunt: & admixto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum feminumque perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsque medentur. Exprimatur folijs succus adfuso vetere vino aut aqua celesti, cuius recentis usus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires amittit. Myrtidaceum dicitur, adnatum inaequabile, verrucosum intumescensque, & concolor: quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. Magis quàm myrtus adstringit: tusum addito austero vino reponitur, coactumque in pastillos siccat in umbra, multò efficacius, & folio & semine, cerato, pestis, in sektionibus, cataplasmatibus admixtum, ubi adstringendum aliquid est.

## Cerasia.

## CAP. CXXIX.

Cerasia alio vtilia sunt, si viridia sumantur: eadem siccata, illam sistunt. Gummi, quod cerasi resudarunt, cum vim diluto tussi vetuste medetur: colorem commendat, visum exacuit, a potentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est.

Sili



## Siliqua. CAP. CXXX.

**S**iliqua recentes stomacho aduersantur, aluum Gracis Cessolunt: eadem siccata sistunt, stomachoque ratia: artiliores fiunt. Vrinam ciunt: sed præcipue, quæ bor autem vinaceis conduuntur.

ipsa Gale-  
no cerato=

## Mala. CAP. CXXXI.

**F**olia, flores, & germina cum omnis mali, nia dicitur. tum maximè cotonea adstringunt. Pomus acerbis adstringendi vis inest: maturis verò longè secus. Eæ uis vernabilem gignunt, nervos omneis ladunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, urinam ciunt: verum tota mitiora habentur. Prosunt caliacis, dysentericis, purulenta extusientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fomentur vuluæ, & sedes si procidant. Cotonea, quæ melle conduuntur, urinam mouent: mel autem sibi constringentem illorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmati adyiciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tuis expressuq: sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia.



que dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod melinum  
 vocamus, quo utimur quoties adstringenti oleo  
 est opus. Eligi oportet vera, que sanè sunt rotun-  
 da, parua & odorata: que verò Struthia dicen-  
 tur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos  
 & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs  
 conueniens, que adstrictionem desiderant, inflam-  
 matumibus oculorum, reiectionibusq; sanguinis.  
 Contra etiam aluum, & mensium impetus, in vi-  
 no bibitur. Melimela ventrem molliunt, & ab eq-  
 uo animalia expellunt, stomacho negotium exhibent.  
 Aestiuosa. Ea multis dulcia mala vocantur. Epi-  
 rotica mala, que Latine orbiculata dicuntur, sto-  
 macho utilia: sistunt aluum, vrinas euocant, ma-  
 lis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala  
 similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc  
 usum immatura omnia opus sunt. Persica po-  
 ma matura tam stomacho, quam veri utilia sunt.  
 Acerba aluum cohibent: sed sicca vehementius.  
 Decoctum è siccis alui stomachiq; fluxiones sistit.

Armeniaca, que a Latinis præcocia dicuntur,  
 minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

Medica mala Persicæve aut cedromela, qua  
 Latini ciuria vocant, nemini non cognita. Arbor  
 ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs de-  
 ciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est,  
 rugosum, colore aurum imitans, cum gravitate  
 odoratum, semen habet pyri. Id in vino potum ve-  
 nenis resistit, aluum mouet, oris suauitatem com-  
 mendat.



mondari, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia multioribus: vestiarijs impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

Pyra.

CAP. CXXXII.

**P**yrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt: promde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt: ielunos esitata ledunt.

Achras pyrastri genus est, quod tardissime maturescit. Vim pyro adstringentio rem habet, & ad eadem conuenit: stringunt etiã eius folia. Lignum pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos funghi strangulant. Aunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus.

CAP. CXXXIII.

**M**Espilus, quæ à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyracanthæ: fere pomum suauè, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturescit, esus adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui sciamum, alij epimelida vocant. Arbor folijs mali, sed minoribus: pomum fert rotundum esui aptum, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor.

CAP. CXXXIIII.

**L**otus arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gra-



tam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericus ac foemina fluxione vulua laborantibus, auxilio est rufat capillos, citam aluum cohibet.

Cornus CAP. CXXXV.

**C**ornus dura arbor est, baccas ferens oliuae modo oblongas, quae primum virēt, deinde per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant. In cibo adstringunt, profluuium alui atque dysenteriae salutes, siue in edulio, siue in defructo exhibeantur. Muria, ut oliuae, condiuntur. Sanies, quam virentia folia torrendo resudant, impetigini conuenienter illinitur.

Sorba. CAP. CXXXVI.

**S**orba colorem luteum referentia prius, quam maturescant, dissecta & sole siccata manduntur, ut album sistant. Eadem est functio molitorum farinae, si polenta loco sumatur: quod & decoctum eorum in potu praestat.

Prunus. CAP. CXXXVII.

**P**runus arbor est nota, cuius pomum estur sed stomachum malè habet, aluum molli. Syriae ca pruna, & praecipue quae Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt, aluum adstringunt. Folia pruni in vino decocta collutione, & gargariatu vram, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantibus reprimunt. Praestant idem syluestrium prunorum baccæ, post maturitatem exiccatae, cum sapa verò decoctæ, stomacho utiliores redduntur, aluum



luumque magis adstringunt. Gummi primo-  
rum agglutinat, potum in vino calculos commi-  
nit: ex aceto quoque illitum, lichenas infantium  
 sanat.

Arbutus. CAP. CXXXVIII.

**A**rbutus, siue vnedo, arbor est cotoneæ malo  
no dissimilis, tenui folio: \* cuius fructus pru- \* Prunis  
ni magnitudinem implet, nullo in us nucleo: huic magnitudi-  
nem acylo cognomen est: maturus aut flauet, aut ne quidem  
rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, ca- hic fructus  
pituiq; dolorem mouet. nequaquam

Amygdalæ. CAP. CXXXIX. cedit: cate-

**A**mygdalæ amaræ radicum tritarum deco- rum effigie  
Etum vitia cuius in facie corrigit: illitæ nu- adeò expres-  
ces idem munus præstant, menses admotæ ciunt, se refert fra-  
capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti aut tempo- ga, ut nil  
ribus cum aceto vel rosaceo: epinyctidas sanant queat ex-  
ex vino, item putrescentia vlcera, & quæ serpunt, pressius.  
& morsus canum cum melle: earum autem esu do-  
lores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt,  
urinam cient, contra sanguinis reiectiones cum  
amylo assumuntur, renum vitis, & pulmonum in-  
flammationibus ex aqua in potu aut eclegmate  
cum resina terebinthina dantur: calculosis diffici-  
liq; urine in passo auxiliantur, & illinctu cum  
melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus co-  
li, nucis auellanae magnitudine: quibus septenisve  
presumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vul-  
pes, si cum quadam esca eas vorauerint, emorin-



tur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reſcien-  
bus ſanguinem, potius auxilio eſt: impetigines, quæ  
ſummum corpus occuparunt, illud cum aceto  
tollit: inſiſi reſiſtæ cum diluto vino potum mede-  
tur: calculoſis cum paſſo bibere prodeſt. E nucibus  
græcis, dulces cibo idoneæ, ſed multo minus valent  
in remedijs, quàm amara: attamen extenuant, &  
rinam ciunt, recentium eſiæ cum ſuo putamine, hu-  
mida ſtomachi vitia emendantur.

## Piſtacia.

CAP. CXL.

**P**iſtacia, quæ conſtat in Syria gigni, pineis nu-  
cibus ſimilia ſunt, & ſtomacho amica: trita  
cum vino contra ſerpentium ictus proſunt, ſiue e-  
dantur, ſiue bibantur.

## Nux iuglans.

CAP. CXLI.

**N**uces iuglandes, quas nonnulli Perſicas vo-  
cant, ſunt difficiles concoctu, ſtomacho inu-  
tiles, bilioſæ, capitis dolorem inferentes, tuſſienti-  
bus inimicæ, & vomitibus ieiunis in cibo aptæ.  
Cum ruta verò & ficis præſumptæ, & à ſummo  
cibo, venenis reſiſtunt: nec minus ſi à veneni ha-  
ſtu comedantur: largius eſitatæ timeas latas pel-  
lunt, illinuntur mammarum inflammationi, ab-  
ſceſſibus, luxatisq; cū mellis exiguo, & ruta: cum  
capa autem ſale & melle, canis hominisq; morſus  
proficiunt: tormina, cum calyce ſuo peruſtæ, &  
umbilico admotæ, ſedant. Putamen combuſtum  
tritumq; in oleo, & vino, infantium capite perun-  
cto, nutrit capillum, alopecias replet. Si ſunt men-  
ſes



is nuclei vsti, si triti ex vino admoucantur: ydem  
veteribus, illi carbunculis, gangrenis, & agi-  
opys medentur: alopecys commandicati, & im-  
piti presentis sunt remedio. Nucibus iusis oleum ex-  
irimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt,  
ut pote suduiores: itaque allio mista eximunt acro-  
niam. Liures in corpore illitu tollunt.

Nuces auellane.

CAP. CXLII.

**N**Vces auellane, quas & leptocarya vocant,  
stomacho infesta sunt: ipsae tamen tritae, &  
in aqua mulsa potae, tussi veteri medentur: tostae  
& cum exiguo piperis potae destillationem conco-  
quunt, crematarum cuius cum axungia aut adipe  
vesti perunctus alopecys capillus reddit. Aium non-  
nulli vsta earum putamina, & incineris speciem  
redacta, cum oleo, caestorum oculorum pupillis in-  
fantibus denigrare, persuso sincipite.

Morus.

CAP. CXLIII.

**M**orus arbor nota est, cuius fructus aluum  
solut, stomacho inutilis est, & facile cor-  
ruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus:  
decoctus autem aere vase, atque insolatus, ad-  
stringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas,  
& tonsillarum inflammationes, addito mellis exi-  
guo. Sed inolefcit vis eius, adiecto scissili alumine,  
galla, croco, & myrrha: item myrica semine, iri,  
& thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq;  
acinorum rhois vice obsonijs miscentur, ut calia-  
cos innent. Radix cortex decoctus in aqua & po-

tus



ius aluum resoluit, latas ventris tineas excutit, his quoque auxiliatur, qui aconitum hauserunt. Folia irita ex aceto illita, ambustus igni medentur, tinguntq; capillum, vitium & fici nigra frondibus simul coctis in aqua celesti. Succus foliorum cyathu mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruesfacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

SYCOMORUS. CAP. CXLIIII.

**S**YCOMORUM aliqui etiam sycaminum, id est, smorum, vocant, cuius fructus sycomorū etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non ramus, ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossus, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi vngue aut ferro scalpatur. Nasceitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus. ubi proventus fecundo restibique iuuamentum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum alio vtile est, sed perquam exilem præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructū ferat, eximitur, lapidis iclu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga viol



ioletur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere  
icryma excipitur, quæ siccata & in pastillos  
pacta fidei vase reponitur. Vis succi emollit, vul-  
era conglutinat, discutit collectiones coctioni re-  
ugnantes: bibitur etiam aut illinitur contra ser-  
pentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores,  
& perfrictiones. Celerrimè teredinem sentit. Gi-  
nitur & in Cypro arbor genere distans, quæ  
iū sit vlmus, prædita tamen est folijs sycomori,  
ructu pruni magnitudine, multò dulciore, supradis-  
ta cætera similis.

Fici.

CAP. CXLV.

**F**ici matura recentes stomachum lædunt, ale-  
uum solvunt: sed facile contracta ab eis flu-  
cio sistitur: sudorem euocant, papulasq; sitim fee-  
lant, calorem restringunt. Siccis natura excal-  
aciendi, vires alunt, sed sitim magis stimulant,  
ilio utiles, rheumatismus ventris & stomachi con-  
traria: gutturi autem, arteria, renibus, vesicæ,  
& ijs, quos longa valetudo decoloravit, anhelato-  
ribus, hydropicis, comitialibus aptissime: feruæ-  
factæ cum hyssopo & potæ, thoracem purgant:  
usq; veteri, diuturnisq; pulmonum vitijs conue-  
niunt: alium molliunt. tussæ cum nitro & cnico,  
lein manducata. Decoctum arteriæ & tonsila-  
rum inflammationibus gargarizatu prodest.  
Cum hordeacea farina cataplasmati miscentur,  
& in muliebres fotus cum fenogrecæ & ptisana.  
Ceterum cum ruta coctæ torminibus infundun-  
tur.



tur. Coctæ illitæq; duritias discutiunt, parotidas & furunculos emolliunt, panos ad maturationem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addita. Cruda si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgant: cum atramento sutorio, deploratu ferè tiliarum fluxionibus, & cacoethicis ulceribus medentur: quin & cum vino decoctæ addito absymbia, & hordeacea farina, utilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant perianthas, pruriginas, somitûsque si cruda terantur, & sinapi liquoreque aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris, quàm sativæ fici lacteus succus coctus modo lac contrahit, concretumque dissolvit, ut acetum: exulcerat corpora, meatus aperit, solvit album, vulvam recludit cum detrita nuce græca potius, menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatibus cum farina fenigræci & aceto utilis: lepras, lichenis, vitiliginis, vitia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat: instillatus plagæ, percussus à scorpione, venenatorum ictibus & rabiosi canis moribus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & canis eorum additus: verrucarum infectiones tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, nisi exprimuntur, & siccat in umbra reponitur.



itur. Et lac & succus impmuntur exulceratorijs  
medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramis  
ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac effi-  
unt quod magis soluat, si inter coquendum ficul-  
neo surculo spatula loco moueatur.

Grossi.

CAP. CXLVI.

Grossi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ,  
illitæ strumas nodosq; omnes emolliunt: cru-  
æ formicas, verrucas & thymos, nitro farinaq;  
additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sa-  
& aceto ulcera in capite manantia, epinyctis  
as, & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes,  
& genarum scabritiæ perfricantur. Nigræ ficos  
lyis cauliculisq; candidæ vitilignes perunguntur,  
aciunt ad canum morsus, & ulcera quæ ceria, id est  
tuos, vocant. Grossi cum syluestri papaueris so-  
is ossa extrahunt, furunculos cum cera discutiunt,  
ontra muris aranei morsus, & scolopendræ vene-  
a, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur. Fit ex ci-  
ere ficos tam syluestris quàm satiuæ lixiuium, cre-  
iatis ramorum cauliculis: quod subinde macerari  
vise est & inueterascere: siquidem inter caustia  
i intelligitur. Gangrænis prodest: minque ex-  
urgat & consumit, quæ excrefcunt: eoq; sic uten-  
um est: Spongia assidue hoc lixiuo imbuta su-  
erponitur. Interdum dysentericus, & in fluxio-  
es vetustis, & sinus cuniculatim exedentes, ma-  
nosq; instillari conueniet. Etenim purgat, con-  
lutinat, carne replet, & oras committit, nō secus  
atq;



atq; emplastra, quæ cruentis vulneribus injiciuntur, enema vacant. Bibitur ad discutiendū sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, cōmussa, cum cyathis aquæ recentis colatū: addito olei exiguo, cœliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest in nervorū vitijs, convulsionibus commodè illinitur ex oleo, utpote quod sudores moveat: aduersus gypsi potum, & phalangiorū morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiua, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea. CAP. CXLVII.

**P**ersea arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem: in quo phalangia cranocolapta nomine inveniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinā redacta, illita sanguinis eruptiones sistūt. Arborem hanc proderūt aliqui in Perside exitiosam esse, trāslatāq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis. CAP. CXLVIII.

**I**beris, siue cardamantica, folia habet nasturtij, vere virētiōra: caulem cubitalem, aut minorem: in incultis nascitur, æstate lacteū florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes: ipsæ enim ischiadicis cum salsa xungia emplastri modo utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.


PRIMI LIBRI FINIS.



PEDANII  
DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE  
*Medicinali materia,*

*Liber II.*

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi  
interprete.



**I**N primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusq; disseruimus. In hoc autem secundo de animalibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acriter prædita sunt facultate, ut pote quæ cum ipsis cognitione iuncta sint: qualia allium, cæpa, sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur.

Echinus, siue erinaceus. CAP. I.

**M**arinus echinus stomacho ventrique utilis est: urinam cit, huius testa cruda inasata commodè medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt: cremata verò cinis sordida & acera expurgat, luxuriantem carnem reprimat.

h



Terrestris erinacei corium combustum alopecy-  
cum pice liquida aptissime illinitur, assiccatur  
corpus & cum aceto mulso potum, rerum vitis  
auxilio est: item aqua, quae cutem subijt, conuul-  
sionibus, elephantiae, & malè habitis, quos cache-  
ctos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem  
securi fictili solibus excocto arefactione, ad eosdem  
usus utilissime reconditur.

Hippocampus. CAP. XII.

Hippocampus marinum animal est exiguum,  
cuius cremati cinis exceptus cum liquida  
pice, aut axungia seu amaracino unguento illitus,  
alopecias replet.

Purpura, buccina, eorumque volute,

CAP. XIII.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, ex-  
crescentius in carne cohibet, ulcera purgat,  
& ad cicatricem perducit. Eadem præstant con-  
cremata buccina, sed vehementius vrunt: si quis  
salus plena, fictili crudo adurat, dentifricio conue-  
nient: ambustus utiliter illinuntur, quibus solui  
medicamentis non oportet: nam postea quum vul-  
nus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum  
induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx e  
buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus.  
Ciconia vocantur purpurarum buccinarumq; me-  
dia partes, circa quas testæ volumen clauicula-  
tim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem  
purpuris buccinisq; facultatem vrendi consequun-  
tur.



tur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles: sed aluum non molliunt.

Mituli.

CAP. IIII.

**M**ituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinus effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

Tellinæ.

CAP. V.

**R**ecentes tellinæ alio utiles, sed maximè iuscarum: salitæ vruntur, tritæq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

\* τ βλεφάρων  
ρωγ.

Chamæ.

CAP. VI.

**C**hamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus.

CAP. VII.

**V**nguis siue onyx conchylj tegumentum est, ei simile quo purpura integitur quod in Indis nardiferis lacubus inuenitur. suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquàm stagnantes aquæ æstiuis caloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans; pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspi-



citur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquāte-  
nus castoreum olent. Idem suffitu excitant scemi-  
nas vulvae strangulatu oppressas, comitialesq; poti-  
ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem  
efficit, quæ purpura & buccinum.

## Cochlex. CAP. VIII.

**T**errestris cochlex stomacho viles sunt, &  
non facile corrumpuntur. Optima Sardonia  
ca, Africana, Astypaleica, & quæ in Sicilia, ac  
Chio gignuntur, & quæ in Liguria alpibus, poma-  
tia, id est operculares, cognominata. Marina stoma-  
cho idonea, & facile alio excernitur: fluuiati-  
lis virus olet. Quæ verò repribus frutetisq; glu-  
tinata coheret, quam vocant nonnulli sesilon,  
ventrem & stomachum turbat, vomitiones exci-  
tat. Cremata omnium testæ excalfaciendi & vren-  
di naturam sortiuntur: purgant lepras, vitiligi-  
nes, dentesque: emendant oculorum cicatrices, &  
vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudi-  
nes, si cum carne sua vstæ tritæq; ex melle illinan-  
tur. Cruda cum tegumentis imposita, aquæ inter  
cutem tumores exugunt: sed non antè solvantur,  
quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflam-  
mationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ  
euocant, menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes ea-  
rum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera a-  
lia, tum maximè quæ nerui acceperunt, congluti-  
nant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpen-  
tem infrenant: vinct corpus, & præsertim Africana-



ne, cum aceto deuoratum, stomachi dolores miti-  
gat, trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum  
inde bibatur, coli vesicaeq; cruciatus sanat. Terre-  
stris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu  
leniore eius, pilum attingat.

## Cancris. CAP. IX.

**C**ancrorum flauiatilium exustorum cinis, quò  
duo cochlearia expleat, adiecto dimidio ra-  
dicis gentianæ modo, triduo potius cum vino, ma-  
gnopere prodest canis rabiosi morsibus: rimas  
pedum seduq; , perniunculos, & carcinomata,  
cum decocto melle lenit: triti crudi, potique ex asi-  
nino lacte, auxiliantur contra serpentium phalan-  
giorumque morsus, atque scorpionum ictus: deco-  
cti autem & cum iure esitati, ijs profunt, qui tabe  
conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt ne-  
cant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Pos-  
sunt eadem marini, verum inefficacius omnia præ-  
stant.

## Terrestris scorpio. CAP. X.

**T**errestris scorpio tritus & impositus, sue  
plagæ remedium est: quin estur assatus, ad  
eandem.

## Marinus scorpio. CAP. XI.

**M**arini scorpionis fel conuenit ad suffusiones  
oculorum, albugines, & hebetudines.

## Draco marinus. CAP. XII.

**D**raco marinus dissectus & apertus impositus  
iusq; ictus spina sua qua ferit, medela est.



## Scolopendra.

CAP. XIII.

**S**colopendra in oleo docta si illinatur, auellit capillos: sed contactu pruritus facit.

## Torpedo piscis.

CAP. XIII.

**M**arina torpedo diuturnis capitis doloribus admodum, cruciatus vehementiam mulcet: eadem apposita eversam sedem prociduumque coërcet.

## Viperæ.

CAP. XV.

**V**iperinae carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, nervorum vitis auxiliantur, incrementum strumas reprimunt: detracta autem cute caput caudaque, quoniam carne vacanti, amputari debent. quippe commentitium est quod præcipitur, certam virique mensuram præcidi oportere. Reliquum verò corpus exceptis interaneis elotum dissectumque discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt iis, qui viperas escent, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Vina autem vipera in fistile novum demittitur, adiciuntur salis caricarumque tritarum, singulatim quinque sextarii, mellis cyathi sex, mox fistilis operculum luto oblinitur, & fornacibus massatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerumque, ut ori gravior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

Senect



## Senecta anguim. CAP. XVI.

**S**enecta anguim in vino decocta dolori aurium, infusus & dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed precipue viperinam.

## Lepus. CAP. XVII.

**L**epus marinus liliigini parus similis est, qui per sese tritus, aut cum vitica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus, qui valetudine contracti sunt: affriclu aut cibo facilem infantibus dentitionem praestat: exustum caput & cum adipe vsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post triduum a concubitu potum, conceptum adinere, partusq; spem intercipere proditur: vuluae & alui fluorem sistit, comitiales inuat, contra venena ex aceto bibitur, praesertim aduersus concretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginesq; sanat.

## Pastinaca. CAP. XVIII.

**M**arine pastinacae radius, qui eius cauda Menatus aduersis squammis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam eos frangit, & euocat.

## Sepia. CAP. XIX.

**S**epiae coctae dum estur atramentum agre consequitur, aluum mollit, collyrijs e testula factis conuenienter genarum scabritia perficiantur;



ustum in sua testa donec id, quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat vitilignes, furfures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in medicamenta oculorum addi solet: contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorum absument, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis. CAP. XX.

**M**ullorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis moribus medetur, si crudus atque dissectus admoueat.

Hippopotamus. CAP. XXI.

**H**ippopotami testes exsiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur.

Fiber. CAP. XXII.

**F**iber ancipitis vitæ animal, plerunque cum piscibus & cancris ex aqua viclum capeffit. Huius testes serpentium venenis aduersantur, sternutamenta mouent, & in vniuersum varios obtinent usus: siquidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus secundasque eijciunt: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāque ex aceto bibuntur: lethargicos, & utcunque veterno obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illiti prosunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus nervorum vitis. In summa, calfactoriam vim habent. Eligi debent testes qui ex vno ortu conexi sunt (fieri enim non potest,



st, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiuntur) liquore intus veluti ceroso, odore rari & virus redolente, gustu acri, mordente, ac irascibili, naturalibus tunicis circumdato. Quæ si auri, aut ammoniacum cum sanguine & castorio abactum, & ita exiccantes. Vanum est quod tractatur, testes ab ipsis euelli, & à sese abici, quum reatu urgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, vt in sue, substrieli. Opera autem pretium est, diuina pelle melleum liquorem cum eueſtiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

## Mustela vulgaris. CAP. XXIII.

**M**ustela, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum vino pota, aduersus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius ventriculus coriandro farctus inueteratusq; percussus à serpente, & comitialibus potui auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine peruncle strumæ, iuuantur: comitialibus etiam prodest.

## Rana. CAP. XXIIII.

**C**ontra omnium serpentium venena pro antidoto sunt rana, si ex sale & oleo decocta edantur, iusq; earum itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollent. Illitus earum cinis profluentis sanguinis impetus sistit: exple-



dis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illi-  
nitur. Viridium ranarum cruor auulsos genu pi-  
los renasci prohibet, in vestigia euulsorum insul-  
latus: decoctus in aceto & aqua, dentium dolores  
collutione leniunt.

Silurus.

CAP. XXV.

**S**ilurus recens in cibo nutrit, & facilem præ-  
bet aluum: sale verò conditus, minimū suppe-  
dat alimentum. Arteriam expurgat, & vocem  
expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixæ corpo-  
ri spicula extrahit. Muria eius incipientibus dys-  
enterijs prodest, si in desidentium forus adijcia-  
tur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit:  
ischiadici infusi medetur.

Smarides.

CAP. XXVI.

**S**maridis piscis caput exustum, excrecentes  
ulcerum oris puluillosq; reprimat: nomas co-  
hibet, thymos clauosq; absumit. Caro non secus  
atque salsamentum prodest à scorpione percussis,  
aut à cane demorsis.

Manæ.

CAP. XXVII.

**M**anarum ex capitibus cims si illinatur, cal-  
losus sedis rimas abolet. Eius etiam garum  
oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

CAP. XXVIII.

**G**obius recens in sullum ventrem coniectus,  
si cõsuta rima in duodecim aquæ sextarijs,  
donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub  
diuo refrigeratus potui detur, alui sine molestia  
deijc



icitur. Illius contra serpentium canumq; mor-  
s auxilio est.

Thunus. CAP. XXIX.

**T**hrasitanei thumi caro, quam omotavichon  
vocant, sumpta ijs auxiliatur, quos vipera  
mine prester momorderit: sed oportet vinum  
uam plurimum subinde cogantur haurire, ita ut  
omissione reddatur. Contra acrimonijs sitatorum  
maxime valet, canum morsibus utilissime illinitur.

Garum. CAP. XXX.

**G**arum omne, quod ex piscibus carnibusque  
sale maceratis liquamen est, si ex eo factus  
at, depascentia ulcera sistit: morsis à cane mede-  
ur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: non  
nullis, ut exulcerata adurat: alijs autem, ad lace-  
enda, quae ulcera non senserunt.

Ius piscium. CAP. XXXI.

**R**ecentium piscium ius, modo per se, modo ex  
vino potum, alium subducit. Primalim ad  
unc usum conficitur è phycidibus & scorpionibus  
us, & iulide: è percis, & recentibus alijs saxati-  
ibus, nec virus resipientibus, simpliciter cum  
aqua, oleo & anetho.

Cimices lectularii. CAP. XXXII.

**C**imices, qui in cubilibus enascuntur, canis fa-  
barum inclusi, si ante febrium significatio-  
nes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: &  
citra fabas sumpti, percussis ab aspidē profum:  
vuluarum exanimationes olfactu reuocant: poti-  
cum



cum vino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: triti & urinaria fistulae impositi, urinae angustias leuant.

Millepeda. CAP. XXXIII.

**M**illepeda, quae sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus munita, quae contacta manu contrahuntur in orbem: haec ex vino pota difficili urinae, & regio morbo auxiliatur. Millepedas illini anginis cum melle utilissimum. Trita, & in cortice mali punici calfacta, doloribus aurium, addito rosaceo, convenienter instillantur.

Blatta pistrinaria. CAP. XXXIII.

**B**latta eius, quae in pistrinis inuenitur, inter branea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Pulmones. CAP. XXXV.

**P**odagras pernionesque emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus. Suillus & agnus ursinusque pulmo impositu attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus verò si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat. Adeps quoque liquefactus, infususque, auris dolorem finit.

Genitale cerui. CAP. XXXVI.

**G**enitale cerui tritum & in vino potum, à vi pera demorsis auxiliatur.

**V**ngula asini. CAP. XXXVII.

Ngularum asini cinis per dies multos bibi

ms



s cochlearibus potus proditur comitiales adiu-  
re, eadem oleo subacta strumas discutiunt: &  
ita per nionibus medentur. Caprinarum cinere  
cruncta ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. CAP. XXXVIII.

Ichenes sunt in equorum genibus, & \*su= \*κατ' ἐπι-  
per ungulas in flexu harum partium indu- γναφλῶ, nō  
ui calli: qui triti & in aceto poti, comitalibus ἐπιγρα-  
ederi traduntur. φλῶ.

Iocinera. CAP. XXXIX.

**A** Sini iecur inassatum esu comitalibus pro-  
dest, veruntamen ieiunis edendum præcipi-  
tur. Capræ verò inassati decidua sanie, inungi-  
sciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos  
alitu eius vaporari: prodest in cibo tostū ad ea-  
em. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales  
prehendi. Aprinum recens si arefactum tera-  
tur, ex vino potum contra serpentū volucrumq;  
morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagita-  
tur, tostū & in cibo ab emorsis sumptum, ne tē-  
antur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem  
ad arcendos aquæ pauores dente eò, qui caninus  
icitur. hunc à cane, qui momordit, exemptum, &  
alliculo inditum, pro amuleto brachio adnectūt.  
veteratum autem sale mergi iecur, ex hydrome-  
te binis ligulis potum, secundas pellit.

Coria veteramentaria. CAP. XL.

**V** Eteris cori cremati illitus cinis ambusta  
igni, intertrigines, necnon calceamentorum  
attri



atritus sanat.

Gallina.

CAP. XLV.

**D**issecta gallina, & adhuc calentes apposta, serpentium morsibus auxiliantur: sed identidem alias suff. cere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus, sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea verò inter coquendum alijs ci solet) siccat, tritaque in vino cõvenientissimè stomachicis datur in potu. Ius è vetere gallinaceo alium deijcit. Abiectis itaque interancus salem conijci oportet, & consuto ventre decoqui in viginti sextarijs aque, donec ad tres heminas redigantur: totum refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, cnicũ, aut filiculam. Crudos humores crassosq; , atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

Quorum natura. CAP. XLVI.

**O**rum moll. culum plus alri forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est: inassatum sedis inflammatio- nibus prodest, cum croco, & rosaceo: & condylomatibus, cum meliloto: cum vicia autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galli in patinis frigiat, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet.

Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta

cutis



itis ocludit, inflammationes oculorum infusum  
 ut, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas  
 non sentiant: faciem à Solis adustione tuetur, fron-  
 tis impostum cum thure fluxiones arcet, auer-  
 titque: inflammationes oculorum lama exceptum,  
 luto rosacco, melle & vino mitigat: vtiliter con-  
 tra hæmorrhoidis serpentis morsus crudum sorbe-  
 re: summè tepidum prodest vesicæ rosionibus, re-  
 um exulcerationibus, gutturis scabritie, reie-  
 ctionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis  
 reumatismis.

## Cicadæ. CAP. XLIII.

Cicadæ, quæ in assatæ manduntur, vesicæ do-  
 loribus præfunt.

## Locustæ. CAP. XLIIII.

Oculus odoris suffitu urinae difficultates ad-  
 iuuant, præsertim quæ feminis malè habet:  
 trum carnes nullo sunt in usû. Est & quoddam  
 genus locustæ, quæ astracos aut onos dicitur, sine  
 enim prælongis cruribus. Exiccata autem si ex  
 vino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere  
 proderit. Hæc abundè desuntur Aphris, qui Le-  
 tin incolunt.

## Ossifragus. CAP. XLV.

Venter eius auis, quam Latini ossifragum  
 appellant, particulatim potus, calculos cum  
 urina pellere prodest.

## Galerita. CAP. XLVI.

Galerita auicula est parua, apicem in ver-  
 tice,



tice, pavonis modo, gestans: quæ assa, & in cibo sumpta, coliacos adiuvat.

Hirundines. CAP. XLVII.

**D**issectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuventa corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, vii ficedule, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum, quam matrum in siethli olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, angina eo commodè perunguntur: rux & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuat, qui angina morbo conflantur.

Ebur. CAP. XLVIII.

**E**boris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. CAP. XLIX.

**S**uis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus coli, longisque torminibus medetur.

Ceruinum cornu. CAP. L.

**C**eruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus.



ius cum tragacantha: foeminis fluxione vulue laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili, luto circumli-  
o, & in furnum indito, vritur donec albescat: id admiæ modo elotum, vlceribus oculorum, & de-  
luxionibus salutare est: infriclum dentes expur-  
cat. Crudi cornu suffui iudore serpentes fugantur:  
serue factum in aceto, si eo gingivæ colluantur,  
maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca.

CAP. LI.

**E**RUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo  
peruncti, à venenatis bestijs feriri negantur.

Cantharides.

CAP. LII.

**E**FRUMENIS congestæ cantharides ad recon-  
dendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non pica  
o conduntur, & raro linteo obligato ore, & deor-  
um conuerso suspenduntur super aceti feruentis  
quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimen-  
tur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissima  
omnes variæ, luteis lineis, quas in pennis transuer-  
sas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattari  
modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ  
minus sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ.

CAP. LIII.

**S**IMILI modo reconduntur buprestes, genera quæ  
dam cantharidum, & pinorum erucæ quæ su-  
pra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper  
introita, reponuntur. Vis omnium communis ero-



dere, ulcerare, calorem elicere: qua de causa admi-  
scuntur medicamentis, quae lepras, ferasq; lichenas  
& carcinomata sanant. Menses ciunt pectus emol-  
lentibus additis. Aliqui cantharidas auidotis  
impositas, aquae subter cutem auxiliari prodide-  
runt: argumento, quod urinam moveant. Alij pen-  
nas pedesq; contra poturum veneficia, remedio esse  
tradiderunt.

## Salamandra.

CAP. LIIII.

**S**alamandra lacerta genus est, iners, varium,  
quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vini  
habet erodentem, calfacentem, exulcerantem.  
Additur, ut cantharis, in medicamenta, quorum  
vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo re-  
conditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exentera-  
ta, detractus pedibus & capite in melle servatur  
ad eundem usum.

## Araneus.

CAP. LV.

**A**raneus, quem holcum, alij lycon, id est lupu-  
rus, vocant, subactus cum splenio, & linteo illi-  
tus, proleusq; virisq; temporibus aut fronti, tere-  
tianos circuitus persanat. Tela eius imposita sano-  
guinem sistit, vulnera, quae summam cutem occu-  
parunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est  
& alterum aranei genus, qui candidam, tenuem,  
densamq; telam creditur: quem in aluta ligatum,  
& lacerto appensum, quartanis circuitibus mede-  
ri narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, auris  
doloribus auxiliatur.

Las



## Lacerta.

## CAP. LVI.

**L**acerta caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixia extrahit: varos, formicantes verrucas, & pensiles, quas acrochorodons vocant, tollit. Iecur ex esis dentibus coniectis dolores finit. Si diuisa admoueat, ictus à scorpione leuamentum præstat.

## Seps.

## CAP. LVII.

**S**eps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota morsus suos sanat.

## Scincus.

## CAP. LVIII.

**S**cincus aut Aegypti, aut Indiae, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritania. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt \*Idiorçois carnes, quæ renes amplectantur, id sibi viriū vendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, veneremur, & in accedant. Verum decocto lentis cum melle aut semi lactucæ cum aqua poto, veneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

## Terreni vermes.

## CAP. LIX.

**T**erreni vermes impositi, præcisos nervos glutinant, tertianas discutunt: decocti cum anserino adipe, & infusi, affectus auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant auxilium: tritum in potu ex passo urinam ciunt.

## Mus araneus.

## CAP. LX.

**M**us araneus dissectus, & impositus, suis



morsus veneficia luit.

Mures.

CAP. LXI.

**M**Vres, qui in domibus oberrāt, concisos scor-  
pionum plagis vtilissimè imponi, in confes-  
so est si massatos infantes ederint, oris saluā exic-  
cari promittunt.

Lac.

CAP. LXII.

**L**Ac generatim omne boni succi est: corpus  
alut, aluum emollit, stomachum & intestina  
inflatione vexat: vernum tamen dilutius æstiuo  
habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit.  
Probatum autem candidum, aequali crassitudine,  
quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus  
tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringenti-  
bus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondi-  
bus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde  
stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouillum  
autem dulce, crassum, & præpingue, non vsque-  
adeò vtile stomacho. Bubulum tamen, asinum,  
& equinum, ventri magis idonea: sed ipsum tur-  
bant. Quibus in locis pecora, scammoniam, vera-  
trum, clematidē, aut mercurialem pascuntur, lac  
omne ventrē & stomachum subuertit. quale in Iu-  
stinis montibus esse, à nobis produitū est. Siquidem  
capræ, quibus candidum veratrum pabulo fuerit,  
primo foliorum partu euomunt: & eorum lac hau-  
stum nauseam creat, & stomachum in vomitiones  
effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum,  
præcipueq; candentibus calculis marinis exustū:



& in summa, omnibus auxiliatur internis exulce-  
 rationibus, præsertim faucium, pulmonis, interas-  
 teorum, vesicæ & renū: foris verò contra pruritiū  
 cutis, eruptiones papularum, & vitiatos corporis  
 humores, recens cum melle crudo, addito sale, datur  
 exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcūque se-  
 nel feruefactum. Decoctum cum calculis marinis  
 ad dimidias, ulcerosas ventris fluxiones adiuuat.  
 Lac quodcūque seruum continet implicitum, quod  
 ubi discescit a lacte, multò potentissimum ad pur-  
 gationes redditur. Datur quibus sine acrimonia  
 volumus derectionem moliri, ut melancholicis, co-  
 mitialibus, lepris, elephantys, & erupentibus toto  
 corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum,  
 id est scissile, appellant. Lac autem fictili nouo fer-  
 uet, ramoq; ficulneo recenti mouetur, si sparsis,  
 postquam bis aut ter efferbuerit, totidem acetū  
 mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim  
 ferescens liquidū ab eo diuiditur, quod in caseum  
 concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, con-  
 ueniet sponsa ex frigida continuo fictilis labrum  
 detergere, sextariumq; argenteum frigida aqua  
 plenum demittere. Bibitur heminis per intervalla  
 singulis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus  
 spatiis, potantes ambulent. Lac autem recens ef-  
 ficax est contra rosiones vstionesq; ab exitialis  
 his medicamentis factis: uti à cantharidibus, aut  
 salamandria, bupreste, aut pistorum eruca, hyo-  
 scyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: præfer-



tim bubulum ad id eximie confert. Gargarizatur  
autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum  
peculiariter collutos dentes gingivisq; stabilis. Flu-  
xiones alui, si ulcera sentiuntur, tenesmosq; nullum,  
bubulum aut caprinum cum marinis lapillis deco-  
ctum, sistit: per se autem & cum hordeacea ptisis  
na aut halicaceo cremore infusam magnopere in-  
testinorum rosiones mitigat: exulcerata vulva im-  
mittitur. Humanum lac dulcissimum est, & ma-  
ximè alit: mammae autem exuctum, prodest tabi,  
& stomachi rosionibus: contra haustum leporem  
marinum praesidio est: oculis cruore ex ictu suffusis  
cum thuris polline instillatur: podagricis utile est,  
cum melle, & cerato illitum. Lac omne respuen-  
dum plenitudo, hepaticis, comitialibus, vertiginosis,  
& nervorum vitio laborantibus, febriculosis, &  
capite dolentibus: nisi si quis interdum purgatio-  
nis gratia, ut ostendimus, schistum praebet. Pri-  
miparae canis lacte perunctos narrat glabrescere:  
potum contra venena antidoti vicem obtinet, abor-  
tus mortuos expellit.

## CASCUS.

## CAP. LXIII.

CASCUS recens sine sale sumptus alit, stomas-  
cho utilis est, & facile in membra delega-  
tur: corpus auget, aluum modicè emollit: alius ta-  
men alio praestantior, pro natura lactis, à quo con-  
ficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde in-  
assatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflamma-  
tionibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens  
salis



alitus est, minus alimēti præbet: corpus aptè mi-  
nit, stomacho aduersatur, negotium ventri inter-  
neisq; exlubet: vetustiore sistitur alius. Sero,  
quod à caseo manauit, quàm optimè canes aluntur.  
Quod hippacē vocant, caseus est equinus: ea virus  
edolet, magnopere alit, bubulōque proportionē re-  
spondet. Nec desunt, qui hippacem, equinum coagu-  
m appellarint.

Butyrum & eius fuligo. CAP. LXXIII.

**E** Lacte pinguisimo probatū si butyrū, quæ-  
le ouillum est: sit & ex caprimo, agitato in  
vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum na-  
tura oleosum est & emolliens: unde Ligiū epo-  
m, ventrē resoluit: prodest, ubi oleum non adfue-  
rit, contra venena. Cum melle si infricetur, den-  
titiones adiuuat: gingivarum pruritus, & oris vl-  
cera infantibus emendat. Illud foris capaciora  
alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis  
per summa scatenibus asserit. Contra inflamma-  
tiones & duritias vuluæ, quod nec virus respicit,  
nec vetustatem sentit, butyrū efficax est: dysenter-  
cis, & coli exulcerationibus infunditur: in medi-  
camenta addi solet, quæ pus mouent: vile præse-  
tim cū nerui, aut cerebri mēbrana, vesicæ ceruix,  
vulnera acceperit. Id autem purgat, replet, car-  
nem creat, ab aspide percussis vtilissimè imponi-  
tur. Recens obsonijs additum olei vicem pensat,  
& adipis vice fungitur in bellarijs. Colligende ex  
eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernā no-



nam ingestum accenditur, sicilique operculato quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cinuculos clibanus modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad usum. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exicare & adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

Medicina lanarum. CAP. LXV.

**S**uccidæ lanæ molles, è collo feminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, luidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut vino imbutæ: siquidem facile succos combibunt quibus immerguntur, & ob pecudum sordem [sic enim aspidem vocant] emolliunt: capitis, scilicet machi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrecentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem & carptæ, in sicili crudo, ceterorum more, vruntur. Nec secus fimbriati marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in sicili oris patuli, verucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatis



im interstratis, leuiter succendunt, & vstas tollunt: quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluat, collecta recoditur. Lavatur ad oculorum melicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & cōsidere patiuntur: idq; sepius, nutantes aquam, donec linguam adstringat, nec mordeat.

## Oesypum CAP. LXVI.

**O**esypum vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinē. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua lavantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, uti respuet, agitur, aut lignea rude validiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur, confidente pingui quod supernatabat, collectoque in altero fictili vase, denuò aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum æsypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia, confestim demitur: exclusaque sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguæ æsypum adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur: tum in fictili vase conditur. Verum omnia seruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigie



da aqua eluunt, & manibus, non secus atque ce-  
 ratum mulieres, confricant: ita enim candidius  
 redditur. Alij elotus latus & sordibus quibuscumq;  
 exemptis, ac lento igne in aeneo vase ex aqua de-  
 coctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, ut  
 diximus, lauant: colatumque in fœtilem patellam,  
 quæ calidam aquam contineat, lineo operiunt,  
 atque Soli mandant, donec calidum fiat, & satis  
 crassum. Alii b. dui spatio aquam effundunt, no-  
 uamq; adiciunt. Melius est laue, radícula non cu-  
 ratum, quod succida: ñ virus oleat, & si manu in  
 concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil  
 in se duri aut concreti habens: veluti quod cerato  
 aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, ex-  
 plet vlcera, & emollit: præsertim sedis ac vuluæ,  
 cum meliloto & butyro in vellere appositum, men-  
 ses & partus euocat, vlcera non aurium modò sa-  
 nat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra  
 erosos angulis oculorum, scabiososque, genas, quæ  
 occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficax est. In  
 testa noua torretur, donec redactum in cinerem  
 pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colli-  
 gitur, uti demonstrauimus: quæ in oculorum me-  
 dicamenta commodè addi solet.

Coagulum. CAP. LXVII.

**I** Eporus coagulum tribus obolis ex vino, vene-  
 ratorum morsibus, cæliacæ, dysentericis, &  
 feminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reie-  
 ctionibus à pectore, auxiliatur. Sanguinem in grus-  
 mos



os concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant: potum verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocant, priuam coeliacis dysentericisque conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capreæ & luicornis, & dorci, aperi, cerui, vuli, bubalique coagula similes naturas sortiuntur: contra aconiti potum in vino, & concretum lac in aceto, conuenienter assinnuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires reseruant: comitialibus, strangulatis vulnus, potum conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animalis, tum præcipue agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natari possunt. In summa, coagulum omne dissipata coagit, & coacta dissoluit.

## Adeps.

## CAP. LXVIII.

**A**deps anserinus aut gallinaceus recens, & sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniā concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantum sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligenter

ter



ter vase, flagrantissimo Soli exponitur: eliques-  
cens inde humor in fictile alterum excolatur,  
donec ad ps omnis absumatur, mox loco vehe-  
menter frigido reconditur, & ad vsus digeritur.

Aly fictile fulcium super aquam calidam, aut te-  
nuem & elanguidam priorem, quæ Solis vicē pen-  
set. Est & alia curandi ratio: Exemplis mem-  
bris teritur, coniectisque in ollam eliquatur,  
adiecti minuti salis momento: mox lineo colo-  
transfusus reponitur. Utiliter in medicamenta  
additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant.  
Smillus adeps & rsinus hoc curantur modo: Re-  
cens, præpinguis, renibus potissimū detractus, in  
largiore aqua cælesti, & quam frigidissima, exē-  
pius tuncis, diligentissimè manibus confricatur,  
& exprimendo fermè siccatur, subindēque noua  
aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis duple  
induitus, in aquam demergitur, & subditis leui-  
bus prunis spatha mouetur: eliquatusque colo-  
transfunditur in aquam: ubi verò refruxit, & gut-  
tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-  
le demittitur, & infusa aqua leniter eliquari de-  
bet, & manu deprimi, quò facilius feculentum vi-  
rus pessum ear: postea in pilum sponsia madesa-  
etam transfunditur. Vbi coire cæpit, residens in  
imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliqua-  
tur, & purgatusq; fictili benè operculato, perquam  
frigidis locis reponitur. Hircinum seum, ouillum,  
cervinumq; ita curato: Elotum ex his quodcumq;



tunicis, (vt in suilli mentione dictum est) exem-  
 ptus, pila emolliendum tradito, ac manibus frica-  
 to, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quic-  
 dem cruentum virus excernatur, aut pingue ali-  
 quid innatet sed nitida spectetur. Deinde in ollam  
 fictilem conijcito, & adiecta aqua, vt superemi-  
 neat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in  
 aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fi-  
 ctili eliquato, & quæ ante diximus facito. Tertiò  
 sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam  
 colato, refrigeratūq; vt in suilli ratione diximus,  
 recondito. Bubulum autem seuum, renibus maxi-  
 mè detractum, exemptis membranis, aqua mari-  
 na ex alto petita eluendum est: mox in pila tun-  
 dendum diligenter, affusa maris aqua. Cum ve-  
 rò dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijci-  
 endum, & marina aqua, quæ non minus didrante  
 superemineat, proluendum, decoquendum donec  
 omnis aboleatur odor, additis ad singulas seni  
 Atticas minas, quaternis Tyrrhenica ceræ dra-  
 chmis: excolatūque, detractis quæ pessum ie-  
 rant sordibus, in nouo fictili reponendum: operi-  
 tumq; Soli interdum credendum, vt ad candorē re-  
 ducatur, & odoris virus euanescat. Priuatim  
 taurorum pingue sic curari debet: Renibus euul-  
 sum pingue prius fluente amnis aqua abluito, detra-  
 ctisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum sa-  
 lem insperseris, liquefacito: dein in nitentē aquam  
 excolato, & ubi concrefcere cœpit, manibus ite-  
 rum



rum conficandi, vehementer lauto, aqua sepius  
 infusa refusaq; donec quam optime elotū videatur:  
 rursus in olla cum pari modo vini odorati deco-  
 quito, & cum iterum effervuerit, depto ab igni va-  
 se, ibidem finito pernoctare: postridie si grauter  
 adhuc oleat, nova olla repetitū, vino odorato per-  
 fundatur: eadem quæ prius fiant, dum omne virus  
 evanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim af-  
 fectionum earum causi, quibus sal adversari so-  
 let, sed ita paratum non magno pere albescit. Eo-  
 dem modo pardorum ac leonum pingua curari  
 oportet. Taurinum autem & vitulinum pingue,  
 necnon ceruinum, atque etiam huius animalis  
 medulla, odorem in imbuitur, hac ratione: Ping-  
 gue, quod odoratum reddi debet, demptis, quæ di-  
 ximus modò, membranis, elotum & viro quam  
 odoratissimo, nulla maris aquæ diluio, sernefactū,  
 pernoctare sinitur: alterū id genus vinum eadem  
 mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè co-  
 latur: novemque eius heminis, uncæ Arabici se-  
 ptem drachmæ adyiciuntur. Quod si ipsum odo-  
 ris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris  
 eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami,  
 & casie modis adyiciuntur: & xylobalsami, aspa-  
 lathi singulæ drachmæ: cinnamomi, cardamo-  
 mi, & nardi, singulæ uncæ: omnia exactius tun-  
 duntur, & affuso vino odorato, in vase operto,  
 quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter  
 effervescunt, & semoto ab igne vase inibi perno-  
 ctant:



Elant: posttridie vinum effunditur, aliudq; generis  
 eiusdem adijcitur. Ter simili modo bene conferva-  
 scat. Deinde matutinus exempto adipe vinum ef-  
 fundatur, & abluto vase, si quid imo subsidens ha-  
 sit, detergatur. Postremò eliquatum pingue & ex-  
 colatum, ad rursus reconditur. Hoc autē modo odor-  
 ramentis imbuitur, quod antea curatum est. Ver-  
 rüm antè dicta prius inspissari solent, quò facilius  
 sibi odoramentorum vires adsciscant. Itaque assus-  
 mens quodcunq; horū voles, cum vino feruefacito,  
 impositus vnā myrti ramulis, serpyllo, cypéro, item  
 asspalatho plenius iuso. Aliqui tamē ad hūc usum,  
 vno duntaxat horum contenti sunt. Cum autem  
 ter efferbuit, exemptum leniter, & luteo colatū,  
 aromatis, uti expositum est, imbuitur. Adipibus  
 spissamenta sic fiunt (quemcunque acceperis, opor-  
 tet ut recens iundatur.) Syncerus & sanguinis  
 expers adeps, reliquas habens notas, quis sepe  
 retulimus, in ollam nouam demittitur, infuso vino  
 albo, vetere, odorato, quod semipedis altitudinem  
 superet: lento igni feruescat, & dum vernaculus  
 odor aboleatur, planēque vinum redoleat. At  
 ubi deposito vase refriguit, duæ adipis minæ in ol-  
 lam mittuntur, & duo vini eiusdē sextarij, & se-  
 minus loti, eius, inquā, cuius è ligno ludicra tibi  
 factitantur, tusi minæ quatuor adijciuntur: lento  
 igni subinde miscendo decoquuntur, cumque odo-  
 ris virus euauerit, excolatisque adeps refrigex-  
 rit, vna comust asspalathi mina, cum amaracia-  
 mō



ni floris minis quatuor, & vetere vino subigitur.  
 Nocte una hac odorem rapiunt, combibuntve.  
 Postridie in fictilem ollam tricongialem ea om-  
 nia cum adipis iniecta, additis sextarijs tribus  
 vini, una feruescunt, quousque & vim & odorem spi-  
 samentorum adeps ipse contraxerit: qui elique-  
 scens colatur, & reponitur. Quod si maiorem odo-  
 ris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam  
 pinguisimae myrrhae vino maceratae, quod multos  
 in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus an-  
 serinusque sic odoribus imbui solent: Cuiusvis eorum  
 percurati sextarii duo fictili olla excipiuntur: ery-  
 sifceptri, xylobalsami, palmae elatae, & calami  
 plani contusi, singulorum sesquuncia admiscetur:  
 vini Lesbii veteris cyathus unus adijcitur: ea ter  
 effervescunt prunis, mox vase sublato ab igne, die  
 nocturne refrigerantur: postridie liquata per lin-  
 teum crassum, mundum in vas excolantur. Vbi ve-  
 ro adeps coierit, concha excipitur, fictilique nouo  
 densius operto perfrigidus locus reponitur. Hyber-  
 no tempore id instituere oportet: aestate siquidem  
 pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrheni-  
 cae cerae momentum adijciant, quod facilius in  
 unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione  
 suillus adeps & ursinus, caeterique id genus, odora-  
 mentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps  
 ipse representabit hoc modo: Curati quam opti-  
 me adipis, praesertim taurini, mina una, tempesti-  
 uique sampsuchi exquisitè confracti, sesqui mina mi-  
 scen



ſcentur, & inſperſo largiore vino digeruntur in of-  
fuſus, que in vaſe cooperto nocte quieſcunt: matutino  
in ſicula olla leui ſculo igni, affuſa aqua, leui-  
ter coquuntur: dumq; ſuum adeps odorem exuerit,  
defecatus ac bene opertus, nocte tota permanet:  
poſtero die deterſa ſorde, que peſſum ierat, ſam-  
pſuchi, vt dictu eſt, contuſi iterum ſeſquimina prio-  
ri paſtillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogi-  
tur: alijs que diximus peractis, decoquitur & co-  
latur: & ſi qua ſiſſendo hæſit ſpurcicia, deraditur,  
& frigido loco reconditur. Si quis tamen incur-  
ram adipe anſerinum, gallinaceu, aut vitulinum, à  
putredine tueri velit, ita faciendum eſt: Quemuis  
adipẽ diligenter elotum & ſiccatum in vmbra ſu-  
per cribro, per lintea munda manibus vehemen-  
ter exprimat, linoq; conſutum vmbroſo in loco ſu-  
ſpendat, & poſt multos dies noua charta inuolu-  
tum, frigido loco recondat. Pinguis autem indito  
melle vindicatur à putredinis vitio. Vis omnium  
eſt excaſſare, mollire, rareſcere. Taurinus a-  
deps, bubulus, & vitulinus aliquantum adſtrin-  
gunt: earundem virium copos leoninus: nam reſi-  
ſtere ei aiunt ijs, qui inſidias moluntur. Cernuo,  
elephantinoq; perunctos, ſerpentes fugiunt. Ad-  
ſtringentior eſt caprinus: qua ex cauſa decoctus  
cum polenta, rhoẽ, & caſeo, dyſentericis datur, &  
cum piſanæ ſucco inſunditur. Ius decocti phthi-  
ſicis in ſorbitionibus prodeſt. Datur quoque utili-  
ter ijs qui cãtharidũ venena hauſerũt hircinus, vt

k



qui validissimè discutiat: podagricis auxiliatur, cum fino caprea & croco impositus: huic preparatione respondet ouillus. Suillus verò contra vulnè & sedis vitia idoneus est: ambustus igni medetur. E sue vetustissimus quisq; si le cōditus excalfacit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asinum tradunt cicatrice corporis concolores reddere. Anserinus gallinæ censq; cōueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonix, andam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos vitio alopecie capillos restituere, peritombus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluuiatilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Vipera adips contra oculorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis emulsos perunctis radicibus recens & per se illitus obliterat, atque renasci non patitur.

## Medulla.

CAP. LXIX.

**L**audatissima est ceruina, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus: qui parte cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, nisi quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullæ molliunt, calfa



calfaciunt, rarefaciunt: vlcera expleant, ceruina  
perunctis venenata fugiunt. Curantur recentes,  
adipis modo, aqua respersu subacta, selectisq; assi-  
bus tantisper elota, & in lineum expressa, do-  
nec aqua sincera emanet: & deterfa sorde penna,  
si qua innalet, liquata in duplicato vase in pilam  
exprimuntur: & ubi coiere, omni fece, quæ ad ima  
sedit, derafa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet  
incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum  
& gallinarum adipe demonstrauimus.

Fel.

CAP. LXX.

**F**el omne curatur hoc modo: Recens præli-  
gato ore folliculi lino tandiu demissum in fer-  
uentem aquam, dum quæ spatium trium stadiorum  
percurset, mox exemptum siccatur umbroso lo-  
co, asperginem non redolente. Sed quod ad oculo-  
rum medicamenta adijci solet, ligatum lino in  
vitreum vas, quod mel habeat, immittitur: cir-  
cumuoluto ad os vasis lini principio, & aperto va-  
se recorditur. Est enim vis omnium acris & ex-  
calfaciens: intensis tamen & remissis viribus diffe-  
runt: siquidem præstantius in effectu esse vide-  
tur fel marini scorpionis, & piscis qui callionys  
mus appellatur, marine testudinis, hiæneq; item  
perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris  
capræ: quod priuatim prodest contra suffusiones  
incipientes, & oculorum caligines, argemas, &  
genarum scabritias. Ouillo, suillo, hircino, atque vr-  
sino, taurinum multò efficacius. Felle omni perfa-

k 2



cilem, praesertim infantibus, deiectione quis molies-  
tur, si intinctum eo tomentum aut simbria sedis sub-  
iciat: Priuatim taurino anginae cum melle perune-  
guntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usque  
perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum  
mulisbri lacte aut caprino instillatum, medetur:  
& sibilo earundem ex porri succo. Admisceri in-  
suenit vulnerarijs emplastris & circumlitioni-  
bus, quae contra venenata parantur. Phagedeni-  
is ulceribus, colis & scroti doloribus, ex melle  
prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimo-  
lia quam optime purgat. Ouillum & ursinum con-  
tra eadem pollut, verum inefficacius haec praestant.  
Ursinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testu-  
dinum anginis, & in ore infantium nonis prodest:  
naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium  
caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sa-  
nantur. Hircinum idem obit minus, thymia abo-  
let, & luxuriantes elephantorum extuberatio-  
nes illitus reprimat. Suillum autem contra aurium  
ulcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

CAP. LXXI.

**S**anguis anseris, anatis & hae di, utilissime in  
antidota miscetur. Palumbi autem, turturis  
& columbae, necnon perdicis, oculis cruore suffu-  
sis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisque  
alluntur. Peculiariter columbae sanguis, cruorem  
membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci,  
caprae, cervi & leporis sanguis in assatus sartagi-  
ne,



ne, dysenterias & celiacorum profluvia sistit: in vino potus contratoxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, vitia cutis in facie, lentiginesque emaculat. Caninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminoque contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitque. Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt, septica vocant. Sanguine chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc enim viridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis foeminarum, circumlitu conceptum inhibere existimatur, aut si omnino mulier menstrua supergrediatur: leuat podagræ dolores & ignem sacrum illitus.

Fimum.

CAP. LXXII.

**A**mentaria bouis fimum, si recens admodum ueatur, vulnorum inflammationes mitigat: folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus fotu compescit: illitum ex aceto duritias, panos, & strumas discutit. Præuatim suffitu fimi, quod à masculo bove redditum est, procidentes vuluæ reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

k 4



Fimum caprarum, praesertim in montibus degentium, potum in vino, regium morbum emendat: menses cit cum odoris haustum, & partus evocat: tritum in farinam, & impositum laniis cum thure, feminarum profluvia sistit, caeterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet: medetur alopecys exustum, & cum aceto aut oxymentrie illitum: cum axungia vero impositum, his, qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium morribus, ulceribus quae serpunt, igni sacro, & paroridibus. Vilem ischiadici vitionem hunc in modum accipiunt: In eo interstitio ubi pollex brachiali committitur, caua veluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substermitur, deinde sigillatim fruentes stercoris caprini pilula impinguntur, dum vapor per brachium ad coxam sentiatur pervenire, & coxendici dolorem mitigare: adusio id genus Arabica appellatur. Onicium ex aceto illitum sanat epinyctidas, claudos, pensiles verrucas, hymos, & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suis sylvestris aridum, in aqua aut vino potum, reiectiones sanguinis sistit: vetustum lateris dolorem mulcet, adrupta & convulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum quam equorum fimum siue crudum siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentary, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in vino, mox potum.



potum, contra scorpionum ictus magnopere auxi-  
liatur. Columbinum vehementius & excalfacit  
& urit, cum hordeacea farina mustum strumas  
ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tri-  
tum cum melle, lini semine & oleo: ambustis igni  
medetur. Gallinaceum verò omnia eadem, sed  
inefficacius præstat: priuatim tamen contra ve-  
nena fungorum, & coli cruciatu ex aceto aut  
vino bibitur. Ciconia finium, si ex aqua hauria-  
tur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini si-  
mi nidore partus excuti produuntur. Murinum  
detritum cum aceto, & illitum, ad peciys mede-  
tur: cum thure & mulso calculos expellit: sub-  
dita infantibus muscerda, alui deiectionem pro-  
mouent. Caninum quod flagrantissimo canis sy-  
dere fuerit exceptum, cum vino aut aqua potum,  
sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera  
ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere  
non patitur sed ea statim glutinat, sicco ex melle  
anginae perungi commodissimè iraduntur. Tera-  
restre crocodili finium, crocodileam vocant, quæ  
mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; ser-  
uat. Optima est candidissima & friabilis, amyli  
modo, minimè pôderosa, in humore statim eliques-  
cens: quæ cum teritur, fermenti acorem quadam-  
tenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo,  
quos captos oryza pascunt, ipsumq; non dissimile  
vendunt. Alij amyllum aut cimoliam miscent, &  
adscito anchusæ colore per rarum cribrum paula-



tim exprimunt, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui sic aut pro crocodilea veneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

Vrina. CAP. LXXIII.

**H**umanam urinam suam cuique bibere, contra viperæ morsus, ac venena, incipientemque aquam inter cutem proderit: scorpionis, viperæ mariorum, draconisque morsus ea conuenientissime fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus & lepras nitro addito expurgat, sed vetus ulcera capitis manantia, surfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit: nomus, & præcipue genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decoctaque in calyce mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginisque, ex ea & cupro idmeum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subsidit, illius ignem sacrum mitigat: feruesfactum cum cyprino, inditumque, vuluæ dolores mulcet: strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamque per aluum extrahit.



extrahit, aurium doloribus instillata medetur.

Afinina traditur renum vitis mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coirere in calculi darditiam, vulgò creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quòd pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Afininae urinae potu renum vitia sanari traduntur.

Mel. CAP. LXXIIII.

**P**incipem locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odora- Mellis pro-  
tius, sublauium, nec humectum, graue, & mini- batio qua-  
mè fluxum, quid ob sequacem lenitiam non faci- lis.  
lè abrupitur, tractumque resilit in digitos.

Mel abstergerendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida vlcera sinisque commodissimè infunditur. Decoctum atque impositum, abscedentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitum, item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & sæda capitis animalia illitum necat, nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum cali-

k s



ginem discutit, faucibus, tonsillis, angina collu-  
tum gargarizatumve medetur: urinam ciet, aus-  
ciliatur tussi, & à serpente percussus: contra hau-  
stum meconium, cum rosaceo calidum assumitur:  
aduersus venena fungorum, & rabiosi canis mor-  
sus linctum aut potum proficit: crudum tamen  
alium inflat, tussim laceffit, & ea de re despumatum  
vsius aptior est. Prunatum tenet in mellis gene-  
re vernum, deinde æstiuum: hybernium vero, ut  
pote quod crassius constat, deterrimum reputatur.

**Mel Sardinicum** ceraginis halitum expirat. Quid in Sardinia gi-  
doum amaguntur mel, amarum est: quomā apes inibi absyn-  
thio vescantur quo vitia cutis in facie & macula

apertissime perunguntur. Heraclie in Ponto qui-  
busdam anni temporibus, propria quorundam flo-  
rum dote, mel conflatur: quod qui edere, mente  
abalienantur, ac sudore disfluunt. Remedio sunt,  
esitata ruta, & salsamenta, aut epotum mulsum,  
resumpta, quoties vomitione reijciuntur. acre au-  
tem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod  
cum costo illitum, siennarum cutem emendat,  
& cum sale sugillationes rapit. Est & aliud con-

**Saccharum.**

creti mellis genus, quod saccharon nominatur.  
In India vero, & felici Arabia in arundinibus  
inuenitur: salis modo coactum est. denitibus, vi sal,  
fragile, alio idoneum, & stomacho utile, si aqua  
dilutum bibatur: vexata vesica remibusq; auxi-  
liatur, illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum  
pupillis offundunt.

**Cera,**



## Cera. CAP. LXXV.

**C**Era optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitum quadāntenus melleū referens, natione Ponica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album sincerūque, atque transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alio patinæ, inspersequē nitrī momēto, decoquunt: cumq; iterum tertiore inferbuit, separatum vas refr. gerant, ac cerā pastillum eximunt, deterfa sorde, si qua forte adhæsit: tū denuò indita noua maris aqua fernet, uti retulimus: & vase dempto ex igne, fundum olulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu inungunt, quò celerius concreseat, & quā minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum vasis inum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immittē debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino consuti, internaciē spatio, suspenduntur, & interdū, contūnuò sub sole, noctu sub luna asperguntur, usq; dum perfectē albescant. Verū si eximius ille candor desideretur, eadem faciliari, & identidem recondi operæ pretiū est. Nec desunt, qui pro marina, in muria quā acerrima semel aut uerū excoquāt: dein laguncula tenui, rotūda, ansam habente, extrahunt postea orbiculos, substrato affatim cespīte herbofo, insolant, donec candorem summū contraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus vere,

CUM



cum sol remissa vehementia humorem pariat, ut non facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, modice explet corpora: datur in sorbitione dysentericis, ac milij magnitudine decem grana ceræ hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Propolis. CAP. LXXVI.

**P**ropolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in vehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat: aculeos, & omnia infixæ corpori extrahit, in vetere tussi suffita proficit, impetigines admodum tollit: ea in alueariorum soribus, cerosæ naturæ inuenitur.

Triticum. CAP. LXXVII.

**O**ptima est tritici generibus ad secundæ valetudinis usus habentur, quæ recentia, & iam perfecte adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tinea gignunt, canum morsibus prosunt, mansa & imposita: confectus eorum similagine panis, plus alit, quam cibarius, est trimestrium farina panis leuior cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Item contra interaneorum inflationes, lentigines ex acetomulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: viperarum ictibus auxiliantur, & torminosi pro sunt



sunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahendiq; vim habet: priuatim callos pedū, clauosq; extenuat, & cætera tubercula furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra venenatos ictus cum aceto aut vino cōmodissimè illinitur: eadem si decocta in glutini modum delin-  
gatur, cruentis excreationibus proderit: contra  
tussim, & exasperatas arterias, cum menha &  
butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex a-  
qua mulsā, aut hydreleo decoquatur, omnem di-  
scutit inflammationem. Panis & crudus, & co-  
ctus cū aqua mulsā inflammationes omnes illitu  
mulcet, cū emolliat, & quadātenus refrigeret:  
sed herbis succisve huic rei accommodatis admi-  
sceatur. Vetus panis aridus, adiectis convenienti-  
bus, citam aluum cohibet. Recens muria macera-  
tus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum  
ex similagine, & polline, quo chartæ glutinatur,  
sanguinem excreantibus prodest, si liquidus ac te-  
pidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum. CAP. LXXVIII.

**H**ordeum optimum est candidum purumq;:  
id minus quā triticū alit. Ptisana tamen  
ob cremorem in decoctione redditū, plus alimentū  
præbet, quā polenta ex hordeo facta. Contra  
acrimonias atque gutturus scabritias, exulcera-  
tionesq; pollet: quibus etiam triticea ptisana præ-  
sidio est: sed plus alit, magisq; vrinam mouet. Lac  
abundè suppeditat, si cum fœniculi semine deco-  
cta



Et sorbeatur. Hordeum absterget, urinam cit,  
inflationem parit, stomacho aduersatur, tumore  
concoquit. Farina hordeacea decoquitur in malsa  
aqua cum fico, ut inflammationes collectionesque  
discutiat: duritias cum resina, & fimo columba-  
rum concoquit: cum melioto autem, & papaueris  
calyce dolores finit, qui latius excruciant: aduer-  
sus intestinorum inflationes cum lini semine, fo-  
nograco, & ruta, illini iuuat: strumas cum pice li-  
quida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad con-  
coctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut  
malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, aliu-  
proflumia sistit: podagricis inflammationibus, cum  
cotoneis aut aceto prodest: decocta in aceto,  
modo quo hordeaceum cataplasma, & calida im-  
posita, lepram medetur. Cremor vero farinae ex a-  
qua, atque cum pice, & oleo decoctus, puri mouen-  
do est: cum aceto subactus uidem, & cum pice  
contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex  
his aluum cohibet, inflammationesque mitigat.

Zythum. CAP. LXXIX.

**E**X hordeo potius fit, cui Zytho nomen est  
Is urinam cit, renes & nervos tentat, mem-  
branis, praesertim cerebrum resistentibus, officit  
inflationem parit, vitiosum succum creat, elepha-  
ntiasin gignit: persusum Zytho ebur, obsequiosum  
& operi tractabile redditur.

Curmi. CAP. LXXX.

**F**it & ex hordeo potius, quae curmi nominant  
eoque



roque sepe potus pro vino viuntur: verum dolorē capitis monet, malum succum gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

## Zea seu semen. CAP. LXXXI.

**Z**Ea duorum generum est: vna simplex, alie= Vulgò spelta. In geminis putaminibus grana bina iuncta. Ela gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quàm hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quàm triticum alens.

## Crassior farina. CAP. LXXXII.

**C**rimmon crassior est ex Zea triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, facile conficitur, aluum vehementius adstringit, si Zea, ex qua fit, prius torreatur.

## Siligo. CAP. LXXXIII.

**E**idem generi siligo adscribitur, sed minus alit quàm nutrit: in panes, ut Zea cogitur. Fit quoque è siligine crassior farina, quam Græci crimon vocitant.

## Athera. CAP. LXXXIIII.

**A**thera ex Zea fit tenuissimè molita: est autem sorbitio, quasi liquida pulicula, infantibus conueniens, & cataplasmati eff:cax.

## Tragos. CAP. LXXXV.

**T**Ragos quondam halicæ frugis figuram gerit: multò minus, quàm Zea nutrit, quòd multam aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluumq



aluumq; magis emollit.

Avena. CAP. LXXXVI.

**A**Vena genicula quædam habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes parvulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata, ut hordeum. Pulvis huius aluum sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza. CAP. LXXXVII.

**O**Ryza frugum generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum suppressit.

Halica. CAP. LXXXVIII.

**H**alica fit ex Zea, quam dicoccon appellamus: plus alit, quam oryza: aluum magis cohibet, stomacho longè vilior. decocta in aceto illitaque lepras tollit, unguium scabritia extricat, incipientibus ægilopys medetur. Decocti dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium. CAP. LXXXIX.

**M**ilium in panes coactum, minus ceteris frugibus alit, sistit pulvis sua aluum, urinancit. Torretur milium, fervensq; in sacco ponitur ut torminibus, reliquisq; doloribus, si foveatur auxilio sit.

Panicum. CAP. XC.

**P**anicum, frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodemque modo in pane subi.



subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

## Sesama. CAP. XCI.

**S**esama stomacho inutilis cibus, halitus graui-  
tatem facit, quoties inter mandendū commi-  
suris dentium inhaesi: nervorum crassitiem illius  
discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflam-  
mationibus, coli doloribus, & cerastæ morsibus:  
capitis dolores, qui estuatione concitantur, ex rosa  
tea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, præ-  
sertim inflammationibus oculorum doloribusque  
prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

## Lolium. CAP. XCII.

**L**olium, quod inter segetes nascitur, molitum  
illitu nomas, putrescentia ulcera, gangra-  
nas; emarginat: sanat cum raphanis, sale & ace-  
to ferros lichenas, & ex aceto, & sulphure viuo, le-  
pras: strumas quoque discutit, cum fimo colubino,  
& lini semine decoctū in vino rumpit, quæ agrius  
ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua  
musa, vtilissime ischiadici illinitur: si cum polen-  
ta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptio-  
nem adiuvat.

## Amylum. CAP. XCIII.

**A**mylum ex eo appellatum est, quod sine  
mola fiat. Optimum ex trimestri, natione  
Creteum aut Aegyptium. Ratio faciendi amy-  
li hæc est: Purgatum trimestre triticum made-  
scit quinq̃ dies, & si fieri potest, nocte: cum



emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor vilis rui excludatur, ubi mollissimum esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi furfures in cerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisque siccatum tegulis novis confestim torreatur flagrantissimo in sole: namque si paulisper vltimum maneat, a corem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaque vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lacti atque obsonijs admiscetur. Fit etiam amylum ex Zea, quae maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subacta farinae modo manibus subigitur: pressaq; feruentissimo in sole, vt ante retulimus, exiccatur: nullius in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Fœnumgræcum. CAP. XCIIII.

**F**œnigræci farina vim habet emolliendi discutiendiq; in aqua mulsâ decocta aduersus tam internas, quàm externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius feminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pesti vice subiiciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus

ten



tenesmos, foetidamque dysentericorum proluuiem.  
Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos  
& genitalium cicatrices absterget.

Linum. CAP. XCV.

**L**inum vulgò notum est, cuius semen easdem,  
quas fœnumgracû, vires habet. Discutit, &  
emollit omnem intus forisque inflammationem, cum  
melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle co-  
cto exceptum: vitia cutis in facie varosque crudum  
tollit, illitum cum nitro & ficulneo cinere, paroti-  
das duritiasque discutit: ulcera, quæ serpunt, fa-  
nosque, cum vino decoctum expurgat: ringuesca-  
bras eximit, cum pari modo nasturtij & mellis:  
vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis  
vicem substituitur: tussim lenit, venerem stimu-  
lat, si farina piperis, & melle exceptum, pro placen-  
ta largius adsumatur. Huius decoctum interaneo-  
rum vuluæq; erosionibus immittitur, alui excre-  
menta emocat, ad vuluæ inflammationes in desec-  
tionibus perquam utile.

Cicer. CAP. XCVI.

**C**icer sativum alio idoneum est, urinam ciet,  
inflationem parit, colorem comendat, mem-  
bra ac partus expellit, lac auget, cum eruo deco-  
ctum illinitur ad inflammationes testium, verru-  
cosas inforicationes, ad scabiem, ulcera capitis  
manantia, impetiginésque: contra carcinomata, &  
ulcera, quæ cacœthe vocantur, cum melle & hoc Cicer arie-  
deo prodest. Alterum genus arietinum nomina-  
tum.



tur: utrunque cit urinas, dato cum rore marino, hydropicus aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Ladunt ea exulceratam vesicam, & renes. In verrucarum formicantiū pensiliūmq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana linteolo deligata abici post se precipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod satiuam præstat.

Faba. CAP. XCVII.

**F**aba inflationem excitat, agrè concoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnē gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & celiacorum profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes, quæ vulnus excitauit, mitigat: cicatrices concolores facit, turgentes grumoso lacte manimas, etiam si inflammatione tententur, adiuvat: Lac restinguit, furunculōs, sugillata, parotidasque cum finigraci farina & melle discutit: cum rosa anem, thure & oui candido, præcidentes oculos, tumores, vnaq; reprimi: subactum vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in  
vi



vino testium collectiones sanat: quò tardius pubes erumpat, pueris imò ventri illinitur: vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui p<sup>er</sup>st<sup>it</sup> cuiul<sup>us</sup> sionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimēti capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo imp<sup>er</sup>siti cortices, strumas discutiunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: namque eas suppressit, si semiscela apprimatur.

## Faba Aegyptia. CAP. XCVIII.

**A**Egyptia faba, quam aliqui Ponticam vocant, in Aegypto \* plerunque prouenit: in \*  $\pi\lambda\alpha\gamma\epsilon$  Asiae etiam Ciliciæq; lacubus, inuenitur. Folia id est, plurè habet ampla \* etiam si ad arborum frondes com<sup>ma</sup>parentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine: \* Sic Plin. florem roseū, dupla papaueris amplitudine: & ubi lib. 21. cap. flore exuitur, fert folliculos vesparum fauis similes. Græculles, in quibus faba supra operculum, bullantis am<sup>pl</sup> habet, w<sup>is</sup> pullæ modo, prominet. Ciborion aut Cibotion ideo  $\pi\acute{\epsilon}\tau\alpha\sigma\omicron\nu$ , nominant, id est arculam, quoniam seratur ipsa, id est instar humentæ glebæ mandata, & ita in aquam demis<sup>ga</sup>lери. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctâve estur: ei colocasia nomen est. Faba vi<sup>re</sup>ns manditur, & exiccata nigrescit, vulgare<sup>ma</sup>gnitudine superat. Adstringendi facultatem ob<sup>ti</sup>net, & stomacho vtilem: dysentericis, celiacisq; prodest, in parso, polenta & vice, lomento: datur



quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio ride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

CAP. XCIX.

**L**ens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, agrè coquitur, stomachum malè habet, eumque & intestina inflat: sed alium cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddēs. Vim habet adstringendi: quæ ex causa alium cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primæque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmone inutiles: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quæ post decoctionem abiciuntur, vel vuarum rhois, quæ obsoniis insparguntur: verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, aliàs alium conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat, decocta in aceto



aceto duritias & firumias discutit, cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisque, addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusque, ut antea dictum est: contra mammas, in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

## Phasioli. CAP. C.

**P**hasioli instant, spiritus cient, agrè coquantur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

## Eruum. CAP. CI.

**E**ruum paruus frutex omnibus cognitus, an= Officinis gusto folio, tenuis, semina in valuelis habens, orobus, græ è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi ca appellatus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluum tione vocatus turbat, sanguinem per urinam extrahit, elixatur. boues saginamur. Paranda farina ratio hæc est: Vberiora grana candidaque deliguntur, permiscendoque aqua respergunt, donec sufficienter combibant: postea torrentur, usque dum lians cortex distrupatur, molitæque, farinario cribro incernuntur, postremo farina reconditur. Hæc aluo vilis est, urinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicam aut aluum cum torminibus eli-



cit, si largius in cibo aut potu assumatur: ulcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculas totumque corpus emendat: nomas, gangrænas, duritiasque, serpere non patitur: mammarum duritias emollit, atra ulcera, quæ theriomata vocant, fauosque emarginat, carbunculos rumpit: cum vino subacta illitu morsibus viperarum, canum, hominumque medetur: urinae difficultates tenesmosque, ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad iucis magnitudinem melle exceptum, sumptumque, conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Lupini.

CAP. CII.

**S**atius lupinus notus est: cuius farina cum melle delinctu, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum ruta & pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem ulcera tetra, quæ theriomata vocant, gangrænas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, vitiligines, maculasque fouere utilissimum. Menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuoresque corrigit, inflammationes cum polenta & aqua mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit, strumas in aceto cocta illitæque dissipat, carbunculos rumpit. Decocti cælesti aqua, don



donec in cremorem lentescant, faciem abster-  
gunt: medentur pecorum scabies, cum radice ni-  
gri chamæleontis, ita ut tepente decocto abluan-  
tur. Cit urinam radix cum aqua cocta. Lupini  
irriti, ubi maceratu dulcescere coeperint, cum ace-  
to poti, fastidium detrahunt, & cibi aviditatem  
faciunt. Gignuntur & sylvestres lupini, satius  
similes, sed omnino minores, qui eadem, quæ sativi  
possunt.

## Rapum.

## CAP. CIII.

**D**Ecocta rapi radix alit, inflationem parit,  
humentem ac fluxam carnem creat, venerē  
stimulat: decocto podagræ, pernionisque fouetur,  
contritæq; rapo atque imposito iuuantur: si exca-  
uata radici rosaceum ceratum adigatur, & fer-  
uenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus  
proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & uri-  
nam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præser-  
tim quæ sensum doloris auferunt, anodina vocât,  
idoneum est: potum contra venena salutare est,  
venerem concitat. Rapum muria conditum, mi-  
nus alimenti sufficit: sed multo magis appetentiam  
recreat. Sylvestre rapum in aruis nascitur, \*fru- \* Vox ex  
ticosum in cubili altitudinem assurgens, ramosum, Plinio ada-  
læus: in cacumine folia fert læuia, digitali latitu-  
dine, aut maiora: & fructum in siliquis calycula-  
tis: cumq; eorum inuolucra aperiuntur, alia intus  
siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem  
præbet, in qua semina paruula concipiuntur, fo-



rus nigra, intus alba. Additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, utimur: præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

Napus.

CAP. CIIII.

**C**octa napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenarum vires hebetat, antidoti admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

CAP. CV.

**R**adix (quæ Græcis raphanus dicitur) ex-calfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciēt, urinam pellit, alio aptior: summo tamen cibo sumi debet, quod magis eius distributionem adiuvet: quum autem præsumitur, cibum suspendit: quare vomituris commodissimè datur ante cibum. Sensuum aciem excitat: decocta contra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissimè illinitur, lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & vomus amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum reducit, lentigines cum loliaea farina emendat, his qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen vomitiones facit, urinam mouet, menses cit, lienem extenuat, cum aceto illitum gangrænas validissimè emarginat: coctum cum aceto mulso anginis perquam utiliter gargariatur, contra cerastis morsus, potum ex vino, auxi-

lia



lio est. Syluestris raphani, quam Romani armo-  
raciam vocant, folia satiuo similia, sed magis lami-  
psanam imitantur: radix gracilis, \* tenera, sub \*μαλακή,  
acris. Tam folium quam radix in olera recipitur: id est, molle  
sed hæc excafacit, urinam concitat, æstuosa est. *lis.*

Sifer.

CAP. CVI.

**S**ifer vulgo cognitum, cuius radix decocta ori-  
grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, &  
appetentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. CAP. CVII.

**E**X generibus rumicis, oxylapathum vocant, Officinis la-  
patium. Quod in acutum tendit, dura habens extre-  
ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi  
dissimilis. Tertium genus syluestre, paruum, plan-  
tagini proximum, humile & molle. Quartum est  
quod alij \*oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon \*Acetosa.  
vocant. Folia eius syluestri ac exiguo rumici si-  
milia, caule non magno, semine subacuto, ruben-  
te, acris, in caule & agnatis appendicibus, emican-  
te. Omnium decocto olere alius emollitur. Crudi  
illitu, melicerides, rosaceo aut croco adiecto, di-  
scutiuntur. Syluestris & oxylapathi, & eius, quam  
oxalida nominant, semen ex aqua aut vino rti-  
liter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum  
affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod  
si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu pa-  
tietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, le-  
pras, impetigines, & scabrosos vngues persanant:  
sed antea locus aceto & nitro in sole perficandus



dus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat,  
 si foveatur, aut in solis balnearum confricetur.  
 Coctæ in vino & instillatæ, aurium dentium-  
 que dolorem mulcent, strumas parotidasque di-  
 scutiunt, lienem cum aceto extenuant. Aliqui  
 amolendus strumis radicum gestamine vinuntur,  
 eas collis appendentes. Tritæ & admotæ femina-  
 rum profluvia sistunt: cum vino autem potæ re-  
 gio morbo medentur, calculos vesicæ comminuunt,  
 menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur.  
 Hippolapathenolus est magnum, in paludibus na-  
 scens: easdem habet vires, quas supradicta rumicis  
 genera.

Lampfana.

CAP. CVIII.

**L** Ampfana sylvestre olus est: plus alit quàm  
 rumex, & stomacho vilis. Cuius folia cau-  
 lesq; coquuntur in cibo.

Blitum.

CAP. CIX.

**B** litum estur oleris modo, alio utile est, mul-  
 tius in medicina vsus.

Malua.

CAP. CX.

**M** Alua sativa, esui longè aptior sylvestri:  
 stomacho aduersatur, aluum inuat, sed mul-  
 tò magis caules: interaneis & vesicæ utilis. Cru-  
 da folia cum salis exigua manducata, agylo-  
 pas ex melle sanant: verum cum cicatricem trahere cœ-  
 perint, ea demum citra salem utendum est. Con-  
 tra aculeatos apium vesparumq; ictus illita effi-  
 cax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti, non  
 fer



feriuntur. Vlcera manantia in capite, furfuresq;  
cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustus de-  
cocta folia, tritaq; vtilissimè ex oleo imponuntur.  
Eius decoctum vuluas in seissione mollit: prodest  
erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, se-  
disq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice  
sua, contra omnia venena auxiliatur, si cōtinuò à  
bibentibus reuomat. Contra phalangiorum morsus  
remedio est, lac euocat. Semen in vino potius addito  
loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

## Atriplex. CAP. CXI.

**A** Triplicem aliqui chryslachanon vocant,  
cognitum olus est. Duo eius genera, syue stre  
& satium. Coctum estur, vt olus. Alium mollit,  
panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur.  
Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum  
sanat.

## Brassica. CAP. CXII.

**B** Brassica satia alio est idonea, si modò leui-  
ter feruefacta edatur (nam percocta alium  
sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixi-  
uo coquitur) stomachum autè malè habet: acrior  
est æstima. In Aegypto propter amaritudinem non  
estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest:  
summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini no-  
xam restinguit. Melior stomacho cyma, sed ac-  
rior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condi-  
ta stomacho inimica est, alium conturbat. Cru-  
dus succus cum nitro & iri deuoratus alium emol-  
lit



lit: cum vino quoque epotus viperarum morfibus auxiliatur: cum fœnigræci farina podagrus & aricularum vitis illinitur: prodest & sordidis ulceribus & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;: epinyelidas, ignem sacrum, leprasq; sanant, carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent: coctâ, addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrenasq; valent, lienosisq; ex aceto cruda prosunt. Mansa, deuorato succo, retusam vocem instaurant. Decoctum eius potu, alui & menses ciet. Flos post conceptionem in pessso subditus, partum abortiu vitiât. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit: in antidota iheriaca additur, faciei cutem lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

Brassica syluestris. CAP. CXIII.

**S**yluestris brassica, maritimis præruptisque locis, magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiôrque, amara: cuius cyma in lixiuia coctâ, ori non insuauis. Folia illius vulnera conglutinant, & inflammationes tumoresque discutunt.

ANNOTATIO.

Contendunt doctissimi quique eam esse  
her



Herbam, quam vulgò Soldanam, aut Soldanellam vocitant: quę certè aristolochiam rotundam, vt à Dioscoride hic depingitur brassica marina, foliis adamussim repræsentat. Quòd autem in descriptione prælonga quoque adiiciatur, mendosum planè suspicamur, ac fortè pro  $\mu\alpha\chi\rho\alpha$ , vt Græci codices habent, legendum  $\mu\iota\mu\rho\alpha$ , id est, parua: quod & ipsum Soldanæ nostræ pulchrè respondet. Quomodo enim folia brassicæ marinæ prælonga rectè dixeris, si aristolochiæ rotundæ foliis similia? quæ cùm ex eius descriptione, tum oculata fide non in longitudinem protensa, sed circinatę ferè esse rotunditatis, sepe comperimus. Suum tamen cuiq; in hac re esto iudicium.

Brassica marina.

CAP. CXIIII.

**M**arina brassica à satina prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed p̄ uico, falso gustu, & aliquantulum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, reuerentissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta.

- CAP. CXV.

**B**eta duorum generum est, è quibus nigra coquitur cū lenticula, vt ventrē sistat: quod ma-

gis



\* Antiquis radice eius præstatur. \* Candida alio utilis  
hoc genus est. Veraque tamen propter nitrosū humorem,  
betæ, ut auquem habet in se, maxij succi est. Vnde succus ea-  
thor est rum, cum melle naribus inditus, caput purgat, at  
Theophrastus eum doloribus auxiliatur. Decoctum radicis ex-  
stat, Siculū filiorum, furfures lentesq; deterget, per mōnes fo-  
reorione inungit. Crudo folijs vitiliginis, nigro antea  
quā rū exē perficiat, al pectarum manitutes, scalpello prin-  
cipio extrita exasperatis, atque depascentia vlcera, illum pro-  
vniatantum dēst Erupti n'bus popularum, igni sacro, ambu-  
litera Siela stūq; cacha medetur.

hodie dicitur. **Portulaca.** CAP. CXVI.

mur.

**P**ortulacæ vis adstringit: capitis doloribus,  
inflammationibus oculorū, catenq; cum pa-  
lenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igne,  
vesicæ doloribus, auxilio est: cōmmatūcata den-  
tium stupores sodat: stomachi & intestinorum  
estuationem, iuxtaque mulcet: renes & vesicam  
adiuvat, etiam si erosionem sentiant: venæ impu-  
tus exolvit: succus epotus simili effectu prod. s. b.  
in febribus valens. Contra teretes ventris iuncas,  
cruentam excreationem, dysenteriam, hæmor-  
rhoidas, & profluvia sanguinis, percocta eff. eaz  
est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medi-  
camentis utilissimè commiscetur, inter omnes flu-  
xione laborantibus, atque vulvarum et stomib;  
infunditur: contra dolores, quos æstus excitavit,  
caput ex rosaceo & oleo foveitur: eruptiones pa-  
pularum in capite, cum vino emendat: vulneribus  
qua



que ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

Asparagi. CAP. CXVII.

**C**orruda, siue syluestris asparagus, vulgaris Officinis  
est mitia. Huius cauliculi in cibo cocti sparagus.  
ventrem emolliunt, vrinam cient. Radicis deco-  
ctum contra vrinæ difficultatem, regium mor-  
bum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in  
potu proficit: cum vino autem, phalangiorum mor-  
sibus auxiliatur. Si decocti succus super dente con-  
timeatur, eius dolori medetur. Semen potum ad  
eandem valet. Canes, vt aiunt, si decoctum bibant,  
emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodide-  
runt, arietis cornibus comussis, atq; defossis: quod,  
quantum equidem sentio, planè à veritate abhor-  
ret. \* Altius autem asparagus multis ramis fru- \* In græco  
necat, folijs fœniculi, longis, numerosis: radice ro- codice hæc  
tunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri ad sylue-  
cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. strẽ quoq;  
Assus autem coctusve, vrinæ stillicidium, difficul asparagum  
tatemq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino referuntur,  
aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta nec sit alti-  
cum ficiis aut ciceribus sumpta, regium morbum sa lis mentio.  
nat: coxendici cruciatus stranguriamq; leuat. Alli Marcello au-  
gata radix, aut haustum eius decoctum, cõceptum tem viden-  
admit, & sterilitatem adfert. tur adulte-

Plantago.

CAP. CXVIII. rina.

**D**vo plantaginis genera: minor folia habet  
angustiora, minora, molliora, lauiora, &  
eniora: cauliculo anguloso in terram inclinato:



floribus pallidis: semine summis caulibus emicanti

Altera maior, latio, virentiorq; , latis constan

\* Oleris no folijs, \* oleracei generis: cuius caulis cubiti altitu  
mine per diem petit, angulosus, subruber, à medio ad ver  
antonoma= ticem tenui semine circumdatus: radicibus nititu  
siam Bras= teneris, hirsutus, candidis, digiti crassitudine a  
ficā intelli= quantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & loc  
ge. Nec e= humidis. Multo utilior magna est. Vim habent fo  
nim simpli= lia exiccatoriam, constringentem: quare omnibz  
citer ad malignis ulceribus, & fluxioni opportunus atq;  
quolibet elephanticus, sordidusq; illita prosunt: profluui  
olera, quo= sanguinis, ulcera quæ serpunt, epimyctidis, can  
rum diuer. buniculos, nomasq; cohibent: vetera ulcera & in  
sa admodū equalia cicatrice obducunt, chironia sinant, sinu  
facies, folia conglutinant: morsibus canis, ambustis igni, infla  
plantaginis mutationibus, panis, parotidibus, strumis, agylopi  
referri pos= illita cum sale prosunt. Coctum cum aceto & sa  
sunt.

olus, dysentericis, cæliacisq; sumptum subueni  
Datur & in locum betæ cum lenticula coctum  
Et ad aquam iuxta cutem, cui leucophlegmati  
nomen est, datur & herba decocta post aridas ef  
las, sic ut media antecedit: comitialibus & si  
spiriosis data proficit. Foliorum succus, collu  
subinde oris ulcera, purgat: cum cimolia aut c  
rusa igni sacro medetur: fistulis infusus prode  
lppitudinibus & aurium doloribus idem succi  
instillatur. Additur quoque in oculorum collyri  
Gingiuis cruore suffusus, & sanguinis reiection  
bus, potu confert: clystere dysentericis infunditu



contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subijcitur, etiam si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum, alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, vlceribus renum & vesicæ in passo datur. Ferunt tres radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radicis gestamine, discutientiis strumis vtantur.

## Lauer seu Sium. CAP. CXIX.

**S**ium in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, fo. Officinis slyslatis, olusatro similibus, sed minoribus, & Berula. odoratis. Quæ cruda coctâque esu, calculos rum-punt, atq; excernunt: vrinas ciunt, menses & par-tus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliantur. Desio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quam mentha, nigra, & ad erucam accedentia.

## Sisymbrium. CAP. CXX.

**S**isymbrium (alijs serpyllum syluestre vocant) in Officinis solo inculto nascitur, mentha hortensis simi- Balfamita. tudine, odoratis, latiore folio. Inferiunt coronis. Calfaciendi vim habet: contra stillicidia vrinæ, calculosque, semen ex vino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur: item contra vesparum a= Vu'gò na= piûmque: etus. Vomitiones potu cohibet. Alte=sturtium a= rum sisymbrij genus, quod aliqui cardaminam, qualicum.



alijs sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in locus, quibus sion, prouenit: quæ ideo nonnulla cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtium, representet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id excoquit, urinas mouet, crudum est tur, purgat leuitigines, cuiusq; vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

## Crithmum. CAP. CXXI.

**C**Rithmum, seu potius, ut aliqui, crithamon fruticosa & vndique foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semen, cerorismarinum, odoratum, molle, rotundum, quod siccum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum, radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & incundi. Radix, semen, & folia in cocto vino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient, est tur crudum coctumve in oleribus, seruatur etiam in muria.

Fuchsis

## Coronopus.

CAP. CXXII.

Cornu cerui vulgò dictum.

**C**oronopus oblonga herbula est, per terram repens, fissis folijs: coquitur in oleribus: radix habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo celiacorum, id est, facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus vias.

So.



Sonchus.

CAP. CXXIII.

**S**onchi duo genera: syluestrior quidam est, & magis spinus horret: \* alter teneritate quadam \* Vulgò ro-  
mollescit, cibus expetitus, anguloso caule\*, mani, strum por-  
interdum rubente: folijs in ambitu per intervalla cinum.  
dissectis. Vtriusque vis refrigerat, modicè adstrin- \* Vox ex-  
git: vnde æstuantis stomacho & inflammationi = Plinio re-  
bus illiti prosunt. Succus eorum stomachi rosio = posita.  
nes forbitione mitigat, lac elicit, in velle apposi-  
tus sedis ac vulvæ collectionibus opitulatur. Tam  
herba quàm radix illa vibrata a scorpione icti-  
bus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris in-  
star, laus constans folijs: caulem in ramos exenn-  
tem folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

IANNOTATIO.

Non video, quanvis & Græcus codex sic  
habeat, quomodo Seris sativa hortensi,  
quod planè est idem, stomacho utilior dica-  
tur: ut subesse errorem non parum suspice-  
mur. Marcellus, qui aut integrius usus fuit  
exemplari, aut locum, quem & ipse corru-  
ptum iudicabat, restituere conatus est, sic  
vertit: Latioribus foliis altera, sativa & in ci-  
bis gratior.

Seris siue intybus. CAP. CXXIIII.

**S**eris duum generum est: altera sylvestris, quæ  
spicris & cichorion vocatur: \* altera sativa, \* Officinis  
latioribus folijs constat, stomacho quàm hortens- scariola,  
sis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur:

m 3



ma folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: alium sistit coctum, si cum aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, tribus illinuntur: podagricis, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussa a scorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

## Chondrilla. CAP. CXXV.

**C**Hondrilla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli sylvestris intubi speciem esse pronuntiarunt, verum tenuior tota est in cuius ramulus, gummi mastiches simillimum. *\* myrabei muni \** tuberculo fabæ inueniri solet: quod cum myrta & rhatritum, & lineo appositum, instur oliuæ, scæd id est, minarum menses trahit. Tusa cum radicibus herbarum, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitroginitudine admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod item tenera radix efficit, si intincta succo acis, pilis admoueatur. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctus, in vino, aut per sese potus, alium sistit. Aliud habetur chondrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulem succo madentem lateo:



Eleo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescen-  
te, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi-  
um habent. Succus incommodos palpebrarum pi-  
los reflelit. Nascitur in latis, & culis.

## Cucurbita. CAP. CXXVI.

**C**ucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumo-  
res, & abscessus mitigat. Ramenta eius in-  
funibus contra capitis ardorem, quam syrias in vo-  
cant, in sincipite illinuntur: oculorum inflamma-  
tiones podagrasq; refrigerant. Succus è ramentis  
tussis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium dolori-  
bus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre  
illitu adiuuat: totius seruesactæ, & expressæ suc-  
cus, cum melle exiguo, & nitro potus, alium leni-  
ter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem exca-  
uatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potius  
alium leuigabit.

## Cucumer satiuus. CAP. CXXVII.

**S**atiuus cucumis alio & stomacho perquam  
utilis habetur: refrigerat, corruptionem non  
sentit, resicæ prodest, olfactus reuocat, quos ani-  
mus liquerit. Semen modicè urinam mouet: cum  
lacte aut passo, resicæ exulcerationibus subuenit.  
Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epi-  
nyctidas, cum melle. Pepous caro in cibus, uri-  
nam cit: inflammationes oculorum illita sedat.  
Ramenta eius contra adustionem infantium, quæ  
syrias in vocant, sincipiti imponuntur: fronti ad-  
mota, oculorum fluxiones auerunt. Succus cum



semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drachmæ pondere, vomitione mouet. Si quisquã moderate secundum cœnã vomere cupiat, geminus oboli sit contentus. Sanat quoque illita cum melle vlcera concreta in modum fœui, quæ ceria vocant.

## Lactucæ.

CAP. CXXVIII.

**L**actucæ satiuæ, quibus natura refrigeratri: lineest, stomacho gratæ habentur: somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum decoctæ magis alunt: stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit, & veneri refragatur. Ipsæ verò frequentiores in cibo, claritati oculorum officium: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur, muria coniunguntur. Cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur, succum aut lacti syluestris lactucæ similem.

## Lactuca syluestris.

CAP. CXXIX.

**S**yluestris lactuca satiuæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora & asperiora: amaro gustu est, & viribus aliquatulum papaueri similis: unde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos argema caliginemq; repurgat, contra adustione efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, dolorum leuamentum præstat, men-



ses trahit, contra scorpionum, & phalangiorum  
ictus bibitur. Semen, non aliter, quam satinae libi-  
dinū imaginationes in somno amolitur, ac venerē  
arceat. Succus ad eadem valet, sed viribus infir-  
mior. Reponitur in fœtuli nouo lac eius, antea, ut  
in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

## Gingidium. CAP. CXXX.

**G**ingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cili- Nostrum  
cia \* plerunque nascitur: herbula syluestri Cerefoliū.  
pastinaca similis, tenuior, & \* amarior: radice \* πλεῖστον  
parua, candicante, subamara. Oulus hoc crudum, id est, pluri  
coctum, conditūve estur magna stomachi utili-  
tate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ \* πικρότε-  
prodest. ρον, ἢ πυ

## Scandix. CAP. CXXXI.

**S**candix, sylvestre oulus est, amarum, subacre: Scandix,  
quod crudum coctūve manditur, stomacho Aëtio lib.  
& ventri utile. Decoctum in potu, vesicæ, reni- 1. aulhore,  
bus, & iocineri confert. agreste o-

## Caucalis. CAP. CXXXII.

**C**aucalis, quam alij sylvestre daucum vocāt, gudio simi-  
cauliculo est dodramali, aut maiore, subhirle, acre &  
suto: folijs apio similibus, fieniculi modo per extre subamarū.  
ma multifidis, hispidisque: candida in cacumine  
umbella, suauiter olente. Crudum, coctūve olerū  
modo estur: vrinam mouet.

## Eruca. CAP. CXXXIII.

**R**uda eruca venerem largiore cibo cōcitat.  
Semen eodem effectu prodest: vrinam cit.



concoctioni prodest, alio perquam commodata. Semine ad condimenta viuuntur: quod, uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris cruce, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multo satina acrior.

## Ocimum.

CAP. CXXXIII.

Officinis  
Basilicon.

**O**cimum vulgò cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, alium mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat: egrè tamē conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes excut. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urina, inflatisque: naribus haustū, subinde mouet sternutamenta: quod idem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cū sternutamentū vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censent: quamloquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adiungunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

## Orobanche.

CAP. CXXXV.

**O**robanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum verg



tergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quedam legumina nasci constat, & ea strangulare: unde probanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. CAP. CXXXVI.

**B**arbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, breui est caule, folijs croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. CAP. CXXXVII.

**O**rnithogalum cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

Tubera. CAP. CXXXVIII.

**T**ubera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs flauescens: vere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis. CAP. CXXXIX.

**H**ortensis smilax, frutex, cuius semine nonnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamen: tenues caules, & capreolos, vicinis frut



\* Græcè est fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt: *in μέγας ὅ* ut topiarias ſcenas repræſentare videantur: ſili-  
*ῖον ὄνυξι* = quas ſamigræci præfert longiores & toroſiores, in  
*ῖον ῥα*, quibus ſemina renum ſimilia, ſed inæquali colore  
 quod re = recluduntur, \* que quidam ex parte fulueſcunt.  
 Etius forſi = Siliqua coctæ, cum ſemine in oleribus, aſparagi  
 tan reddi = modo, eſtur. Urinam ciet, & tumultuoſa ſomnia  
 deris: que facit.

magna ta = Medica. CAP. CXL.

mē ex par = **M**edica, cūm recenter prodūt, folijs & caule  
 te fulueſcūt **M** trifolio pratensi ſimilis eſt: procedens verò  
 ut intelliga folia contrahit, caules edens trifolij, & ſiliquas  
 mus Smila corniculorum modo intortas, in quibus ſemen  
 ca hanc di = lentis magnitudine dependet. Id ſiccatum, in-  
 uerſi quidē cundi ſoporis gratia, conditaneo ſali admiſce-  
 coloris ſe = tur. Viride, quibus refrigeratione opus eſt, illu-  
 mina, ma = ſuffragatur. Herba tota pro gramine vtiuntur, qui  
 gna tamen pecora alunt.

ex parte Aphaca. CAP. CXLI.

fulueſcētia **A**phaca in aruiſ nascitur, alior lente, tenui-  
 procreare. **A**bus folijs: ſiliquas lenticula maiores fert, in  
 Eſt quam quibus terna quaternaræ ſemina nigra, lente mi-  
 rura Viciā nora, continentur: que adſtringendi vim habent:  
 ſylueſtrem quare torrefacta, ſtomachi aluique fluxiones ſi =  
 vocitant. ſtunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

Porrū capitatum. CAP. CXLI.

**C**apitatum porrum inflationem facit, no-  
 xium ſuccum creat: tumultuoſum ſomnum  
 parit, urinam ciet: alio accōmodatur, extenuat,  
 oculo



oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed ledit  
 exulceratam vesicam, renésque: cum p[ur]isana verò  
 coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in  
 aqua maris, & aceto cocta, in defectionibus, ad  
 præclusiones vuluæ, & duritias, utilis habetur.  
 Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida ma-  
 ceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen  
 acrius est, & quãdam adstrictoriam vim habet:  
 quare succus cum aceto, addito thure aut mamma,  
 sanguinis profluvia sistit, maximè si naribus erit  
 pat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vi-  
 tia tabemq[ue], pro delinctu efficax est: arteriam esu  
 purgat, sed si assidue estur, visus obscuritatem in-  
 ducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle po-  
 tus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio  
 est: ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, la-  
 cte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus, & so-  
 nutui instillatur. Varos tollunt folia illita cum rui-  
 rhois, qua ad obsonia vtuntur: epinyctidi meden-  
 tur: crustas ex sale illita rumpunt, veteres sangui-  
 nis reiectiones cohibent, si binis drachmis & aqua  
 li baccarum myrti pondere bibantur. Ampelopra-  
 sum stomacho magis aduersatur, & plus porro  
 excalfacit: vrinam & menses vehementius ciet.  
 Id contra serpentium morsus esse conuenit.

## Cæpa. CAP. CXLIII.

Cæpa longa acrior est, quàm rotunda, item  
 flaua quàm candida, & sicca, quàm viridis,  
 & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes ta-

men



men mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, siium mouent, & extenuant: fastidium pariunt, & expurgant: aluo utiles sunt. Ea detrahit purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus reserant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemus, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodem perunguntur: suppressos menses pellit, caput purgat naribus infusus: canis morsibus cum aceto, ruita, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in Sole, vitilignes sanat & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos eum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est: citæ alio prodest: in auribus sonitum, ac grauitatem emendat: ad purulentas aureis, & eliciendum earundem aquam, valet: alopecie earum succo perficiantur, qui celerius, quam alcyonium pilos euocat: largiore cibo capiti capitis dolores ciet, coctaq; vehementius urinam pellit: eos leihargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo vescamur: elixa, & cum passis ruis, & sico illita, tubercula concoquit, & celerimè rumpit.

Allium.

CAP. CXLIIII.

**A**llium quoddam satiuum atq; hortense habetur, quod in Aegypto, singulari, ut porrum, capite constat, dulce, in purpureum vergens, paruum: reliqua verò magna, & candida, ex pluribus



ribus coagmentantur nucleis, quos aglitas, id est  
 spicus, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod  
 Ophioscorodon, id est anguinum, vocant. Vis aliq  
 acris est: excalfacit, mordet, excernit, aluum tur-  
 bat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gi-  
 gnit, flatū permouet, summam corporis cutē exul-  
 cerat, aciem oculorum esu hebetat. Eosdem effe-  
 ctus præbet anguinum, quod & elaphoscorodon di-  
 citur: latas ventris tinea in cibo sumptum abigit,  
 urinis detrahut: contra viperarum ictus, & pri-  
 uatim hæmorrhoi, prodest, ita ut nō aliud magis,  
 si cum riniugiter assumatur, aut tritum in eo-  
 dem ebibatur: contra rabiosorum morsus & illi-  
 tu, & cibo valet. Magnæ & allio vtilitates contra  
 aquarum mutationes: vocem clarificat, veterem  
 tussim crudum coctūve lenit: potum autem cum  
 origani decocto, pediculos, & lendes enecat: cre-  
 mati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alo-  
 pecijs cum nardino ranguine, medetur: eruptiones  
 papularum cum oleo & sale sanat: vitilignes,  
 lichenis, lentigines, vlcera capitis manantia, le-  
 pras, & surfures, cum melle eximit: cum thure,  
 & teda decoctum, detium dolorem lenat, si in ora  
 contineatur: contra venenatos mures aranei mor-  
 sus, cum ficulneis frondibus, & cismino illinitur.  
 Feruesfacta comæ ius, sceminarum defectionibus  
 additum, menses & secundos partus extrahit.  
 Allium eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo,  
 & nigra oliua iuratum, quod myttoton vocant,  
 esu







polentæ modo, inspargitur: extrahentibus em-  
plastris, scabiemque extenuantibus, vtiliter admi-  
sceri solet: tritum, grauitati aurium & sonitui.  
cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudi-  
nes oculorum & genarum scabritias magna vili-  
tate illinitur. Expressus recenti semine succus, in  
sole siccatur.

## Nasturtium. CAP. CXLVI.

**N**asturtium optimum constat esse Babylo-  
nicum. Omnium semen est acre: exalta-  
cit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tinea  
excitit, lienem immittit, partus exanimat, men-  
ses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ simile  
intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Il-  
litum cum melle, lienem extenuat, fauos expur-  
gat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus inco-  
elum. Serpentiū venenis potum resistit, atq; eas  
suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbun-  
culos ad suppurationem perducit, & rumpit: co-  
xendicibus cum polenta commodè ex aceto illini-  
tur, tumores collectionesque discutit, emittit furun-  
culos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem  
effectus, licet minor.

## Thlaspi. CAP. CXLVII.

**T**hlaspi, herbula angustis folijs, digitali lon-  
gitudine, in terram versis, suppinguis, in  
cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo,  
tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu cir-  
ca ipsum totum, ab extremo in latus se panden-



*Alionoea*, te: semine nasturtij incluso \* lenticula vasis effi-  
*dis*, id est, gie, nisi quod infringitur, (vnde nomen accepit)  
 disci figu= flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fos=  
 ra. sisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem

viring; extrahit, potu acetabuli mensura: prodest  
 ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, inter=  
 nus suppurationes rumpit: menses ciet, sed par=  
 tus enecat. Alterum *thlaspi* tradit *Crataeas*,  
 quod aliqui *Persicon* sinapi vocant, latius folijs, ra=  
 dicibus magnis: utile ischiadicorum infusioni.

Draba. CAP. CXLVIII.

*Alj arabis*. *Draba* herba ad cubiti altitudinem assurgit,  
 \* *ῥαῖδ'ος*, *D*tenues spargens \* ramos, & ex utroque  
 id est, vir= latere folia, cetera lepidij, sed molliora, & candidio=  
 gas. ra: in cacumine verò sambuci umbellam gerit, can=  
 didos flores habentem. Herba haec cum ptisana co=  
 quitur, in Cappadocia maximè. Semen aridum pro  
 pipere obsonijs admiscetur.

Irion. CAP. CXLIX.

*Erysimon*, Latini *irionem* vocant, iuxta vr=  
 bes, rudera, hortosque nascitur, folijs eruce  
 syluestris: cauliculis in lori modum lentis & obse=  
 quiosis: floribus luteis, siliquis in cacumine gra=  
 cilibus, ut fenogreco, cornicularis: semine na=  
 sturtij, exiguo, vrentis gustus. Contra thoracis flu=  
 xiones efficax est, & si purulenta extusuntur:  
 regio morbo, & coxendicibus prodest: contra  
 venena in delinctis cum melle datur: illinitur  
 ex aqua aut melle vtiliter cecis carcinomatis,  
 par



parotidibus, duritijs mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua madescat atque torreatur, vel linteo illigatum, pinsita, farina oblitum perassetur.

Piper.

CAP. CL.

**P**iper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælongum fructum, veluti siliquam promit, quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, pandensque sese racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ cōtra venenata parantur: theriaca vocant. Longum verò vehementius mordet: & quoniam prius, quàm ematurescat, decerptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratū esse constat, cādido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta vtilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauisimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens ac minime furiosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimæque ponderis, quod vocant brasma. Vis omnium excalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discu-



rit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur  
 Piper, febrium horroribus circum repentinis  
 siue potu, siue illitu, subuenit: serpentium morfi-  
 bus auxiliatur, partus extrahit, conceptum adim-  
 re creditur, statim à concubitu suppositum: iussi  
 omnibusque pectoris vitis, siue eclegmate, siue po-  
 tu, succurrit: angina eo & melle conuenienter per-  
 unguntur: potum cum recentibus lauri folijs, tor-  
 mina discutit: cum vua passa manducatum, pi-  
 uitam à capite elicit: valetudinem tuetur, dolo-  
 res finit, appetentiam mouet, concoctionem adiu-  
 uat, ad intinctus esculentorum additum: struma  
 cum pice discutit, vitilignes ex nitro emacula-  
 \*φαιη, nō Ficuli nouo, vt \* lenticula, motum torretur. No  
 φαιρ. est huius arboris radix gingiber, vt aliqui exi-  
 stimauere, sicuti paulò post ostendemus. Nanque  
 piperis radix costis similis est, ora gustantium ac-  
 cendit, saluam ciet. Hac lienem reprimat, cum  
 aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, mandi-  
 cata cum semine pedicularis herbae, quæ staphi-  
 dem agriam vocant.

## Gingiberis.

## CAP. CLI.

**G**ingiberis sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens: quæ  
 virente, ad multa, perinde atque nos ruta, vtun-  
 tur, & primis potibus & edulis admiscunt. Hi-  
 ius radices, cyperi modo, parua sunt, candican-  
 tes, & odoratae, atque piper sapore imitantur. El-  
 gi debent quæ teredines non nouerunt. A mul-  
 tame



tamen ob id \* condiuntur, quòd celeriter cariem \* ταριχθες  
sentiant, ac sicilibus in Italiam asportantur. Cin= ται διὰ τὸ  
giberis cibo conueniens est, & cum condimento δισπηλον.  
assumitur. Excalfactoriam vim & excoquentem id est, sale  
habet: aluum leniter emollit, stomacho utilis est, conspergunt  
efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offun= tur, quòd  
dunt. In antidota addi solet. In summa, piperis vi= facile putre  
ribus respondet. scant.

## Hydropiper. CAP. CLII.

**H**Ydropiper apud aquas nascitur, quæ sta= gnant, aut pigro lapsu repunt: caulem edit  
gemculatum, \* prædurum, multis alis concavum: \* ὄρεον, id  
folia mentha, maiora, molliora, candidioraque, quæ est, solidum.  
stus piperis, acri, citra tamen ullam odoris gra= tiam fructum acrem, in surculis paruis, prope fo= lia racematim coherentem. Folia cum semine illi= ta tumores veteresque duritias discutiunt, sugilla= ta delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro piperis in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

## Ptarmica. CAP. CLIII.

**P**Tarmica exiguus frutex est, surculos ha= bens paruos, multos, & rotundos, abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulum, uti anthemi= dis, paruum, rotundum, quod suo acri odore ster= nutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissime mouent. Nascitur in



monibus & petrosis.

Radicula, seu lanaria herba.

CAP. CLIIII.

Cēsetur ea  
quam vul-  
gò saponar-  
ia dicunt.

**S**truthium herba vulgò nota, qua purgandis la-  
nus utuntur, qui eas elidunt. Huius radix est  
acris: urinam ciet: prodest tussi, iocinerosis, or-  
thopneæ ex melle sumpta, cochlearis mensura:  
aluum soluit. Eadem cum panace & capparis ra-  
dice calculos frangit, & cum urina exturbat. du-  
ritiam lienis absorbit: menses imposita trahit,  
partus efficaciter enecat. Cum polenta autem &  
aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum  
farina hordeacea, & vino decocta. Miscetur &  
malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis cau-  
sa. Sternutamenta mouet, per os purgat, trita cum  
melle, & naribus infusa.

Cyclaminus.

CAP. CLV.

**C**yclaminus folia habet hederæ, purpurea,  
varia, in quibus suprâ infrâque albicant ma-  
culæ: caule nudo, quaternos digitos aequante: flos-  
\* πορφυρί= ribus in eo \* purpureis, rosarum effigie: radice  
ζουρα. pur= nigra, & aliquantum lata; ut rapum videri pos-  
purascenti= sit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamq;  
bus. detrahit: menses potu appositivè ciet. Tradunt,  
si prægnans radicem transgrediatur, abortum fie-  
ri. Partum appensa accelerat: contra venena,  
præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita  
contra serpentium ictus, remedio est: immista vi-

no



no inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum, qui ebibit, multis vestibus contectum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectioni autem sudores fellei colore inveniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deuenienda quoque alui excrementa, in vellere sedi subijcitur: illito umbilico & imo ventre coxarum tenuis, aluum emolliat, & abortum efficit: suffusionibus, & retus oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem abscedit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesque foveri congruum est: ipsa quoque in oleo vetere feruifaceta, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Cavata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cera memento, ut strigmenti crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile perniciosis. Radix, scilicet modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.



## Altera cyclaminus. CAP. CLVI.

**E**st & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, sed minoribus geniculatis caulibus, crassiq; circa vicinis arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinus hederæ molibus, leni gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienem per vrinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur. reliquias à partu purgat.

## Dracunculus. CAP. CLVII.

**D**racunculus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematurrit, croceo, gustu feruens, mordaxque: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum absomit: carcinomata illitus sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix ex calfacit: orthopnoeis, ruptis, vulsis, tussi, destillatione



tionibus, auxiliatur: humores pectoris excreatu facile reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: urinam pellit, venerem excitat, cum vino pota. phagedenas vicerum, & quæ cacoëthe vocantur, trita cum melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eyciendos partus fieri solent: qui radice suas manus perfricauerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino permionibus apposuisse prodest: caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctave, ad sanorum vsus, pro oleris recipitur: in Gymnests insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix mensibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, sicatur in umbra, & ita reconditur.

Arum.

CAP. CLVIII.

**A**ron, apud Syros lupha vocitatum, folia Iarus officemittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem suppurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceum semine exit: radice dracunculi alba, quæ decocta est, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum conduntur, & arida per se decocta manduntur. Radix,



semen & folia dracunculi vires habent. Prina in radice ex sino babula podagræ illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

## Arisarum.

CAP. CLIX.

**A**risarum exigua herba est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longè maiori quam aron acrimonia. unde illius nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illius radicis, genitale animalis cuiuscunque in perniciem agitur.

## Hastula regia.

CAP. CLX.

Officinis  
Aphrodisi-  
los.

**H**astula regia vulgaris notitie est, folijs melioris porri: caule læui, ferente in cacumini florem, quem anthericon appellant: radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt: urinas & menses epotant: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datum aptissimè, verum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinere oportet. Item vlcera sordida, & depascentia, mammarum quoq; & testium inflammationes, tubercula, furunculósque, decoctis in fece vini bulbis, recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, sitq; perquam uile oculis



lis medicamentum ad purulentas aureis per se, & cum thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem infusus, \*dentium dolorem \* ααδ' ααυ mitigat. Cinis è radice illitus, alopecius ad p:liam τὸν ἰγχνυ= reducit. Oleum in excavatis radicibus igni deco= δαίς. Etiam, illitu exulceratis perniombus & ambustis igni, conducit: & surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam vitiliginem, \*linleo antea \* προαυα= perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen flo= τριφύτα resq; in vino poti, scolopendræ & scorpionū vene= ἐν ἰδονίω, nis, mirum in modum resistunt: alium purgant.

Bulbus esculentus. CAP. CLXI.

**E**sculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur: stomacho & alio utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarum verò & scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent, exalfaciunt: venerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflammationem pariunt: luxatis, fractis, articulorū doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrænas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorū tumores, & canū morsus cum melle & piperis polline illiti colubent, sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures & ulcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. sugillata varosq; per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle vel aceto, emendant: fractis auriculis unguibusq; ex polenta medentur: idem calidis



calidis cineribus torrefacti, tollunt fici: item cum cinere è manarum capitibus, impositi: cremati vero, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasq; cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervi tentant.

Bulbus vomitorius. CAP. CLXII.

**B**ulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, \*cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur: vomitiones movet.

Scilla. CAP. CLXIII.

Officinis **S**cilla vim acrem atque feruētē habet: assasquilla, Var **S**tam ad multa vtiliorē esse constat. Polline adronis more. crustam subactō, aut luto oblita, in clibanum conicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: qua exempta, si nō emolle scat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt: nam quæ ita non assatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furno demittatur. Sumi etiam solet quod maximè est medium, direptis viuo tenuis tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat: traiectaq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidē parte se contingant: his scillæ segminibus



nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vti-  
mur. Ad rimas pedum, interna pars crude scillæ  
in oleo feruescens, aut cum resina liquefacta im-  
ponitur: decoctio in aceto demorsis à vipera, cata-  
plasma est. Ad singulis assæ parteis adiectus octo-  
nis tostus salis, cochlear vnum aut alterum damus  
ieiunis, ad emolliendam aluum: in potu autem &  
odoratus medicaminibus, & quibus urinam ciere  
volumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus in-  
natat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi vete-  
re, suspiriosis, & ore reijcientibus tres obolos, in  
delinctu ex melle sumpsisse satum est. Coquitur cum  
melle, & estur eorundem gratia, maxime vt con-  
coctionem adiuvet. Strigmenta per aluum extra-  
hit. Cocta & simili sumpta modo, eosdem præbet  
effectus: sed cauendus scillæ vsus huius, qui intesti-  
num sentiunt vlcus. Ad pensiles verrucas & per-  
niones, tosta efficaciter illinitur. Tertium semen,  
& in carica aut melle deuoratum, aluum emollit.  
Scilla tota in limine ianuæ suspensa, mali medica-  
menti noxam arcet.

## De Pancratio. CAP. CLXIII.

**P**ancratium, quod aliqui scillam appellant, ra-  
dice est magni bulbi, subrufo colore, aut sæpe  
purpureo, gustu amaro ac feruente: folijs lili, sed  
longioribus. Scillæ vires & præparationem ha-  
bet, eodémque pondere in morbis efficaciter assu-  
mitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas in-  
est. Radix succus cum erui farina digeritur

in



in pastillos, qui hydropicus splenicisq; cum hydro-  
melite, commodissime dantur.

Capparis CAP. CLXV.

**C**Apparis aculeatus frutex est, qui in terra  
stratus, magis in orbem euagatur: spinas,  
ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia  
mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui  
cum delibescens panditur, florem candidum pro-  
mit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura  
inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum  
similia ostendit, parua, rubicunda: radices ligno-  
sas spargit, grandes, numerosasque. Tenui ple-  
runque solo, asperisq; locus, in insulis & iuxta ru-  
dera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia con-  
diuntur: alium turbat, stomacho aduersatur, sitim  
gignit: cocta tamen stomacho quam cruda utilior  
est. Fructus drachmis duabus in vino potus, qua-  
draginta diebus, lienem absuit, & urinam cruen-  
tamq; excrementum emittit: bibitur utilissime in  
coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item  
ruptis & convulsis: menses ciet, caput purgat. Den-  
tium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, collu-  
to inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem pro-  
ficat. Ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ oc-  
calluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei il-  
linitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum  
aceto trita, vitiliginis albas absterget. Radix fo-  
liisq; intrita, strumas ac duritias discutit. Au-  
rium vermiculos infusus succus enecat. Aphri-  
ca,



ta, & præsertim Marmarica capparum, vehementer inflat. Apula vomitus facit, & quæ à Libyæ, & quæ Rubro mari deferitur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat, gingivæq; osse tenus exest: quare in cibis non ab re eliminatur.

## Lepidium.

CAP. CLXVI.

**L**epidium aliqui gingidium vocant, herbula Censetur p<sup>i</sup> vulgò nota: muria cum lacte servatur. Vis peritis olitorum acris & exulcerans: quapropter ischiærum. licu trita, præsentissimum est auxilium, si cum hienij radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis simili modo prodest. lepræ eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

## Ranunculum.

CAP. CLXVII.

**C**omplura ranunculi genera: vis tamen o<sup>o</sup> Vulgò Apis<sup>is</sup> omnibus una, acris, & vehementer exulcerans. Nam unum coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amarâque, multis capillamentis, hellebori modo, fibrata: nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, duribus foliorum incisuris, \* plerumque in Sar<sup>is</sup> \* πλῆτον, limia proveniēs, quàm acerrimum, quod sylvestre id est, copiosius appellant. Tertium minimum, odore gravi, sum. flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare vng



ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent: formicantes verrucas, & pensiles alopeciasq; paulisper illita tollunt. Tepenie decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritaq; sternutamenta ciēt, naribus admota: dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen si angit.

Anemone. CAP. CLXVIII.

**D**uo anemones genera, vnum syluestre, alterum in culis nascens. Cuius multae species una phoeniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. Harum foliis coriandro similia, caeterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaueris, & in medio capitula nigra, aut caerulea: radix oleae magnitudine, aut amplius paulo grandescit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capitamentis. Acrior est, quae nigra habet folia. Viriusque acris: ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida ulcera abtergit. Folia, & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis praebent: menstruant, vellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonem nomine

ri en



ri eupatorium putent: quoniam à syluestri anemone, argemone & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verùm papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & utraque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustus admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone spernè crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones generi nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In arvis illa sæpius enascuntur.

Argemone. CAP. CLXIX.

**A**rgemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem, dimittit. Argemina & nubeculas expurgat. Folia illius inflammationes comescunt.

Anagallis. CAP. CLXX.

**D**vo anagallidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, fœmina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotundo. Utraque mitigandi



vim habet: inflammationem arcet, adactos corpo-  
ri aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus capu-  
gargarizatu purgat: & naribus infusus, doloren-  
dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur: a-  
gema cum melle Attico emendat: retusa oculorum  
aciei auxiliatur: contra viperarum morsus, ioci-  
neris & renum vitia, si ex vino bibatur, prodesi-  
Tradunt eam, quæ cœruleum edit florem, proci-  
duam sedem reprimere: quæ vero phœniceum, il-  
litu euocare.

Hedera. CAP. CLXXI.

**H**edera differentias multas in specie sorti-  
tur, summas autem genere treis. Nam qua-  
dam candida est, altera nigra, tertia helix. Can-  
da, fructum fert candidum nigra, nigrum, aut cro-  
ci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat: heli-  
fructum non gignit, sed albas habet viticulas, &  
\* ὀβυμῶν folia parua, angulosa, & \* concinniora. Heder-  
\* τῶν, non omnis acris est, & adstringens: nervos tenta-  
\* πρὸς. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysenteri-  
cos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tri-  
tus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, ac-  
cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum  
& corymborum succus, cum irino vnguento, me-  
le aut nitro, naribus infunditur, & contra veteri-  
\* ἀρμόγες, capitis dolores \* caput eo cum aceto, & rosace  
\* ἡγι. perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolenti-  
bus, cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, an-  
epoti corymbi, corpus infirmant, mentemque tur-  
bar



bant largius sumpti. Acini quinque triti, calfa-  
 tiq; in punici mali cortice cum rosaceo, si instillen-  
 tur à contraria aure, dolorem dentium mitigant.  
 Denigrant capillum, illiti corymbi. Folia in vino  
 decocta, illinuntur omnium ulcerum generi, etiam  
 si cacoethe sint: vitia cutis in facie, & ambusta sa-  
 nant, uti antea diximus, decocta. Mouent menses  
 triti & subditi corymbi: idem poti, post purgatio-  
 nes fœminarum, drachmæ pondere, concipiendi-  
 spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus  
 ac vuluæ inditus, mēstrua & partus extrahit. In-  
 stillatus succus putrida tedia narium, graueolen-  
 tiāque emendat, & sanitati restituit. Lacryma  
 hederæ psilothrū est: illius pediculos enecat. Succus  
 radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

Chelidonium. CAP. CLXXII.

**C**helidonium maius, caule est gracili, cubita-  
 li aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranuncu-  
 li, mollioribus tamen, & colore cæsis: flore violæ  
 albæ, secundum singula folia prodeunte: in eo suc-  
 cus croci, mordax, acris, & aliquantulum subama-  
 rus, grauius olens: radix supernè singularis, infer-  
 nè in multa crocea capillamenta fibratur: siliqua,  
 seu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram  
 longa: in qua semen papauere maius recluditur.  
 Succus in æreo vase, cum melle prunis deco-  
 ctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radi-  
 ce, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus  
 in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso



& vino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt: imposita cū vino aut manducata, dentium dolorē sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduētū hirundinū exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrāt, hirundines matres excæcatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. CAP. CLXXIII.

Vulgò Scrofularia minor.

**C**helidonium minus, quod triticum syluestre aliqui nūcuparunt, herbula pediculis ab radice pēdens, sine caule: folijs hederæ, multò rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in graminum tritici modum acernatim congestas: quarum tres aut quatuor in longitudinem exeūt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemone modo, summam cutem exulcerat: psoras & scabro vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur. Decoctum eiu cum melle gargarizatum, magnificè id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. CAP. CLXXIIII.

Varia de Othonna sententiæ.

**O**thonnam aliqui maioris chelidoniæ succum esse aiunt, quidam glaucij. Alij succum floribus corniculati pipaueris expressum. Alij permistos cæruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaueris succos, esse contendunt. Alij Troglodyticæ cuiusdam herbæ succum, quæ othonna vocatur: nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribr

m



modo, & reluti à tinea derosis, squallore obsitis, pau-  
cis: flore croci, latifolio: quare quidam anemones  
speciem esse putauerunt. Extractus succus oculo-  
rum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est  
opus: mordet enim & absterget omnem caliginem  
quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quædam  
ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in  
pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affir-  
mant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide na-  
scentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu  
cum seruore quodam & adstrictione mordaci.

## Auricula muris. CAP. CLXXV.

**M**uris auricula, quam myosotida vocant, her-  
ba est caulibus pluribus ab una radice, ali-  
quatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs an-  
gustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus,  
per intervalla assiduè gemmatis, atque in mucro-  
nem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex ala-  
rum sinu prodeuntibus: flosculo, ut anagallidis, cæ-  
ruleo: radix digitali crassitudine, multis capilla-  
mentis fibrata. Radix illita ægylopiæ sanat. Sunt  
qui al sinem, muris auriculam vocitent.

## Glastum. CAP. CLXXVI.

**S**atium glastum, quo infectores lanarū vtun-  
tur, solum habet plantagini simile, verū pin-  
guius nigriusq;: cuius caulis duūm cubitorum alti-  
tudinem excedit. Illita folia tumores omneis discus-  
tiunt, cruenta vulnera glutinanti, sanguinis pro-  
fluvia sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putre-








PEDANII  
DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI, DE  
*Medicinali materia,*  
*Liber III.*

Ioanne RVELLIO Suefionensi  
interprete.



UPERIORIBVS, charissi-  
me Aree, commentarijs, tradidi-  
mus de aromatibus, vnguentis,  
oleis, arboribus, earum fructibus  
& lacrymis, item de animalibus,  
cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia  
præditis. In hoc autem tertio radices, succos, semina,  
herbas, & quæ vernacula & inter se cognata  
censentur, quæque pluribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum. CAP. I.

**A**garicum radix fertur la serpenti similis, sed  
facie summa solutior, & rariore fungo-  
soque tota contextu. Duo eius genera: scemina, quæ  
præfertur, rectis inuis venarum discursibus con-  
stat, mas rotundus est, & vndique compactior. Vtri-  
que gustus in initio dulcis, mox ex distributione in  
amaritudinem transit: gignitur in Sarmatiæ re-  
gione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem



esse plantæ affirment: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet: efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest iisdem contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso, febrim non sentientibus: febriculosis verò, in aqua mulsa. Arque utique quoque, suspiriosis, iocineris, renūque vitio laborantibus, dysentericis. Item si vrina agrè redatur, si vuluæ strangulatus vrgeat, si pallor membra decoloret, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humoris fortitione deuoratur. Simili modo acida ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: fœminis, quas inflatio vuluæ vexat, vtiliter aquali modo datur. Horrores soluit datum ante febrium accessiones: aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpentes ictum vibrarunt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus vitis cōuenit, pro viribus, & ætate datum, nunc ex aqua, nunc ex



ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum.

CAP. II.

**R**Ha, aliqui rheum, Latini rhaponticum vo= Ignoratur. cant, prouenit in ijs, quæ supra Bosphorum Nec enim sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, est, quod centaurio magno similis, sed minor & rufior, fun Reupontici gosa, aliquantum læuis, sine odore. Optimum ha= nomine ho= betur, quod teredines non sensit: si gustatu cum die indica= remissa adstrictione lentescat, manducatumq; co= tur. lorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinan= tem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi im= becillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus intentia præcordia, & vul= uæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excrea= tiones, suspiria, singultus, dysenterias, & cælia= corum affectus, contra febrium circuitus, & ve= nenatorum morsus. Datur in singulis valetudini= bus eodem, quo agaricum, pōdere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passo: si lie= nis exercet, in aceto mulso. si dissolutio est stoma= chi, id est cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. liuentia, lichenasq; tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. summa eius vis adstringens cum aliquanto calore.

Gentiana.

CAP. III.

\* Græcus

**G**entianæ inuentio prima assignatur\* Gentio Gentidi.



Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit. Fo-  
 līs partim proximè radicem, iuglandi plantagi-  
 nive similibus, subrubris, partim à medio caule,  
 & præsertim iuxta cacumē, paulum dissectis: cau-  
 le cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, &  
 ex interuallis maioribus foliato, binum sæpe cu-  
 bitorium: semine in calycibus lato, sine pondere,  
 glutinoso, satis ad sphondyli semen accedente: ra-  
 dice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nascitur  
 in sublimibus montium iugis, umbrasis locis, a quo  
 fisq̃. Vis radice excalectoris, & adstringens:  
 contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum  
 pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti  
 succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi  
 deturbatus, ruptis, & conuulsis, prodest hepaticis  
 & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix  
 collyrii modo subdita, partus eicit: imposita, vt  
 lycium, vulneraria est, & ulcerū cuniculatim de-  
 pascentium medela. Succus præcipuè eodem esse-  
 ctu prodest: oculis inflammatione laborantibus illi-  
 nitur: pro meconio collyrijs acerbis immiscetur.  
 Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ra-  
 tio hæc est: Contusa radix quinque diebus aqua  
 maceratur: postea in eadem tantisper decoqui-  
 tur, dum extenu radices: & ubi refriguit aqua, lin-  
 teo extolatur, mox discoquitur, dum mellis crassi-  
 tudo fiat, sic illiq̃ reconstituitur.

**A**ristolochia. CAP. IIII.  
 Aristolochia nomē ex eo sibi adaptauit, quod  
 exist



existimetur optimè puerperis opitulari. Tria  
 eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina  
 vocatur, folijs hederaceis: præstanti odore cum  
 acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una  
 radice germiubus, prælongisq; palmitibus: flo-  
 ribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod  
 rubrum est, grauitè olet. Longa, mascula appel-  
 latur: nonnullis dactylitis, longiore quàm ro-  
 tunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flo-  
 re purpureo, grauitè olente, qui marcescens in  
 pyri similitudinem turbinatur. Radix rotundæ,  
 in orbem conglobata, rapi modo. Longæ verò ra-  
 dix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudi-  
 nem implet, nonnunquam paulò maiorem. Am-  
 bæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui.  
 Est etiamnum tertia longa, quæ clematitis voca-  
 tur, ramulos habens tenues, refertos folijs subro-  
 tundis, minori semperuino similibus: flores rutæ:  
 radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq;  
 vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis cō-  
 uenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Lon-  
 ga verò aduersus angues, & venena, drachmæ  
 pondere ex vino bibitur & illinitur: pota cum pi-  
 pere, & myrrha, menses, partus, & omnia vulua-  
 rum onera eijcit: eadem efficit subdita in pessa.

Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus,  
 suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum do-  
 loribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur.

Aculeos, & spicula extrahit, osiū squamas illitu  
 adim



adimit, vlcera putrida exest, & sordida expurgat: cauat cum iri, & melle explet, gingiuas, & dentes extergit. Clematitus ad eadem pollere creditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix. CAP. V.

Liquiritia officinis.

**D**ulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentisci, densis, pinguibus, taclique gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet, ru-  
 \*μαυρὸς, fuscus & \*παρὰς: radicibus longis, vt gentianæ, id est, lon- coloris buxei, subacerbis & dulcibus: quæ den-  
 gas. santur in succum, lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur: verum oportet vt lingua subditus eliquescat, æstuantî stomacho, i thoraci, ac iocineri conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illius accommodatur, com- manducatus ori prodest: recentis radicis decoctum ad eadem cõuenit. Eiusdem farina pterygis com- modissimè inspargitur.

Centaurium magnum. CAP. VI.

Censetur Rheuponti cum offici- narum.

**C**entaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulẽ, ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab rabice adnatis, in quibus capita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos cæruleus: semen cnico simile, ceu lanæ floccis quib



quibusdam innolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluis & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: cæteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramēta eius in collyrii formam vuluæ subdita, menses atque partus extrahunt. succus eadem præstat, vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

Centaurium minus. CAP. VII.

**C**entaurium, limnesion aliqui vocauere, quoniam niam rigua amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leni & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat: vetera ulcera purgat, & cicatrices obducit: bilem crassosque humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur.



funditur: trahit enim sanguinem & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquam utilis: siquidem cum melle caliginem oculorum expurgat: in vellere appositus, menses & partus extrahit: potus peculiariter nervorum vitis succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba semine pregnans, & diebus quinque madesacta, decoquitur, donec superemineat aque: mox ubi refluxit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem gravidamque contundunt, atque succum fistili non picato exprimunt, & in sole, lignea rule assidue mouentes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus vasis adherescat, decradunt, reliquoque humori permiscunt. Nocturne diligenter operiunt: namque ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quae autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta (ut in gentiane mentione retulimus,) preparantur: sed quae ex corticibus humidis, aut contusis herbis fistulantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mædragora reliquisque similibus succus sic ex acerbis vis melligo elicitur. Lycium tamen, & absynthium, hypocistis, & consimilia, decocta, eo, quo diximus, modo coguntur.

Chamaeleon albus. CAP. VIII.

**C**Hamaeleon albus, iuxta ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis viscum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche utuntur  
mul



mulieres: folia habet silybo aut carduo similia,  
 \*asperiora, acuiora, nigroque chamæleone valē. \* Sic Plin.  
 diora: caulem nō promit, verū ex medio spinas, græcus cos-  
 echini marini, aut cinara modo, erigit: flores pur- dex  $\omega\alpha\chi\delta$   
 pureos, veluti papporum lanugines emittit: semen  $\tau\iota\gamma\alpha$ , id est  
 cnici simile: radicem in latis collibus crassam, in crassiora:  
 montosis verò graciliorem, in profundo albam: ni forte  $\tau\epsilon\gamma\alpha$   
 aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem.  $\chi\tau\iota\gamma\alpha$  le-  
 Quæ pota acetabuli mensura, latus interaneorum gēdū: quod  
 tineas pellit. Bibitur autem in vino austero, cum ex herbariū  
 origani seruefacti succo. Hydropicis commodissimè collatione,  
 mē drachma in vino datur, etenim eos extenuat: si quādo vī  
 contra difficultatem vrinæ decoctum propinatur. dere contin  
 Hausta in vino, serpentum venenus resistit: occi- gat, facilē  
 dit canes & sues: mures item necat, subacta cum dyudicauca  
 polenta aut aqua, & oleo madefacta. ris.

Chamæleon niger. CAP. IX.

**C**hamæleon niger, folijs scolymo similis esset,  
 nisi minora, tenuioraq; , ac rubro distincta  
 viderentur: caulem emittit dodrantalem, crassi-  
 tudine digitali, subrubrū: & in umbella flores  
 spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores:  
 radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ  
 dissecta flauescit, & commanducata mordet. Pro-  
 uenit in campestribus, siccis, & cliuosis tracti-  
 bus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti  
 sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem  
 abigit: eadem, cum sibi sulphur & bitumen asci-  
 nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abs-  
 ter



terget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat: cum pari pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueatur: vitia cutis in facie, vitilignesq; cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedanas, tetraq; Nominis ratio. *ra* ulcera illius sanat. Quare chameleo vocetur, à variatione. rietate foliorum euenit: mutant enim cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia, alicubi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

## Crocodilium.

CAP. X.

**C**rocodilion chameleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui, aliquantum lata, odore, vt nasturtij, acuto. Feruesfacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex vt scutum, quod suapte vi vrinam ciet.

## Dipsacum, siue labrum Veneris.

CAP.

XI,

Virga pastoris vulgo.

**D**ipsacum, aculeatarum generis est: caulem habet altum, spinis horridum, folijs lactucæ, spinosis, binis genicula singula complectentibus, prælongis, cœu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula circuli capitula insunt, oblonga, echinata



nata spinis: quæ arefacta, candida speciantur, dissectaque medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanant rimas sedis, fistulasque, si tusa & decocta in vino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Aium! fornicationibus, verrucisque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo aligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba. CAP. XII.

**S**pina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, celiacis, stomachicis, & qui cruenta ex-tussunt, efficax est: urinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica. CAP. XIII.

**A**rabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, ceterasque fluxiones radix etiamnum



valet. Provenit in asperis.

Carduus. CAP. XIII.

Est gallorū  
Artichan.

**C**arduus, Græci scolymon vocant, folia chameleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora: caulem longum edit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusque corporis emendat: item si decocta in vino bibatur. Copiosam autem urinam fetidamque expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium. CAP. XV.

**P**oterium, Iones neurada vocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum ternumve cubitorum, nervosas, & firmas: quæ proximè terram recise, dant succum gummi similem. Tusa, præcisis nervis & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius nervorum affectibus prodest.

Acanthium. CAP. XVI.

\* Additum ex Plinio. **A**canthium albæ spinæ simile, folijs nucleosatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis ] ex qua collecta & neta, vestes bombycinis similes texunt. Folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Acan



## Acanthus.

## CAP. XVII.

**A**canthus, Romani paderotam vocant, na- Officinis  
scitur in hortu, petrosus, & rigus: folia ha- Branca  
bet multò lactucaceis latiora, & longiora, cruce sina.  
diuisura, nigricantia, pingua, leuia: caule binum  
cubitorum, digitali crassitudine, leuem, prope ver-  
ticem ex internallis circundatum foliolis, ceu nu-  
camenta quadam oblonga referentibus, spino-  
sis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum,  
luteum: caput thyrsi specie. Radicibus mittitur  
longu, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ vstis  
igni & luxatis artubus illitæ subueniunt: potæ  
urinam ciunt, sed aluum colubent. Ruptis, con-  
uulsis, tabem sentientibus, mirè prosunt. Nasctur  
& syluestris acanthus, scolymo similis, aculea-  
tus, breuior quàm sativus, & is qui hortis pro-  
uenit: cuius radix ad eadem, ad quæ superior,  
efficax.

## Anonis.

## CAP. XVIII.

**A**nonis, quam aliqui ononida appellant, ra- Vulgò, Re-  
mos habet fruticosos, dodrantales, aut pau- sta bonis.  
lò maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis  
alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticu-  
la, tenuibus, pusillis, ad ruta aut \* pratensis loti \* Suspicio  
folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non in- lotum syl-  
incundè olentibus. Muria conditur, amè quàm uestrem in-  
spinoza fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus telligendū:  
spinis, & veluti spiculis firmiter horrent: radi ac ob id for-  
sem mittit candidam, quæ excalfacit, & exte- tè pratens-



sem dici, nuat: huius cortex ex vino potus, urinam ciet: quod trifolium calculos comminuit, margines ulcerum erodit. In pratensis Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium constet fortium collutione mitigat. Decoctum eius potu habilius: ut volu morrhoidas sanare creditur.

mine quar= Leucacantha. CAP. XIX.

to à Diosco **L** Eucacantha, prædita est radice cyperi, valide depin= da & amara, quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino potus. Eadem ruptis & convulsis medetur. Radicis epotus succus eosdem præbet effectus.

Tragacantha. CAP. XX.

**T**ragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nititur, unde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub Officinis se spinis albas, rectas & firmas occulunt. Est Dragagan= etiamnum tragacantha, lacryma, quæ, vulnerata radice manans, concrevit. Præstat pellucens, gracilis, levis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusus voces, ceterasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque lingua liquescit, & in passio madefacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, misto cornu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryi



## Eryngium.

## CAP. XXI.

**E**Ryngium aculeatarum generis est. Cuius fo= Nunc *corru*  
lia in principio, sale condita, in cibos recipiunt pto vocaba  
tur: lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, lo Iringum  
guſtu aromatica. Sed ubi adoleuerunt, circa com= dicitur.  
plures caulium eminentias in spinas aculeantur,  
in quorum summitatibus globosa capitula, dura=  
rum acutissimarumque spinarum ambitu stellatim  
circumnallantur, quorum colos alias viridis, alias  
albus, interdum cæruleus inuenitur. Radix ob=  
longa, lata, foris nigra, internè candida, pollicis  
crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & cam= \*Per anthe  
peſtribus. Vim habet calſactoriam: pota menses ricum cau=  
& vrinas pellit, tormina inflationesque discutit: lē Asphode  
contra iocimerum vitia, serpentium morsus, & li cui aptis=  
hausla venena, cum vino prodest. Bibitur aduer= simè compa  
sus plurima, cū seminis paſtinacæ drachma vna: ratur Aloe,  
appensa illitave, tubercula discutere proditur. Po= hic intelligi  
ta cum hydromelite radix, opisthotonicis & comi= mus: quan=  
tialibus medetur.

us Diosco=

## Aloe.

## CAP. XXII.

rides in As=

**A**Loes folium scillæ similitudinem habet, phodeli si=  
crassum, pingue, modicè latum, rotundum, ue Hastulæ  
retroſus paulum: folia virique ex obliquo lon= regiæ histo  
rioribus interuallis striantur, & in spinulas de= ria, eius flo  
ſimant retuſas truncasque. Caulis emittitur non rem hoc ap  
diſſimilis \* antherico: ſlos albus: ſructus haſtule pellari no=  
regiæ cognatus: graui tota eſt odore, & guſtu mine tra=  
amariffima: radice vna, cen palo, in terram depa= dat.



Etia. Plurima præpinguisque in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimus: & in insulis (ut in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sane quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi generi: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimæ esse videtur. alterum ad iocineris imagi-

\* Plin. pin= nem vergit. Eligi debet \* syncera, quæ nihil doguis, qui nō li sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friaxαδαρᾶν, bilis, ac iocineris modo coacta, facile liquecens, ut nostri co eximiæ amaritudinis: improbatur nigra & fradices ha=ctu contumax. Gummi eam adulterant: quod debent, sed prehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: διπαρᾶν eoque argumēto, quod digitus friata nō ad minima videtur le= usque frustra resolvitur. Nec desunt, qui acaciam gisse.

immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnum allicere, & corpora densare, aliū resolvere. Stomachum repurgat binū cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu: deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle cocto sumpta, aliū soluit: purgationis perfecta causa, tribus drachmis sumitur: alijs purgatorijs medicaminibus admixta, præstat ut minus stomachum infestent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur, vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medet



medetur, & disrupta puerorum præputia imgit:  
condylomata, rimasque sedis ex passio sanat: hæ-  
morrhoidum abundantiam & sanguinis eruptio-  
nes sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores &  
insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitu-  
dines, pruriginēque angulorum, permulcet: dolo-  
rem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex  
aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum  
vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus,  
cum melle & vino proficit: oculorum medicamen-  
tu torretur, in munda & candenti testa, pennaq;  
subinde versatur, ut possit equaliter torreri. Lana-  
tur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile  
subsadat, & leue ac pinguisimum assumatur.

## Absynthium. CAP. XXIII.

**A**bsynthium, aliqui bathypicron herba vul-  
go cognita. Præstantius in Ponto & Cap-  
padocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet cale-  
faciendi & adstringendi: bilem expurgat, qua  
& stomacho & ventri inhaesit: urinam cit, &  
crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes ven-  
tru, & stomachi dolores prodest, cum fœli &  
nardo Gallico potum: fastidia discutit, & ar-  
quitos sanat madesacti dilutum, aut decocti ius,  
quotidie tribus cyathis haustum: menses cit po-  
tum, aut cum melle appositum. Contra fungorum  
strangulationes conuenienter ex aceto bibitur.  
Aduersatur iuxta venenis cum vino: item cicuta,  
& muris aranei morsibus, & draconi marino.



Angina eo cum melle & nitro perunguntur, & epimyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorum caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumque dolores decoctum vaporu suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item praecordiis & iocineri, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoque longa valetudine laboranti, cum rosaceo: cum ficis autem, aceto & loliacea farina, aquae inter cutem lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absynthiten vocant, praesertim in Propontide & Thracia, quo ad ante dicta utuntur, cum febris carent: alioquin in aestate propinant, & acceptam huic vino incolumitatem referunt. Insparsum arcis absynthium, vesles ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & a corpore arceat: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eosdem praestare effectus. At tamen pititionibus improbatur, quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Marinum absynthiū. CAP. XXIII.

**A**bsynthium marinum, quod aliqui seriphum vocant, copiosissimum in Tauro monte: iuxta Cappadociam & in Taphorisi Aegypti gigni

\* Abroto = tur: quo Isiaci pro oliuae ramo viuunt. Herba est num mare tenus, \* abrotoni parui similitudine, referta mi-  
intellige. nutulus seminibus, subamara, stomacho inimica.

Ea



Ea grauiter olet, & cum quadam calfactione adstringit: per sese, aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum laeuigat: cum edulio autem vel lentiscula decocta, eadem praeſtare poteſt. Pecora maxime pingueſcunt hoc pabulo. Tertium genus abſynthio aſſignatur, quo Gallia alpiſus finitima ſcatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua naſcitur cognomento, abſynthio nõ diſſimile, verum ſubamarum eſt, non adeo ſeminis fecundum. Eadem quæ ſeriphium poteſt.

Abrotonum.

CAP. XXV.

**A**brotonum duorum eſt generum. Fœmina quadam arboris ſpecie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, ſeriphi modo, minutim inciſis: floribus referta eſt, comantibus in ſummo, fulgore auri, corymbis: quod per æſtatem prodijt, ſuauiſſime olet, cum grauitate quadam & amaro guſtu: id genus Siculum eſſe conſtat. Alterum mas vocatur, ſarmentofum, gracilibus ramulis vti abſynthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Aſiatica, atque in Syria Hierapoli. Cruſdum ſemen, tritum & ſerueſactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulſis, ruptis, coxendicibus, vrinæ anguſtijs, menſibus ſuppreſſis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum eſt: horroribus ex oleo illinitur: ſerpentes & ſubſtratum & nidore fugat: contra iclus eorum cum vino potum prodeſt: pri-

p s



uatum efficax contra scorpionum & phalangiorum  
venena: oculorum inflammationibus commodè il-  
linitur, cum cotoneo coctis, aut pane: tritum cum fa-  
rina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit: iri-  
ni compositionibus admiscetur.

Hyssopum. CAP. XXVI.

**H**YSSOPUM, herba nulli non cognita, diuini  
generum est, montanum & hortense. Opti-  
mum est Cilicium. Vim habet extendendi & cal-  
faciendi: decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta,  
potumq; peripneumonicis, diuturna tussi, suspensio-  
nis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tis-  
neas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur.  
Crassum humorem per aluum extrahit, decoctum  
ex aceto mulso epotum: & ad subducendam aluum  
cum ficis viridibus detritis manditur, vehemen-  
tiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deicit:  
colorem in corpore fouet: lieni, & aqua inter cus-  
tem, cum fico nitroque, inflammationibus quoque  
ex vino illinitur: cum feruente aqua impositum, su-  
gillata discutit: cum decocto ficorum, optime angia-  
nis gargariatur. Decoctum cum aceto, dentium  
dolorem in collutione sedat: inflationes auricula-  
rum vaporis suffitu discutit.

Stachas. CAP. XXVII.

Officinis, **S**TACHAS iuxta Galliam in insulis eiusdem no-  
minis e regione Massilia gignitur, unde co-  
gnomen accepit. Herba tenuibus surculis, com-  
thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquan-  
do



tum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera omnia & vniuersum animantis habitum extenuat, ab obstructionibus & fartibus liberat.

Origanum. CAP. XXVIII.

**O**rganum Heracleoticum, quod & cunde-  
lam vocant, folium habet hyssopo non dissimile: umbellam autem non in rotam speciem orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haudquaquam denso. Excalfacit: unde decoctum cum vino potum, demorsis à serpente conuenit. Si cicutam aut meconion hauserunt, ex passis: si gypsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esu datur. Aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsâ, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur: ad pruriginem, psoras, regiumque morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus virentis confillis, ruam, & oris vlcera sanat, & per nares, ex oleo irino infusum, trahit: aurium dolores cum lacte mulcet. Conficitur ex eo, & capis, & rhous frutice, quæ ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo vase per dies bis videnos insolatus, dum canicula sydus flagrat. Herba autem substratu serpentes fugantur. Quæ oniti appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei organi Heraclei, sed multò inefficacior. Syluestre  
orig



origanum, aliqui panaces Heracion, alij cunila  
lam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius.  
Folys est origani, ramus tenuibus, dodrantem al-  
tis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candi-  
di: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percus-  
sis à serpente, folia & flores ex vino poti auxilian-  
tur.

Tragoriganum. CAP. XXIX.

**T**ragoriganū tenuis frutex est syluestri ser-  
pyllo aut origano similis, folio & ramulis.  
Quibusdam in locis lætius virentiusq; inuenitur,  
& latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exis-  
libus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui pra-  
sium vocauerunt. Optimum est Caledonium, & Creten-  
se, & Smyrneum, & in Chio Cooque proueniens.  
Omnia excalfaciunt, urinam cient, aluo accom-  
modantur, decocto potu bilem deijciunt, lienosis  
ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ venena  
in vino bibuntur, menses trahunt: peripneumoni-  
cus, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur.  
Grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fa-  
stidientibus & stomacho acida ructanti, imbecil-  
loq; traditur. Item si à maritima iactatione nau-  
sea, & æstus præcordiorum excitetur: tumores ve-  
rò cum polenta illita discutunt.

Pulegium. CAP. XXX.

**P**vlegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat,  
calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac  
partus eijcit. pulmonis vitia ex melle & aloe pra-  
tuntur.



tum extrahit, & convulsis auxiliatur: nauseas stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in vino utilissimè contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingivas arefacti cinere corroborat: illitum cum polenta inflammationes omnes sedat, podagris per se subuenit, impostum vsq; dum rubescat locus: cum cerato varos exlinguit, lienosis cum sale utiliter illinitur: decoctum eius ablutas prurigines mitigat, conuersas vulvas corrigit, contra inflationes duritiasq; vulvae, in defeciones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui blechona, quoniam dum floret, gustatum à pecoribus, balatum concitat.

Dictamnium. CAP. XXXI.

**D**ictamnium, aliquibus syluestre pulegium Græcus, Dictamnium vocatur. Cretensis herba est, acris, leuis, Etamnium ac pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento sic etiã Plin. quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nulum aut semen profert. Præstat omnia quæ sativum pulegium, sed efficacius multo. nam non potum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eicit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbe pastu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedibus reliquove corpori aculeos, illitu reficit. Ad lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum immunit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu calcificat.



facit, partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus praesidio est. Tanta herba facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae venenato ictu sciunt, appensaque contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, ante dicto simile, sed minus quam illud acre. Eosdem effectus praebet, sed inefficacius multo. Desertur à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbri, ramus maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus, quae aduersus serpentium iniurias consinguntur, theriaca vocant.

Saluia.

CAP. XXXII.

**S**alvia siue eleliphacon, siue ex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quae sensim attritarum quasi vestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed grani: semen summus in caudibus sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & urinas, decoctum foliorum ramorumque potus, & partus extrahit, & pastinacae marinae ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnerum sanguinem cohibet, tetra ulce-

78



ra purgat: testium pruritus sedant rami foliaque,  
si decocto eorum foueamur.

\*συνόψις.

Mentha.

CAP. XXXIII.

**M**entha, cognita herba est, calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi vim habet. Sistit sanguinem, potio ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat, venerem stimulat, singultus, vomitiones, cholerasq; sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet: mammæ, si tendantur, aut lacte turgent, compefcit: cum sale, canum morsibus illinatur: aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: vuluæ ante coitum admota, conceptioni resistit: lingue scabritiem conficta leuigat: coire lac, densariq; in caseum non patitur, si folia positionibus lactis immergantur. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Syluestris mentha, Latini menthastrum Mentha vocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore, strum. quam sisymbrii, odore magis viroso: quare minus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha.

CAP. XXXIIII.

**E**x calaminthæ generibus quadam monti Calamenebus familiaris, folia ocimi habens, incana, thum offi-rculos, & caules angulosos, purpureum florem. cinarum. Altera pulegio similis est, sed maior: quam syluestre pulegium ideo appellarunt, quod odore ipsum amuletur: nepetam Latini vocitant. Tertia men-  
thast



thastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quam superiora, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruentia, & acria: radix superuacua. Nascitur in campis, asperis, & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur. Decoctum potu menses, & urinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnoea, torminibus, cholera, horroribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat: praesumpta in vino, venenis resistit: tineas ceteraq; interaneorum animalia, cum sale & melle pota, enecat: nec secus cocta crudare, si teratur. Elephanicos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. Accensa aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & sugillata tollunt. Calamintha ischiadici imponitur, ut ex alto humores euocet: summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

## Thymum.

## CAP. XXXV.

**T**hymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs, multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpurascente refertis. Gracili solo, & petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per alium detrahat. Decocti in prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineae ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit.

vri



rinas ciet: cum melle in eclegmate, faciles facit  
excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto  
lutum: concretum sanguine dissoluit: verrucas thy-  
ni colorem reddentes, pensilesq; tollit: ischiadicis  
cum vino, & polenta impositum subuenit: hebeti-  
us oculus in cibo prodest. Perquam utile pro condi-  
mento, duntaxat ad vsus eorum, qui rectè valent.

## ANNOTATIO.

Herba, quam Medici pro satureia hodie  
surpant, hyssopi folio, thymum magnitudi-  
ne longè exuperat, vt non esse genuinam, ac  
hic descriptam, satis eius historia conuincat.

## Satureia. CAP. XXXVI.

**S**atureia triuialis notitiæ est: gignitur in aspe-  
ris locis, & tenui solo, thymo similis, minor  
tamen, & tenerior: defert spicam florum plenam,  
coloris herbacei. Eadem potest quæ thymum, si mo-  
lo consimili sumptitetur. Aptus sanis vsus: Est eti-  
amnum quædam satina, syluestri prorsus minor,  
quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in  
ribos recepta est.

## Serpillum. CAP. XXXVII.

**S**erpillum duorum generum est: Hortense odo-  
re sampsuchum imitatur, atque in coronis ad-  
li solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam  
si qua eius particula terram attingat, inibi ra-  
dices demittet. Folia & ramulos origani habet,  
sed candidiores: in maceris multò procerius as-  
urgit. Syluestre, xygis appellatum, non serpit,



sed in altitudinem increfcit, ramulos edenstemet.  
 furculosos, folijs refertos, longioribus quam ruta, &  
 durioribus, angustis: flores iucundè olent, gustanti  
 acres: radicis nullus vsus. Nascitur in petris, satius  
 efficacius, atque magis excalfaciens, & ad meden-  
 di vsum aptius. Menses trahit, urinam potu ciet: tor-  
 minibus, ruptis, & iocineris inflammationi-  
 bus, auxiliatur: & aduersus serpentes potu illitu-  
 re: capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo,  
 & malefactum in aceto: maximè verò phreniti-  
 cu, & lethargicus conuenit. Cruentos vomitus se-  
 dat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchum. CAP. XXXVIII.

**S**ampsuchum in Cypro, & Cyxiceno laudatissi-  
 mum: secundum sibi locum vendicauit Aeg-  
 yptium. Amaracum gens Sicula, & Cyxicena ap-  
 pellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs  
 eius calamint hæ, quæ tenui folio constat, hirsutis,  
 & rotundis: suauissimum odorem spirat, ideo cor-  
 nis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti  
 potus, conuenit incipientibus hydropicis, & i-  
 quos urinæ difficultas, aut tormina excruciat. Illi-  
 ta ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses sub-  
 dita in pessõ trahunt: contra scorpionis ictum ex  
 aceto & sale illinuntur: luxatus tumoribusq; ce-  
 rato excepta imponuntur: aduersus oculorum in-  
 flammationes, tumoresq; cum polline polentæ illi-  
 ni prodest. Acopis malagmatibusq; calfaciendi gra-  
 tia commiscetur.

Mel



## Melilotos, siue fertula Campana.

## CAP. XXXIX.

**S**ertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nasitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam: inflammationem omnem emollit, praesertim quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut fornigraci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaveris, intybove. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

## Marum. CAP. XL.

**M**arum herba cognita vulgò, furculosa, flore Morigani, folijs multò cãdidioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem. Substringit enim, & modicè calfacit: qua de causa illius serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tralleis copiosissima gignitur.

## Acinos. CAP. XLI.

**A**cinos aut aconos à Græcis dicitur, tenui siccoque ramulo herba, ocimo similis, odore



rata, sed hirsutior: qua coronæ factitantur. à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis. CAP. XLII.

\* οὐώδης.  
i. odorata.

**B**accharis herba \* fruticosa, quæ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squallidumq; solū amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diurnæ tussi, & urinae difficultatis menses pellit: contra serpentium morsus utilissimè datur in vino. Recens radix apposta, partum extrahit: puerperis eius decoctum in defectionibus prodest: in diapsmata utiliter inseritur, incundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitulis doloribus illitu profunt: oculorum inflammacionibus, mammis tumentibus à partu, ægypsiis incipientibus, ignibusq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta. CAP. XLIII.

**R**uta montana sylvestrisq; sativa, & hortensis acrior est, & in cibis damnata: sativa verò quæ sub ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque vrit, calfacit, exulcerat: vrit nam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibove:  
let



lethalium medicamentorum antidotum est, si semen ex vino, acetabuli mensura, ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cum nuce iuglande, aridisque ficis, inefficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conuenit: genituram cibo potuue extinguit: cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterumque dolores, difficultatem spirandi, tussēs, pulmonis inflammationem, coxædicum articularumque cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes, pota ut antè dictum est. Item ad inflationes coli, vuluæ, relique niteſtini, cum oleo decocta, & infusa. Firmas vuluæ strangulatu liberat, si à genitali, sede tenus cum melle subijciatur. Feruefacta ex oleo, & pota, ventris tineas excutit: articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias partes, & oblita. Cruda conditæque cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cum rosa ceo, & aceto illita auxiliatur, profluentem narium sanguinem sistit trita & indita, testium inflammationibus cum laureis folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto, & cerato prodest. Cum pipere autem, vino, & nitro affricta, albæ virilgini medetur. Cum eisdem illita fornicationes tollit, & verrucas, quæ thymi florem repræsentant: contra impetigines cum alumine, & melle vtilissime imponitur. Succus in mali punici caly-



ce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum feniculi succo ac melle peruncti uiuantur: ignem sacrum, ulcera quae serpunt, aut in capite manant, cum acetos, rosaceo, & cerusa persanant; mansa, aliorum caprarumque acrimonia domat. Montana, si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inspicit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Oportet itaque eam unctis antea manibus, & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis inspersum feles arcere. Adciunt eam, quae in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, vipersis scatet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est: in antidota commodè additur: contra incontinentiam urina totum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum montanum vocatur. Syluestris ruta sativa similis est. Prodest comitialibus, & coxendiculi doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Syluestris, vix pote noxia, cibis abdicatur.

Syluestris ruta. CAP. XLIIII.

**V**ocant etiamnum syluestrem rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asiae finitima vixit dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multo, quam alterius ruta longioribus, tenerioribusque, odore graui: flo-



et candido: capitulus in cacumine paulò maioris  
 us quàm saluæ rutæ, quæ tribus maximè parti-  
 us constat: in quibus triangulum semen, subru-  
 um, gustu amarum recluditur, cuius est vsus. Se-  
 nen autumno maturescit: quod cum melle, vino,  
 roco, & fieniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur  
 ontra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam har-  
 nalam vocent, Syri besafan. Qui Cappadociam  
 incolunt, moly, quoniam quandam cum moly ser-  
 iet similitudinem: radice nigra, flore candido. In  
 collibus, & læto solo provenit.

## Moly. CAP. XLV.

**M**oly folia habet graminis latiora, humi spar-  
 sa: florem albæ violæ similem, sed minorem,  
 ac magnitudine violæ purpureæ respondentem, læ-  
 teli coloris: caulem candidum, quaternum cubito-  
 rum, in cuius cacumine inest aliquid, quod ally spe-  
 ciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in  
 modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cū iri-  
 no unguento, in pessō subijciatur.

## Panaces. CAP. XLVI.

**P**anaces nonnullus heracleum dicitur, ex quo  
 opopanax colligi solet. Plurimum in Bacotia,  
 & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compendy,  
 & quæstus, qui ex eo liquore facitatur, gra-  
 tia studiose colitur. Folijs est asperis, in terra ias-  
 centibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea aco-  
 sedentibus, in ambitu quinque partito diuisis: caue-  
 le, ut ferula, altissimo, qui lanugine quadam in-



canescit, folijs etiam minutoribus obsitus, muscaris, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruienti que: radices habet multas ab origine una, candidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libye, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mersibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; , siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, interne albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, lavis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera: sed synceri experimentum est, si digitus in aqua friatus resoluitur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus febrium circuitibusq; , vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrinæ conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsæ aut vino bibitur: mentes trahit, factum enecat, inflationes, quæ vuluam malè habent, duritiasq; , ex melle dilutus, discutit:



tit: ischiadici illinitur, acopis & capitis medica-  
 minibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagri-  
 cis cum vna passa illitus subuenit: dolore dentium  
 liberat, canis induus: oculorum aciem illitu exci-  
 tat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum con-  
 tra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur.  
 Radix in ramenta conscissa, vuluæ admota, par-  
 tus extrahit: ad vetera vlcera efficax est, nuda-  
 ta ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur.  
 Semen cum absynthio sumptum, menses pellit: cū  
 aristolochia, prodest aduersus animalia quæ ve-  
 nenum ei aculantur, & contra vuluæ strangulatus  
 in vino bibitur.

## Panaces Asclepii. CAP. XLVII.

**P**anaces Asclepij caulem à solo emittit tenuē,  
 cubitalem, geniculatum, circa quem folia fe-  
 niculi funduntur, sed maiora tamen hirsutioraq;  
 odorata: in cacumine umbella, vbi flores emicant  
 aurei, odorati & acris gustus: radix parua est &  
 tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina,  
 contra vlcera, phagedænas, & tubercula, si trita  
 cum melle imponantur: aduersus serpentes ex vi-  
 no bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui pana-  
 ces sylvestre origanum vocāt, alij cumilam, de qua  
 in origani mentione diximus.

## Panaces chironium. CAP. XLVIII.

**P**anaces Chironium, in Pelio monte maximè  
 prouenit: folium eius amaraco simile: flos  
 aureus: radix parua, quæ non aliè demittitur, gu-



stus acris. Potest radix serpentium veneno resistit,  
Illita coma, eadem præstat.

Ligusticum. CAP. XLIX.

**Galenus** Li **L**igusticum, quod alij panaceam, alij panaces  
bysticum. vocant, plurimum in Liguria nascitur, in  
monte Apennino, Alpibus contermino: unde no-  
men traxit. Panaces incolæ non ab re appellant:  
quoniam & radice & caule, heracleotico panaci  
simile sit, & viribus eisdem præditum. Gignitur in  
altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maxi-  
mè παρὰ τοῖς μέγροις iuxta fluentia. Cauliculus fert anethi,  
ἀνέθου, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertula  
id est, iuxta campana, molliora, odorata, prope verticem gra-  
fossas. ciliata, & longè magis diuisa: in cacumine musca-  
rium, in quo semen dependet nigrum, solidum &  
oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre, &  
aroma olens: radix candida, heracleotici panacis  
similis, odorata. Radicis seminisque vis excalfacto-  
ria, concoquens: prodest ad intestinos dolores, tu-  
mores, cōcoctiones. Item ad inflationes, præsertim  
quibus stomachus turgeat: & contra serpentium  
ictus: urinas & menses potu trahit. Eisdem præ-  
stat effectus apposita radix. Semen cum radice  
oxyphori & medicamentis decoquentibus admi-  
scetur: ori perquam utile: quare pro pipere vtuntur  
eo indigenæ, ad obsonia. Adulteratur semine  
quodam simili, quod facile gustu discernitur: ama-  
rum enim est. Alij semen fœniculi aut seselis admi-  
scentes, ligusticum dolo vitiant.

Pass



## Pastinaca. CAP. LI.

**P**astinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara: caulem rectum, scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferè ad croceum accedente: radix digiti crassitudinis, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos vrinae difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit: serpentium morsibus ictibusq; prodest: praesumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit: venerem stimulat, partus apposita eicit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedaenas ulcerum purgant. Satiuæ ad eadem pollet, efficacior tamen, & cibo aptior.

## Seseli. CAP. LI.

**S**eseli Massiliense folia fœniculi habet, crassiora: Recentiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in ribus Siler qua semen oblongum, angulosum: degustanti statim acriter: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent: prius stranguriae & orthopnoeæ medentur, suffocationibus mulierum comitialibusq; prosunt, menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent, tussim veterem sanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus vtile, & contra perfrictiones in itineribus, cum pipere

& vin



& vino bibitur: capris, ceterisq; pecudibus, datur in potu, quò facilius suos fetus euntantur. Aethiopicum feseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suavi. Peloponnense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus prædictum est: nascitur in asperis, riguis, & collibus: in-

\* in idæ, uenitur & \* in insulis.

id est, in Creticum feseli. CAP. LII.

Idæi monte. **T**Ordylum, quod aliqui Creticum feseli vocant, iuxta Ciliciam in Amiano monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinae difficultatem bibitur, potu cit menses. Succo seminis, caulisque virentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Sison. CAP. LIII.

Hic omissa **S**ison exiguum semen est, in Syria natum, apio est ab inter simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lieprete describis vitia bibitur, urinae difficultatem potu emendat, remoratos menses citat. Quo in condimentis,

cum



cum cucurbita, & aceto, indigenæ vtuntur. In ca-  
cumine granula multa gerit.

Anisum. CAP. LIIII.

**A**Nisum in summa excalfacit, exiccat: oris  
halitum iucundiores facit, doloris leuamē-  
tum præstat, urinam ciet: aquam, quæ subijt cu-  
tem, dissipat, potum sitim colibet, animalium ve-  
nenis aduersatur: valet ad inflationes, aluum &  
alba fœminarum profluvia sistit, lac ad mam-  
mas elicit, venerem stimulat: dolores capitis leuat,  
suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instilla-  
tūque, fractis auribus medetur. Melius semper  
recens, plenum, non surfurosum, odore præstans.  
Inter prima laudatum est Creticum, proximo lo-  
eo Aegyptium.

Carum. CAP. LV.

**C**Arum, semen est vulgaris notitiæ. Excalsa-  
cit, urinam concitat, stomacho vtile, os com-  
mendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur  
antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix  
cocta, pastinacæ modo manditur.

Anethum. CAP. LVI.

**A**Ridi anethi comæ seminisq; decoctum, potu  
lac euocat, inflationes & tormina sedat,  
aluum vomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus \* τὸ ἴ  
lenit, oculorum aciem hebetat, & genituram re- σπέρμα  
stinguit assidue potum. Fœminis vuluæ malo op- καὶ ἡ γυνή  
portunis, ad desefsiones vtile, \* condylomata illius κατὰ πλά-  
eius cinis tollit. σίμ.

Cum



## Cuminum satium. CAP. LVII.

**C**uminum satium origratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocratei regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orihopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut loli farina ceratove. Mensium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & uariis obiectum, sanguinis profusio sistit. Colorem bibentium aut pernicietorum mutat in pallorem.

## Syluestre cuminum. CAP. LVIII.

\*Sic quidē **S**yluestre cuminū, plurimum efficaciusque in Græcis: Lycia & Galatia Asia, atque Carthagine sed rectius ne Hispania gignitur: frutice paruo: dodrantali Marcellus, caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, Galatia Arabus, ueluti serratis, & gingidij diuisura. In capitamine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerosum, gustu satino acriore: nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesque: item contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto sedat, stomacho utile, quem humor rexat, sugillata tollit, si manducatum cum melle, & uua passa illitur.



naturæ testium inflammationibus, adiectis eisdem illitum medetur. Est & aliud sylvestris cuminis genus, satino non dissimile, quod à singulis floribus promit cornicula in sublimie exserta, in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpentium moribus præsidio est. Calculosis & ijs qui urinae stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur sed apud semen feruifaculum postea bibendum est.

Ammi.

CAP. LIX.

\*ἐνίοι κρο

**A**mmi \* Aethiopicum cuminum appellant, ἄμμι. \* plerique hoc natura diuersum esse ab illo \* οἱ ἵ βασι existimant. Vulgò notum est: semen exile, multò miλιόν κύνus cumino, origanum \* respiciens. Eligendum est μινον καπυrum, minimè fursurosus. Vis ei excaustoria, λῆσις, ἔρferuens, & exiccās: facit ad tormina, urinae difficultatem, serpentium ictus, cum vino potum: men- \* τῇ κόβαρ-ferua ciet. Miscetur derodētibus cantharidum medicamentis, quæ eccloria vocant: ut inde exortis urinae difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit, colorem potui aut illiti mutat in pallorem. Suffusum cum rui passa aut resina, vulnus purgat.

Coriandrum.

CAP. LX.

**C**oriandrum, aut corianum, vulgaris est notitia, vim refrigeratoriā habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, medetur: epynclidas cum melle vel rui passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat: cum faba fresa, strumas & tuberculo



ἐλίγον.

bercula discutit: tineas interaneorum expellit\* semen cum passo potum, & genituram adauget: largius autem sumptum, mentem non sine periculo mouet, quare continuo, & copiosore usu abstinendum. Succus cum cerusa, spuma ve argenti, necnō aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

## Hieracium. CAP. LXI.

**H**ieracium magnum, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitum, stomacho æstuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia eodem modo obtinet ex interuallis diuisa per ambitum, cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

## ANNOTATIO.

Capitula cicutæ. ] Legitur in Græcis, corruptè ac nullo planè, si quid est in me iudicii, sensu, κεφάλια μνηκωνίων παριμφορῶν. id est, capitula succo papaueris similia. Videtur autem locus ex Theophrasto ac Plinio, quo Oreoselinon cicutæ folio describunt, hoc modo posse restitui: φύλλα κωνείων παριμφορῶν, id



id est, folia cicutæ non absimilia: quod cum aliis satis aptè cohæret. Velim tamen in hac re, vt & aliis omnibus, suo quæque vti iudicio.

Apium.

CAP. LXXII.

**H**ortensis apij herba ad eadem, ad quæ co= Nostrum Pec  
rianum, conuenit: inflammationibus oculorum, cum pane aut polenta illinitur: æstuantem vt colligit  
stomachum mulcet: mammarum duritiam ex la= tur ex no= cte concreto cōtractam reprimat: urinam ciet, siue tu Plinij.  
crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radi= cisque potum, venenorum noxæ resistit, quum vomitiones excitet: aluum cohibet. Semen vehemen= tius urinam pellit: contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admiscetur medicamentis, quæ dolorum leuamenta præstant: theriacus quoque, ac tussis remedijs. \* Eleoselinum in humidis nasci= \* Apium offi= tur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. Oreocinarum.  
selinum, caule est dodrantem alto, ab radice tenui exemite per cuius ambitum ramuli, \* & capitula cicutæ, multò tamen tenuiora: semine cumini, oblongo, acris, & odorato, tenui: nascitur in petrosis & montibus. Urinam ciet, semine ac radice in vino potus: menses trahit. Antidotis, nec non medicamentis urinam cientibus, & excalfactorys, inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis pro= uenit: aliud enim est petroselinum. Petroseli=

r



num in Macedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammi, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admisceatur antidotis vrinam cientibus. Hipposelinum,

\* Galenus \* Latini olusatrum appellant, aliqui smyrnion, Smyrnum. quantum aliud sit, quod propriè smyrnion dicitur, de quo se= ut paulò post referemus. Est autem maius & sa= quenti cap. tiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habentibus Romanis te veluti lineis: folijs latioribus, in puniceum versic dictum gentibus: coma roris marini, florum plena, deperuisse, lib. 2. dentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflo= de Alim. si rescat: ea semine turget nigro, oblongo, acri, solis cult. tradit. do, aromatico: radix dimittitur odorata, candida nec crassa, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus nascitur. olerum generis, ut apium. Radix cruda coctare estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudæque muria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso vino menses cieat: algentes calfacit potu aut illitu: vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Smyrnum. CAP. LXIII.

Smyrnum, quod in Cilicia petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur. Cauleni habet apij, & stolones multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, color



olore in luteum languescente : capitibus caulium  
 orbiculatis , vt anethi : semine brassicæ , rotundo ,  
 nigro , sapore aspero , sicut myrrha , ita vt al-  
 ium aliterius loco cedat : radix quoque odora-  
 ta , gustu acri , fauces mordet , succosa , mollis :  
 cortex eius foris niger , intus viridis , aut subalbi-  
 us . Nascitur in saxosis , & collibus , atque squali-  
 didis , & limitibus terrenis . Vis radice , herbe , &  
 seminis excoquere . Folys muria maceratis ad  
 obsonia vtuntur , aluum sistunt , radicem contra  
 serpentium iclus bibere conuenit , tussis & ortho-  
 pneas mitigat , vrine difficultati medetur : recen-  
 tes tumores , collectiones , duritiâsque discutit , illi-  
 ta & vulnera ad cicatricem perducit : partus abor-  
 tu vitiat , si feruefacta subiiciatur . Semen , lienis ,  
 renum & vesicæ vitijs prodest : menses & secun-  
 dus pellit : commodè datur ischiadicis in vino , in-  
 flationes stomachi lenit , sudores ciēt , & ructus .  
 Peculiariter datur hydropicis in potu , & contra \* Intellige  
 febrium circuitus . non corona

Elaphobosum . CAP. LXIII . riam rosma

**E**laphobosco fœniculaceus caulis est , \* aut rimum : sed  
 erorimarino similis , geniculatus : folys duum eâ , quæ simi-  
 digitorum latitudine , vt terebinthi , prælongis , pliciter hoc  
 aliquantum asperis , circumfractus : adnata mul- nomine ap-  
 ta habet , ferentia umbellæ anethi similes , & se- pellatur . de  
 mina eiusdem : florem subluteum : radice ternum qui capit.  
 digitorum longitudinis , & crassitudinis vnus , lxx . huius  
 candida , dulci , esui apta . Caulis tener pro olere libri .



manditur. Contra serpentium ietus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruus serpentium moribus resistere.

Fœniculum.

CAP. LXV.

**F**œniculum si herba edatur, aut semen cum ptisina bibatur, mamma lacte replet. Coctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet: contra serpentium ietus in vino conuenienter bibitur: mensciat: in febribus nauseam & stomachi feruorem ex aqua frigida potum sedat. Contritæ radices & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandâ oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi, ramulisque & radicibus prima germinatione incis. In Iberia, quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt, ignique admouent, quò facilius ut calor exudans, gummi remittat, quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum

Fœniculum erraticum, siue hippo-

marathrum. CAP. LXVI.

**E**st & syluestre fœniculum, magnum: ferunt autem semen cächryi simile, cuius radix incundè olet, potaque stranguriæ medetur: menses imposita ciet: ventrem sistit, radice aut semine pota, & contra serpentium morsus auxiliatur, calculosq.



osq; comminuit, & regium morbum expurgat: la-  
tis abundantiam facit decoctum foliorū haustum,  
& feminas à partu purgat. Traditur aliud hip-  
pomarathri genus, longo, exili, & angusto folio:  
semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-  
calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo  
respondet, sed ad omnia infirmius.

## Daucum. CAP. LXVII.

**D**AUCUM aliqui Daucium vocant. Creti-  
cum folijs fœniculo simile, minoribus &  
enuioribus: caule dodrantali, umbella coriandri,  
lore albo: semine acri, candido, hirsuto, suauissimi  
doris in mandendo: radix digitali crassitudine &  
dodrantis longitudine adolefcit: in saxosis nascitur,  
& locis sole illustratis. Aliud eius genus, syluestri  
apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis  
gustus. Probatissimum Creticum. Tertium asiti-  
gnatur genus folijs coriandri, floribus albis, capite  
& semine anethi, muscario pastinacæ: semine ob-  
longo, ceu cumini, acri. Omnium semen excalfacit:  
potum vrinam, menses, & partus extrahit, tormi-  
nibus liberat, veterem tussim mitigat: phalangio-  
rum moribus potum in vino auxiliatur: tumores  
illitu discutit. Seminis duntaxat in alyis generibus  
inualuit vsus: in Cretico, etiam radice, quæ maxi-  
mè contra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

## Delphinium. CAP. LXVIII.

**D**ELPHINIUM, surculos emittit à radice vna  
sesquipedales, aut maiores, à quibus folia



exerunt parua, tenuia, diuisa, prælonga, quæ delphicorum effigie representant; unde tractum nomen est. Flos violæ alba non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo non aliud utilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atque igna nos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est delphinium, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

## Pyrethrum.

CAP. LXIX.

**P**yrethrum Romani saluareem vocant, folia caulēque emittit vt daucum syluestre & faniculum: umbellamque anethi, circinata & rotunditatu. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit; ideò in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit: sudores ciet, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax est & contra perfrictiones membrorum, resolutio- nēque eximiè conducit.

## Rosmarinus.

CAP. LXX.

**D**vorosmarini genera: vnum fecundū frugiferūque, cuius semen canchrys vocatur: folia feniculi habet, crassiora & latiora, in rota speciem, humi sparsa, incundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiore, multis concanum alu:

in



in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit: radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferēs latum, nigrum, uti sphondylion, odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluvia sistit, sedis inflammationes & condylomata mitigat, concoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem agrè perducuntur. Sicca radices cum melle ulcera purgant: torminibus in edentur cum vino potæ, & contra serpentium morsus conveniunt: menses & urinas cient, veteres tumores illitu discutiunt. Tam radice quàm herba succus, adiecto melle illitus oculorū aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet, si comitialle malum sentiatur, aut vetus pectoris vitium, auxilio est: regio morbo laborantibus cum vino & pipere datur: sudores movet, cum oleo perunelum: ruptis & convulsis prodest: podagris, cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur: purgat vitiliginēs, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica na-



sci, folijs lactucæ syluestris amaræ asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus author est: potuque idipsum alterutra parte purgare. Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi, quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluiatur.

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXI.

**R**osmarinum, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè virentia, \* Commo- \* graui odore. Excalfactoria vi præditum est: redius Mar- gium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante excellentus, cum citationes bibatur: & ubi laborans exercitationi granitate se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, glencinóque vnguento admisceri solet. odorata.

Sphondylium. CAP. LXXII.

**S**phondylium folia quadamtenus platani & Spanacis habet: caules feniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nasciur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit: medetur iocineris vitis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vulnarium strangulationi. Vternosos suffitus reuocat: cum oleo commodè infunditur capitibus phreni-



ticorum, & leihargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrasa eadem, & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula.

CAP. LXXIIL

**E** Viridi ferula medulla pota utilis est ad cruentas excreationes, coeliacasq; & contra viperarum morsus in vino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosis auxiliatur sudores ciet,uncto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt muria conduntur. \* Ferula itaque caulem profert terminum saepe cubitorum: folia feniculi, longè asperiora, & latiora. qua ab imo caule vulnerata, sagape codice nonum efficitur.

stro græco,

Peucedanum.

CAP. LXXIIII.

ac antiquis

**P** Eucedanum, caulem emittit tenuem, gracilem, lentum, feniculo similem: comam habet stantem ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa. gignitur in montibus opaci. Tenera radix cultello conciditur, profluensque è plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premar, & vertigo sentia-

r s



tur. Affatione radix inutilis fit. Tami lac, quàm  
succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è  
mandragora: verum inefficacior succo lacryma  
habetur, & velocius expirat. Interdum etià con-  
creta inuenitur lacryma, thuris similitudine, cau-  
libus radicibusque adherens. Præfertur succus è  
Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui,  
feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum pence-  
danium prodest lethargicis, phreniticis, vertigin-  
osis, comitialibus, & longis capitis doloribus, re-  
solutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus, in vniuer-  
sum, vitij nervorum, ex oleo & aceto illitum pro-  
dest. Eius olfactu respirant vulnè strangulatus,  
& veteri si renocantur: incensum serpentes abi-  
git. Aurium doloribus convenienter ex rosacea  
instillatur. canernis dentium inditum, mitigat do-  
lorem: contra tussim efficacissimè ex ovo assumi-  
tur, suspirijsq; & torminibus, & inflationibus  
subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absorbit,  
difficiles partus mirè adiuvat. Facit ad vesicæ cru-  
ciatus, & renum distentiones potum, & vuluam  
aperit. Radix ad eadem utilis est, sed ineffica-  
cior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida  
ulcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squa-  
mas osium extrahit. In cerata, & calfaciètia ma-  
ligmata additur. Radix eligi debet recens, quæ ca-  
riem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad  
potiones amaris nucibus aut ruta, aut pane calido,  
aut anetho resoluitur.



## ANNOTATIO.

\* Herba doctis omnibus pro melanthio secepta, foliis fœniculum potius quàm senecionem videtur imitari, vt certè locū hūc esse aut depravatū, aut verum ignorari melanthion, sit suspicandum.

Gith, seu Melanthium.

## CAP. LXXV.

**G**ith exilibus surculus fruticat, saepe binos drantes excedens: folijs \* vt senecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui paruo, cœu papaueris, oblongo, intercurstantibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresque vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum vetere urina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto, & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in linco, & olfactum: urinam & mēstrua ciet, multis diebus sumptū, & sic extrahit, difficultatem spirandi cum vino potum leuat: phalangiorum moribus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotū enecare.

Laserp



## Laserpitium, &amp; Laser.

CAP. LXXVI.

**L**aserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix excalfacit: in cibis agrè concoquitur, vesicae noxia: sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat, cibis aut sali permista. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. praefertur autem rufum, translucens, myrrhae æmulum, non porraceum, odore valens, suauis gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenai cum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeò ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabae lomento: quod maleficium deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia maspeton vocauerunt. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctis cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: canernis den-

tinnit



stium in dolore inditur, aut cum thure in linteo  
circunligatur, aut cum hyssopo, ficus coctus in pos-  
sca, os colluitur: ys prodest, quos bestia in rabiem  
efferata momorderit, vulneribus immissum: va-  
let aduersus venena telorum, & animalia o-  
mnia, quæ virus ei aculantur, potum, aut illitum:  
scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur:  
gangranis præcoërcitis immittitur: & cum ru-  
ta, nitro & melle, vel per se, carbunculus: clauos  
callōsque prius circumrasos vellit: cerato aut ari-  
dorum sicum carne præmollitunt, recentes liche-  
nas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, po-  
lyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio,  
aut æruginē illinatur: extuberantia cum forfice  
extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur:  
grauem subitoq; irrauescentem vocem, dilutum  
aqua, sorbitione confestim expedit: ruan illi-  
tum cum melle reprimat: anginis ex aqua mulsa  
vtilissimè gargariatur. vescetes eo, latiore colore  
mangoniatur: tussi commodè in sorbili ouo datur,  
& pleuriticis, in sorbitionibus: in fellis suffusione,  
& aqua inter cutem, cum aridis ficis: horrores  
discutit cum vino, pipere, & thure potum: neruo-  
rum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli  
pondere deuorandum: herentes gula hirudines,  
gargariatum cum aceto decutit: ad lac intus  
coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso  
proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha po-  
tum: celiacos adiuuat, in acino vna sumptum:

cum



cum lixiuio autem potui datum, repenit conuulsis ruptuq; prodest: ad potiones resoluitur, nucibus amarioris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius: cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maxime cum vox retunditur: eo cum lactucis vititur: exitq; in vicem erucæ. Fertur & altera magdalis in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. CAP. LXXVII.

**S**agapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis, & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu: in vnguenta probe admittitur: menses pellit, sed fetum exanimat, cum hydromelite potum prodest ex vino haustum: serpenium ictibus: olfactum ex aceto, vuluarum strangulatus exiccat, oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut laser, ruta, aqua, & amarioris nucibus, aut melle, aut calido pane.

**E**uphorbium. CAP. LXXVIII.  
Euphorbium Libyca arbor est, ferulæ speciem



ciem habens, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turgēt: Græcus, in cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, Timolæos villos ventres elutos, arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimque ē plaga, perinde atque vase quodam, in ventriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus ei aculatur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocolla modo emicat: alterum in ventriculis concreſcit, atque vitreum spectatur. Eligendum est translucēs, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocolla, & glutini mixtione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obiciatur, planè euphorbium respiciat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutiit: potius tota die exurit: quare melli collyrijsq; pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus: squamas ossium eadem die eximit: verum eo viētes, necesse est linamentis aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

Galbanum.

CAP. LXXIX.

**G**albanum succus est nascentis in Syria ferula, quod nonnulli metopium vocant. Maxime



ximè laudatur cartilagosum, merum, thuris ef-  
 figiem præbens, pingue, minimè lignosum, reti-  
 nens nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, graui  
 odore, neque valde humidum, neque nimis ari-  
 dum. Adulteratur fîba fresa, resina & ammoniac-  
 co. Galbanum excalfacit,urit, extrahit, discutit:  
 menses ac partus trahit appositum vel suffitum: len-  
 tiginè aceto & nitro perunctus tollit: deuoratur  
 adtussim veterem, difficultatem spirandi, suspi-  
 ria, rupta, conuulsa: aduersatur toxicis, potum  
 cum vino & myrrha. simili modo sumptum mor-  
 tuos partus extrahit: imponitur lateris doloribus,  
 & furunculis comitiales, & vuluæ strangulatus,  
 & vertiginosos olfactu suscitatur: si uratur, fugat  
 nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur:  
 serpentes cum oleo & sphondylo circumpositum,  
 necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis in-  
 ditum, mitigat: urinæ difficultati prodesse existima-  
 tur. Resoluitur ad potiones amararum nucibus, aqua,  
 aut ruta, aut calido pane, mulsaue, aliàs meco-  
 nio, cre vsto, aut felle liquido. Si purgare Galba-  
 num. voles, in feruentem aquam demittito: nam  
 que cum liquefactum fuerit, eius sordes fluita-  
 bunt: quas hoc modo facillè separabis: mûdo linteo  
 raroq; alligatû in fictili aut ærea pyxide ita pen-  
 deat, vt imum vasis ne tangat: opertoq; vase in  
 feruidam aquam demittito: sic enim syncerum  
 veluti per colum eliquescet, & lignosum in linte-  
 remanebit.

An



## Ammoniacum. CAP. LXXX.

**A**mmoniacum, ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, sincerum, nulla sordis spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod verò terram, & calculos collegit, phryma. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiasq; discutit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachmæ pondere haustum: articulorum coxendicumq; doloribus liberat: auxilio est anhelantibus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisanae succo sorbeatur: cruentam urinam pellit: albugines oculorum absterget: genarum scabritiam absument: tritum autem cum acetico, & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat: discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxendici cum dolores eo perungi utile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

## Sarcocolla. CAP. LXXXI.

**S**arcocolla, lacryma est arboris in Perside nascentis, pollinis thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones in-



hibet: emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

Glaucium. CAP. LXXXII.

**G**laucium, succus est herbae, quae ad Hierapopolim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati pauperis, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigenae, usque dum flaccescant, deinde conusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamenta, ut pote cum inter initia refrigeret.

Glutinum. CAP. LXXXIII.

**G**lutinum, quod xylocollan, alij taurocollan vocant, praestantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est, & translucent. Nigrum verò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasque cuius delet: ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. vulneribus prodest, melle aut aceto madefactum.

Glutinum piscium. CAP. LXXXIV.

**I**chthyocolla, gluten piscium, venter est piscis cetacei. Praestat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefit. Utile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanistris, quae cutem faciei erugant, & extendunt.

Viscum. CAP. LXXXV.

**V**iscum optimum est recens, inius porraceum

extr.



extra fuluum, quod asperi nihil, aut fursurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fruticulis folio: contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus: quinetiam inuenitur in quondam fruticum radicibus. Emollit, discutit, exarabit: parotidas, tubercula, ceterasque collectiones ad maturationem perducit: cum resina autem, & era pari, epimychidas in splenio sanat: vetera & nova abscessusque, quos cacoethes vocant, ex thure mollit: lienem cum calce, gagate, aut Asio apide coctum, & impositum absomit: cum sanalaracha, aut auripigmento illitum, ungues exarabit: mustum cum calce, & vini fece, suam vim intendit.

Aparine.

CAP. LXXXVI.

**A**parine ramus multis, & paruis fruticat, Vulgò asperis, quadrangulis, per intervalla orbicu aspergula. ato foliorum ambitu, ut in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concavum, album, umbilici figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice utuntur, ad eximendos à lacte pilos. Seminis, canthum, ac foliorum succus, potu contra viperarum & halangiorumque morsus auxiliatur: infusa aurum doli medetur. Herba cum axungia trita strumas discutit.

Alyssum.

CAP. LXXXVII.

**A**lyssum exiguus frutex est, unicauis, sub-



asper, rotundus folijs fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen, quadam tenus latum. in montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctum singulis sine febre, potu discuti: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur: cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat. cuncta in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. CAP. LXXXVIII.

**A**sclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris viris graue: semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ mammarumq; vlcera, quæ cacoethe vocant, illinuntur.

Atractylis. CAP. LXXXIX.

**A**tractylis, spina est cnicæ similis, folia multò longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaq; , qua feminae profusis vtuntur: capitula in cacumine spuis horrèt. flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere, & vino teruntur utilissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsamq; deposita statim recrudescere.

Pol



## Polycnemum. CAP. XC.

**P**olycnemon, frutex est surculosus, folijs origani caule, ut pulegij, geniculu multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. Ad urinae stillicidia ruptaq; cum vino bibitur.

## Clinopodium. CAP. XCI.

**C**linopodium frutex est folijs serpyllo similis, surculosus, duum dodrantum altitudine. nascitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex intervalis distincti speciem lecti pedum praebeant. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad convulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochorodons vocant, eijcit, aliquot diebus potum. alium sistit decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

## Leontopetalum. CAP. XCII.

**L**eontopetalon, caulem emitit dodrantalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parva duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemone similes, punice coloris: folia brassicae, sed papaveris diuisura: radicibus nigris, rapae similibus, strumosis. nascitur in arvis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota: nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.



## Teucrium. CAP. XCIII.

\* Chamæ-  
dryos.

**T**eucrium, siue, vt alijs placet, teucriis, herba est virgæ referens effigiem, \* trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; vberim prouenit. Recens cum posca, aut arida serues facta ius, potu lienem potenter absumit: lienosis cum aceto & fici illinitur: item serpentium moribus ex aceto solo, sine fici.

## Trissago. CAP. XCIII.

**C**hamædryis Græcis, alijs chamædrops, Latini trissago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis frutetibus. \* Plin. color dodrantalis, folia habens exigua, amara, \* effigie re: quod & diuisura quercus flore paruo, penè purpureo ipsum herbarum carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta pulchrè etia. potu tussibus, indurato lieni, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: citi menses partus extrahit, lienem ex aceto pota consumit: ac uersus serpentium venena ex vino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est ca facere.

## Leucas. CAP. XCV.

**L**eucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato efficacior tamen quàm satina habetur. Vtraque e-  
rin



vino contra animalium venena, præcipue marinorum opitulatur.

Lychnis. XCVI.

**L**ychnis coronaria, flore est albæ violæ simili, sed purpureo, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bilem per aluum detrahitis, semine duabus drachmis posito: ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium. CAP. XCVII.

**L**ilia coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam vocata. E quibus vnguentum temperatur quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, nervos & priuatim vuluæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: seruefacta, ambustis proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati ulcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vuluam emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervus præcisus, luxatusq; medetur: vitilignes, furfures, & lepras emendat: ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici, mutandis testium inflammationibus. Semen potum



morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris se=  
 \*πρὸς πυρᾶ, men & folia cum vino illinuntur. Tradunt & \*ru  
 id est, pur=bra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphy=  
 purea. lia, efficacissima unguentis nascuntur.

Ballote. CAP. XCVIII.

Vulgò  
 Prasium  
 fœtidum.

**B** Alloten, nomine alio nigrum marrubium vo=  
 cant: caules edit quadrangulos, nigros, sub=  
 hirsutos, complures ex vna radice: folijs maioribus  
 quàm marrubi, hispidis, cingentibus per interual  
 \*εργυράλα caulem, \*subrotundis, graueolentibus, apiastro  
 \*εργα. r. ro=proximis: unde aliqui apiastrum eam vocauerunt:  
 iudioribus. candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem  
 Plinius ni=coronant. Vis eius eff. cax aduersus canis morsus,  
 grioribus: folijs ex sale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia,  
 quod magni ut condylomata reprimant: purgant & sordida vl  
 arridet. ceracum melle.

Apiastrum. CAP. XCIX.

Melissa of=  
 ficinus.

**M** Elissophyllon siue melihant, id est, apia=  
 strum, id sibi nomen usurpauit, quoniam  
 apes ipsa herba delectantur. cauliculi & folia bal  
 lota, de qua paulò antè diximus, similia es=  
 sent, nisi maiora, tenuioraque, nec ita hirsuta spe=  
 ctarentur: citreum malum olent. Folia cum vino  
 pota aut illita prosunt contra ictus phalangiorum,  
 scorpionumq; item aduersus canis morsum. Deco=  
 cto eorundem gratia, fœueri prodest: defectionibus  
 foeminarum ad ciundos menses conuenit, dentes  
 eodem in dolore colluuntur, dysentericis infundit=  
 ur. Fungorum strangulationibus folia, addito me=  
 tro,



tro, potu auxiliantur: terminibus & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutunt, & acco-  
ra purgant, articulares dolores illita sedant.

## Marrubium. CAP. C.

**M**arrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem aequat: subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex intervallis: flores verticillato ambitu, asperi. nascitur propter aedificia, ruinas, & rudera.

Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspensio, sufficiens, & ad tabitudinem redactus. Crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eicit. Mulieribus à partu non purgatus datur, ut menstrua & secundus extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsæ sunt: vesicam renesque ledit. Folia cum melle illiuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia nomasque sistunt, laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat: naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus convenienter insillatur, per se aut cum rosaceo.

## Stachys. CAP. CI.

**S**tachys frutex est, marrubio similis, sed longior folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris incundi, & complures virgas



ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet excaustoriam & acrem siliorum decoctū potū pellit menstrua & secundas.

Phyllitis.

CAP. CII.

**P**hyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora. Sena aut septena, recta, quæ parte anteriore lanua cernuntur, à tergo autē penfiles quasi vermiculos tennes ostendunt in umbris & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbior: neq; caulem, neq; florem, neq; semen profert. Folia in vino pota serpentium morsibus aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta aluius exercet, potui dantur.

Phalangium.

CAP. CIII.

**P**halangium à quibusdam phalangites vocatur\* ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, in γὰρ ἡ δὲ λω λω diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, μὴ ἀκύνθου ἁρ τας incisurus habens: semine nigro, lato, ad lenκαλῶσι. tunc dimidiata figuram, multo tenuiore: radice \* Ita Plin. parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruiuntur. Græ. tur. prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos eius πᾶχυ, cum vino pota, auxiliantur contra scorpionū phalid est, crassiorumq; ictus: tormina quoq; discutunt.

Trifolium.

CAP. CIIII.

**T**rifolium, Græci triphylon, alij oxytriphylon, alij menyanthes, alij asphaltion, vocat. Frutex supracubiti altitudinem attollitur, virgas habens tennes, iunceas & nigras, inde ramulares



lares evascentur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, lotis arbori similis: his recentibus enatis rui odor inest: ubi autem adoleverunt, butumen olent. Florem edit purpureum, semen quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus. & his qui aqua inter ciuitem principia sentiunt, firminis quoque vulnere vitio opportunis, auxiliantur: menses ciunt: terna drachmæ è semine dari debent, è filiis verò quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum fecti dolores eorum finire, quos serpentes percusserint: qui autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dedere: & in quartanis, quaterna, ut quæ febrim circuitus discuterent. Radix amidotis inseritur.

Polium. CAP. CV.

**D**VO genera polij: montanum, cui tenuis nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, dodrantulis, semine refertus: capitulo in cacumine quamdam corymborum speciem præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauius olente, non sine quadam suauitate. Alte-

rum



rum fruticosus, non usque adeò valens odore, & viribus infirmus. Potum feruifacilius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio, & lien sis ex aceto: stomachum malè habet: caput doloribus afficit, aluum & menses citet: substratum suffumumve serpentes abigit: illi um rana conglutinat.

## ANNO TATIO.

Scordii hoc loco depicti vberimus ubique est proventus, ut non iniuria eorum sit explosus error, qui allium sylvestre, aut obuiam quamcunque herbam allium subolentem, hoc esse opinabantur. Est autem præter id, Plinio libro 25. cap. 6. authore, aliud quoddam genus latioribus folijs ac mentha stri effigie, cuius nuper in monte quodam ad Viennam ingens se copia nobis obtulit: nec alia sanè nota, quàm foliorum cum mentha stro similitudine, à scordio huic authori descripto, differre obseruauimus.

## Scordium. CAP. CVI.

**S**cordium in montibus & palustribus nascitur, folijs trissaginis, maioribus, nò sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustus amarus & adstringentibus: quadrangulus caulibus, subrubro flore. Herba vim ex calfactoriâ habet: urinam cit. Cocta recens aridave cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & urine diffi-



difficultatem, binis drachmis cum hydromelite:  
 crassamen purulentum pectore expellit. Facit ari-  
 de farina ad veterem tussim, rupta, conuulsa, si  
 cū nasturtio, melle & resina misceatur in ecleg-  
 mate: inflammata modicè præcordia, cerato exce-  
 pta, recreat: cum aceto acri aut aqua, podagris cō-  
 uenienter illinitur: menses impoſita mouet: vulne-  
 ra conglutinat: vetera vlcera purgat, & ex mel-  
 le ad cicatricem perducit. Sicca excrescentias in  
 carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. In-  
 ter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;

Tussilago. CAP. CVII.

**T**ussilaginis folia sunt maiuscula quā hede Vulgò vni-  
 ra, sex aut septem à radice subalbida à ter- gula cabala-  
 ra, supernè virentia, in plures angulos excunſa, lina.  
 caulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo-  
 nā cum cāule confestim exiit: inde nonnulli  
 hū vacare existiſimauerunt. Radix tenuis est &  
 superuacua: nascitur in amœnis & riguis. Folia  
 ex melle trita igni sacro & omnibus inflamma-  
 tionibus illitu medentur. Arida fumus per insun-  
 dibulū hianti ore rapta, hos sanat, qui sicca tussi  
 atque orthopnœa infestantur: pectoris vomitus  
 rumpit. Eundem effectum præbet siffita radix.  
 Decocta in hydromelite, & pota emorruos parius  
 cūcit.

Artemisia. CAP. CVIII.

**A**rtemisia magna ex parte in maritimis na-  
 scitur, absynthy modo fruticosa, maioribus  
 & ping



& pinguioribus folijs, ramisq; huius quidem genera duo. Vnum latius habitiusq; folijs virguq; latioribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sumi qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellāt, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scattente tenuibus, flauo colore: hæc incudioresquā precedens effiat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat: feruefacta conuenienter in muliebres desessus adiiciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos cōminuunt: remorata mtrina cient: menses pellunt pubi illita. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ infectio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia. CAP. CIX.

**A**mbrosia pasillus frutex est, ramosus, altitudine trium palmorum: folijs rute, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suau: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illius adstringere humores, qui in aliquam partem incunibunt.

Botrys. CAP. CX.

**B**otrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alis sparsa: semen circa totos ramos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem odorem



adorem spirat:quare vestimetis interponitur:inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopneas mulcet. Hæc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

## Geranium. CAP. CXI.

**G**eranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quædrachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ, in binas videsummis alis sursum spectantia gruum capitula gò. insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullus in medicina vsus.

## Gnaphalium. CAP. CXII.

**G**naphalij folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam.

## Typha. CAP. CXIII.

**T**ypha folium edit \* cyperidi simile: caule \* Intelligem album, leuem, æquabilem: florem in ea quam lib. cumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur. i. cyperum tur, quod paniculâ aliqui nominat. Huius herbe vocant. flos suillo adipe eluto exceptus, ambustus medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

## Circea. CAP. CXIIII.

**C**ircea, quam & dirceam aliqui vocant, folijs est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine mili, nascente in quibusdâ veluti corniculis: dodrâali radice, triplic



plici ferme aut quadruplici, candida, odorata, ex-  
calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento  
perflatus. Radicis tuse pondo quatuor, in sextarijs  
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-  
tur, potuq; triduo vulus expurgant. Semen in sor-  
bitionibus datum, lacte mammæ nutritiū explet.

Oenanthe. CAP. CXV.

Videtur no-  
stra Filipe-  
dula.

**O**enanthe folia habet pastinacæ: florem can-  
didum: caulem crassum, palmi altitudine: se-  
men atriplicis: radicem magnam, in multa rotun-  
da capitula extuberantem: nascitur in petris. Cau-  
lus eius & folia, cum mulso vino pota secundas ej-  
ciunt. Radix è vino, vrinæ stillicidio conuenit.

Conyza. CAP. CXVI.

Vulgò puli-  
caria.

**C**onyza duo genera, quæ parua vocatur, odo-  
re præstantior est: maior verò frutice altior  
& folijs latioribus, graui odore. Viriusque folia  
oleæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis bi-  
nūm cubitorum altitudine attollitur, in minore  
pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subama-  
rus, qui in pappum abit: radices superuacua. Suf-  
ficiū substraiūq; frutex totus serpentes fugat, cu-  
lices abigit, & pidices necat. Folia conuenienter  
illununtur serpentium plagis, & tuberculis, ac vul-  
neribus. Flores & folia cum vino ad menses par-  
tusq; ejciendos bibuntur: item contra vrinæ stilli-  
cidia, arquatū morbum, & tormina: comitiales  
pota ex aceto adiuvant. Decoctum in defessio-  
bus medetur vuluæ malis. Impositus succus abora-  
tum



tum facit. Ex oleo efficaciter horribus \* obli= \* ἡ πῶα.  
nitor. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est &  
tertium conyzae genus, caule crassiore, ac molliore:  
folijs mediae inter maiorem ac minorem ampli-  
tudinis, minimè autem pinguibus: multò graui-  
oris hæc est odor & iniucudioris, sed inefficacior.  
Prouenit locis non riguis.

Hemerocallis, siue lilium syluestre.

## CAP. CXVII.

**H**emerocallis folium & caulem habet lilij,  
porraceo colore: flores in caule per singulos  
exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diu su-  
ra, quoties dehiscere cœperunt, colore perquam pal-  
lido: radix magna est atque bulbosa: quæ pota,  
aut cum melle & lana in pessa apposita, aquam  
educit & sanguinem. Folia trita mammarum in-  
flammationes à partu cōtractas, oculorūque col-  
lectiones mitigant. Radix & folia igni ambustis  
utilissimè illinuntur.

## ANNOTATIO.

Leucoion, si nominis etymon spectes, al-  
bam significat violam: solet tamen & pro lu-  
tea, cœrulea ac purpurea usurpari. Nunc of-  
ficinis Arabum ferè sequacibus, Cheiri nun-  
cupatur.

Leucoium, siue viola alba.

## CAP. CXVIII.

**L**eucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus  
differentia quadam: nanque aut cœrulei, aut



albi, aut purpurei, aut lutei inveniuntur. Lutea  
verò præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores  
feruefacti in defensionibus, valent contra vuluæ in-  
flammationes, & menstrua expellunt: sanant oris  
ulcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Se-  
men duum drachmarum pondere ex vino potum,  
aut cum melle inditum, menses, secundas & par-  
tus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem re-  
primunt, & podagricos iuuant.

Cratægonum. CAP. CXIX.

Videtur ge- **C**ratægonum, siue, vt alijs placet, cratægonon,  
nus Persi- folijs melampyro simile est, multis calamis  
cariæ, non ex una radice emicantibus, multorumque geniculis  
maculatis. lorum: semine milij: nascitur magna ex parte in  
opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum  
est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die  
post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ  
duobus mulier, ante conceptum quadraginta die-  
bus: & vir modo consimili, totidem diebus ante  
coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. CAP. CXX.

**P**hyllum, quod & eleæphyllon vocatur, duum  
generum est: quod autem thelygonum appel-  
lant, in sacosis musci modo gignitur, folio oleæ, sed  
magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili:  
florem album profert: semen papaueris manuscu-  
lum. Sed arrhenogonum cetera huic simile, so-  
lo fructu distat: habet enim racemosum quiddam  
deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon  
potu,



potu, masculi sexus facere partus, ut thelygo-  
non feminei, proditur. Horum Crateus auctor  
est: sed huiusmodi historiâ tenus, mihi produxisse  
visum est.

Testiculus. CAP. CXXI.

**T**esticulus, quem Græci cynosorchin vocant, Officinis  
folijs circa imam cav'is partem in terra falso saty-  
strais, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, de quo  
ribus, lenibus: caule dodrantali: floribus purpureis. Seq. cap.  
reus: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angu-  
sta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: in-  
feriore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices  
coctæ, ut bulbi: ex quibus si maiorem edant viri,  
mares generari dicuntur: si minorem feminae,  
alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mu-  
lieres in lacte caprino bibere, ad simulandos coi-  
tus: aridam verò, ad inhibendos: & alterum  
alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sa-  
buletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea  
auctore vocatur, quoniam radix ad multa utilis  
sit. folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus,  
ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus  
penè purpureis, radice testiculi simili: quæ illita  
tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem  
non patitur. Abolet fistulas, & illitu inflamma-  
tiones lenit. Aridæ radices nomus inhibent: sa-  
nantq; putredines, & oris ulcera cacoethe: aluum  
sistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo  
canis, produntur.



## Satyrium. CAP. CXXII.

**S**atyrium aliqui trifolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem lilij effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam intus ut ouum, candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam: quam in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendum ea dum concumbendi incescit cupiditas, siquidem ea proniores ad venerem fieri affirmant. Est & alterum satyrium erythronium siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente: quod fertur, non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si omnino manu teneatur radix, stimulat: eoque magis, si bibatur in vino.

## Horminum. CAP. CXXIII.

Vulgò Gal-  
litricum.

**H**orminum herba est, folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argemas albuginesque, & illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrahit



trahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illi & herba. Sylvestre magis viribus pollet: quare unguentis, praesertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. CAP. CXXIIII.

**H**Edysaron, quod unguentarij pelecinum, id est securidacam vocant, frutex est, folijs ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncus, quod ancipitem securim aemulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nasctur in segetibus & hordeis.

Onosma. CAP. CXXV.

**O**nosma, \* oblonga folia habet, ad similitudinem anchusae, longitudine quatuor digitorum, & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore: radice nititur longa, tenui, infirma, rubescente: gignitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahunt. Praegnans, si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

Nymphæa. CAP. CXXVI.

**N**ymphæa nascitur in paludibus & stagnis. Nunc Nymphaeae, quoniam in paludibus nascitur, folijs fabae Aegyptiae, mino nuphar. ribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente: cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput extuberat: nigro semine, denso &



lato, lenti gustus: caulis est levis, niger, minimè crassus, Aegyptiæ fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumno secatur. Sicca cum vino pota celiacis, dysentericisque auxiliatur & lienem absorbet. Radix stomachi ac vesicæ doloribus illinitur, vitilignes ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecij medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit, pota assidue aliquot diebus, genitalæque infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphaea nomen sibi vindicasse videtur, quoniã aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bœotiae Alarito. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs antèdictæ, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ similis. Huius semen & radix, contra foeminarum profluvia efficaciter ex vino bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

Androsaces. CAP. CXXVII.

**A**ndrosaces herba est amara, tenues spargens uncas, sine folijs, folliculis in capitulis habens, in quibus semen continetur: gignitur in Syria maritima. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini potio, & herbæ decocto: podagris vitiliter illinitur.

Asplenium. CAP. CXXVIII.

Ceterach  
officinæ.

**A**splenium, aliqui scolopendrium vocant, alijs splenion, alijs hemionium, folijs est multis, scol



scolopendræ animalī similibus, ab radice vna pro-  
deūtibz. Nascitur in parietibus, saxisque siliceis,  
& opacis: nec caulem, nec florem, nec semen ha-  
bet: folia \* filiculæ modo diuidūtur, subter flauæ \* Polipodū.  
scentia hirsutæque, supernè viridia. Vim hanc ha-  
bent folia in aceto feruesfacta, vt per dies quadra-  
ginta pota, lientem absument: quibus etiam con-  
tritīs lienem ex vino illū oportet. Stranguriæ, &  
regio morbo prodest, singulū sedat, calculos in  
vesica comminuit. Conceptum adimere creditur,  
per sese aut cum muli liene appensa. Tradunt no-  
tū, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

## ANNOTATIO.

Ruellio & Fuchsio lingua ceruina nunc  
appellata: quam alii, minus rectè fortassis,  
Phyllitida suspicantur, de qua suprà Ca-  
pite CII.

## Hemionitis. CAP. CXXXIX.

**H**emionitis, quam aliqui splenion vocant, s-  
lum emittit dracunculi, lunæ modo incur-  
uum: radicibus coheret multis, tenuibus: nūquam  
flores, neque semen, neque caulem gignit: in pe-  
trosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lie-  
nem absūmit.

## Anthyllis. CAP. CXXX.

**A**nthyllis duplex est: quedam enim lenti si-  
nullima, folijs mollibus, rectis ramulis, pala-  
mi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in  
alsis terris, & à sole illustratis, non in fulso gi-



\* Chamæstu. Altera est folijs ramulisque\*aiugæ similis, hirsutioribus tamen, breuioribus, & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice cichory. Pota drachmis quatuor vrine difficultati, renibusque plurimum prodest. Tritæ, vuluæ pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacte imposita, vulueribus medentur. Quæ autem aiugæ similitudinem refert, præter alia, pota cum aceto mulso comitiales sanat.

Anthemis.

CAP. CXXXI.

Officinis **A**nthemidis genera tria, tantum flore dicamomilla. **A**stantia: rami dodrantes, fruticosi, alis cuius non multis concaui: tenuibus foliolis, paruis, numero minimum variis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, rietis ab inforinsecus orbiculato ambitu candidis, melius, terprete oportet aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ: nascitur in asperis, & iuxta semitas: colligitur vere. Vim habent radices, flores & herba excafacienti, extenuandique: potu, & in fessione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque: aduersus inflammationes, & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgant: iocinerum vitia sanant: decocto earum vesica fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est: hanc propriè heranthemon vocant. Ea, cui leucanthemon nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, vehementius urinam ciunt. Aegylopijs illitæ medentur: commanducatæ ulcerum eruptiones in ore san



sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturq; in farinā, ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim trita, in pastillos digeri: radix quoq; siccari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radicis pars vna, modò contra floris partes duæ & herbæ vna, permutatim duplicato pondere, alternis diebus bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

Parthenium.

CAP. CXXXII.

**P**arthenium aliqui amaracon vocant, folijs est Vulgò *macori andri*, tenuibus: flore per ambitum albo, tricaria. intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatum, cū aceto mulso, aut sale potum, non secus atq; epithymum, & bilem & pituitā detrahit: suspiriosis prodest & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

ANNOTATIO.

Non sunt sequendi, qui Cotulam fœtidam vulgò dictam pro hoc obtrudūt. Nam præter quàm quòd folia illius nullā aut saltem paruam cum fœniculo habeant similitudinem, flos eius non totus luteus (quod in illo tamen requiritur) sed per ambitum albus, ac intus tantū luteus cōspicitur: quod haud dubiè Dioscordies, si Cotula illa ve-



rum esset Bupthalmum, minimè, vt nec in Parthenio, Narcisso, & Anthemidos, prima specie, silentio prætermisisset.

Bupthalmum. CAP. CXXXIII.

**B**upthalmum (quidam, Buphthalmum vocant) tenuis  
emittit cauliculos, mollēsque; folia feniculi: lu-  
teum florem, anthemide maiorem, oculi similitu-  
dine, vnde nomē traxit: circa oppida nascitur, &  
in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores  
duritiāsque; discutunt. Aiunt epotam post exitum à  
balneis, regio morbo correpta, colorem tractum tem-  
poris reddere.

Pæonia. CAP. CXXXIIII.

**P**æonia siue glycysside, Græcis aliquibus pen-  
thoron dicitur: sunt qui idæos dactylos ra-  
dicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesqui-  
pedis adolescit, comitantibus multis stolonibus.  
Huius duo genera: mas, folia inglandis habet:  
in fœmina verò, smyrnii more diuiduntur. Sum-

\*Amygdalo caule siliquas emittit, veluti\* græcas nuces:  
las intelli- in quibus, quum dehiscunt, multa granula rubra,  
ge. acinis puni-  
corum similia, inueniuntur, & in me-  
dio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix ma-  
ris [tenuis] digitali crassitudine, & palmi longi-  
tudine, gustu adstringens, alba: fœminæ radici-  
bus ceuglandes circiter septem aut octo inheret,  
vt in hastula regia. Fœminis à partu non purgas-  
tis sicca radix datur: ciet menses nucis græcæ ma-  
gnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino

AUG



exiliatur. Valet contra regium morbum, & re-  
um, ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluum si-  
it. Rubra grana rubentes menses sistunt, decem  
el duodecim pota in vino austero & nigro: sto-  
machicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris  
pota, initia calculorum eximit. Grana nigra auxi-  
antur suppressionibus nocturnis, vulvæ strangu-  
tionibus, & matricis doloribus, quindecim nu-  
mero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in al-  
issimis montibus & præruptis.

## Lithospermum. CAP. CXXXV.

**L**ithospermum à seminis duritia nomen acce-  
pit: folijs est oleæ longioribus, & latioribus, lium solis.  
nollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt:  
ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti-  
lunici, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus,  
cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter  
quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine,  
duritia lapidea. Nascitur in asperis & editis locis.  
Vim hanc habet, ut semine cum vino albo potu cal-  
culos frangat, pellatq; urinam.

## Phalaris. CAP. CXXXVI.

**P**halaris cauliculos emittit & culmus simi-  
les, à minutis ac nullius usus radicibus, mul-  
tos duum palmorum, geniculis cinctos, gracilio-  
res tamen ac dulces: semen candidum, oblongum,  
milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vi-  
no succus ad vesicæ cruciatus vilissimè bibitur.  
Semen cochlearis mensura potum, ad eadem ef-  
ficax



ficax est.

Rubia.

CAP. CXXXVII.

Hodie Ru- **E** Rhythrodanum\* radix rubra est, quatingu-  
bia tincto- tur lanæ. Vna sponte prouenit, altera ser-  
rum. tur,\*vt in Thebana Gallia, & Rauenna Italia  
\* ῥυθρόδανον in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur  
δανον. Hanc non sine quæstu serunt: nanque maximū  
violetον ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & qua-  
θριον καλὸν dranguli, longi, aparina non dissimiles, robustio-  
res, & multo prorsus maiores: folijs per interval-  
la certa circum articulos, stellatim decussatis. Se-  
λαίνῃ γὰρ men eius rotundum, inter initia viride, mox ru-  
γισαίας. brum, postea cū ematuruit, nigrū: radix tenuis  
longa, rubra. Urinā ciet: qua de causa regio mor-  
bo opitulatur, pota cum aqua mulsa. item ischiadi-  
cis, & resolutis. Crassam copiosāq; urinam pel-  
lit: nonnunquam & sanguinem: bibentes tamen  
quotidie lauari oportet, & excrementorum qua  
redduntur differentiam spectare. Aduersus serpen-  
tium morsus, ramulos cum folijs vino bibere pro-  
dest. Semen ex aceto potum, lienem absūmit. Imposi-  
ta radix trahit partus, menses, secundasque. Al-  
ba vitiligni, illita ex aceto medetur.

Lonchitis.

CAP. CXXXVIII.

**L** Onchitis folia habet porri, latiora, rubentia,  
plurima, ad radicem circumfracta, veluti in  
terram procumbentia, pauca in caule, in quo flo-  
res, ceu galericuli, hiantibus comicis personis si-  
miles, nigri, & è rictu albam exerentes velut lin-  
guam,



am, quæ ad labrum inferius spectet: semen in-  
 lucris clausum lanceæ simile, triangulum: unde  
 cognomentum arrogavit: radix dauci. Nasci-  
 tur in sitientibus, & asperis. Radix ex vino pota  
 inam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui  
 peram lonchitin dicunt: folia scolopendrii emit-  
 sed asperiora maioraq; ac multò magis diuisa.  
 vulneribus mirum in modum prodest, in eusq; in-  
 flammationes excitari non patitur. Pota ex ace-  
 lienem absument.

Althæa.

CAP. CXXXIX.

Vulgò Bif-

**A**lthæa, quam alij ibiscum vocant, in sylue-  
 malua, &  
 strium maluarum genere est, cui folia vt Maluani-  
 clamino, rotunda, lanugine canescunt: flore roseus.  
 ceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. \* Ab ἀλθαία  
 Althæa appellatur, quòd inter primas sit vti=vw, quod me-  
 s, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim deri signi-  
 n vino aut aqua mulsæ, & per se cum imponitur siccit.  
 usa, efficax est contra vulnera: item ad strumas,  
 parotidas, abscessus, mammarum inflammatio-  
 nes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores: si-  
 quidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicæ-  
 tricem perducit. Cocta, vt dictum est, adiecto suillo  
 adipe aut anserino, terebinthinæve, vt malagma-  
 tus lentior fiat, facit ad vuluæ inflammationes, præ-  
 clusionesque, in pectus subdita. Decoctum eodem  
 fungitur munere: onera vuluæ, reliquiasque à par-  
 tu extrahit. decoctæ \* succus ex vino potus, suc= \* & pīsæ.  
 currit vrinæ difficultati, calculosorum cruditati-  
 bus



bus, dysentericus, ischiadicus, tremulis, ruptis: dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, vitiliginem & σὺν ὄξει. in sale \* perunctis emendat: eodem cum oleo & aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluvium. In posca autem decoctum bibitur, contra omnes vesparum, apum, simuliūque aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morsibus, & igni ambustus illinuntur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

## Alcea.

CAP. CXL.

Herba Si- **A**lcea sylvestrium malvarum generi assignatur: folia habet diuisa, verbenacæ proximæ. caules tres aut quatuor, cortice cannabino vestitos, florem rosæ, paruum, radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cum vino aut aqua potæ, dysentericis ruptisque medentur.

## Cannabis.

CAP. CXLI.

**C**annabis sativa plāta magni in vita vsus ad robustissimos funes faciendos: folijs fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotundo, quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter aurium doloribus instillatur. \* Sylvestris cannabis patorium virgas fert alihææ similes, minores, nigriores, & vulgatum. asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio sativæ, nigriore & asperiore flore lychmidis, subrubro:



o: semine & radice althææ. Decocta radix, illitu  
 inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos arti  
 loram dissipat. Huius cortex torquendus funibus  
 commodatus.

## Anagyris.

## CAP. CXLII.

**A** Nagyrus \* frutex est arboris instar, per = \* οἱ ἡ ἀνὰ  
 quæm grauis odore: folijs \* agni, virgusq; flo γυγυρ. οἱ  
 brassicæ: semen in siliquis non breuib; gignit, ἡ ἀκοπορ  
 brotundum, firmum, versicolori facie, simile re = καλδοι.  
 bus, quod durescit vna maturescenle. Tenera fo \* viticis.  
 a trita tumores illitu reprimūt. si partus h. creat  
 & secunde mensesq; moerentur, drachmæ pondere  
 buntur in passo: sic & suspensio dantur, & con  
 ra capitis dolores in vino. Difficulter parientibus  
 dalligantur, ita vt à partu statim auferantur.  
 radice cortex concoquendis discutiendisque adhi  
 etur. Semen commanducatum vomitiones rebe  
 nenter ciēt.

## Cepæa.

## CAP. CXLIII.

**C** Epæa portulacæ similis est, sed nigriora ha  
 bet folia, & radicem tenuem. Foliam vino  
 ota, vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie laboranti  
 us, opitulatur: maximè id præstat, si cum deco  
 to radicis asparagi eius, quæ myacanthon, hoc \* Vulgò plā  
 st, corrudam vocant, bibatur.

tago aqua  
 tica.

## Alisma.

## CAP. CXLIIII.

**A** lisma, \* aliydamasfonion appellant: folia ei \* Vox ex  
 plantaginis, nisi angustiora essent, \* laci = Plin. adie  
 uosa, conuexaq; in terram: caule simplici, tenui, cla.

cub



cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallescente: radicibus tenuibus, ut veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma una aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt: torminibus atque dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. CAP. CXLV.

**O**nobrychis, folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem paruum: nascitur in vliginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Hypericum. CAP. CXLVI.

Nostra Perforata. **H**ypericum alij androsæmon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, subrubro, folio rutæ: flore luteo, qui digitis tritus sanguineum succum remittit, qua ex causa androsæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur locis cultis & asperis. Vrinam ciet, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisque cum vino potum



tum liberat. Semen quadraginta diebus haustum,  
ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambu-  
sta sanant.

Ascyron.

CAP. CXLVII.

**A**scyrum, siue ascyroides, hyperici genus est,  
magnitudine distans, fruticosius, maiores  
habens ramos, surculosiores, rubetesq; folia tenuia:  
flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non  
absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur,  
qua de causa androsæmum vocauere. Vsus seminis  
ad ischiadicos, potū in hydromelitis sextario: nam  
biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assi-  
duè dare oportet, donec sanitati restituantur. Illini-  
tur & ambustis efficaciter.

ANNOTATIO.

\*Vinoso succo. ] Marcellus sanguineo  
vertit, qui non vt Ruellius διυώδην, sed po-  
tius ἀμαρτώδην, vti capite de hyperico, legisse  
videtur: quæ fortè lectio magis genuina.  
Nam & Plinius libr. 27. cap. 4. Androsæmi  
comam tritam sanguineo succo manare, tra-  
didit.

Androsæmum.

CAP. CXLVIII.

**A**ndrosæmon ab hyperico, ascyroq; differt,  
quòd fruticet ramulus surculosus, ac tenui-  
bus: rubentibus virgis, & folijs ruta, triplo aut  
quadruplo maioribus, quæ trita\* vinoso succo ma-  
nant: complureis alas habet in cacumine, vtrin-  
que expansas, pinnatasq;: circa quas, flores pu-

v



filii, lutei: & in calyculis semē papaveris nigri, in  
signe lineis. Huius comatrita resinosa odorem  
reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum,  
biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maximē  
medetur sed à purgatione aquam exorbere oportet.  
Herba ambustis illita medetur, vulneribus san-  
guinem cohibet.

Coris.

CAP. CXLIX.

**C**Oris, quod aliqui hypericon vocant, frutex  
est folio erica, rubro, pinguiore, ac minore,  
non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum  
semen menses trahit, & urinas: contra phalangio-  
rum morsus, ischiadicos, & opisthotonicos: ex vino  
potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opi-  
sthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix vino  
decocta potaque, defectis operis ferre creditur: sed  
laborantem inter potandum quā optimē cooperi  
ri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua  
re pristinam agilitatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys. CAP. CL.

Vulgo Iux-  
arthritica.

**A**iuga herba in terra repens: \* incurva si-  
milis: filijs semper vini minoris, multò te-  
\* minoribus, hirsutis & pinguioribus, circum ra-  
\* i. sub- mos \* densis, odore pinus flore tenui, laeo, vel can-  
curva. dido: radice cichorii. Folia septem diebus in vino  
\* pota, regio morbo medentur: & quadraginta die-  
id est, fre- bus ex hydromelite, ischiadicos sanant: dantur  
quentibus. peculiariter urinae difficultatibus, iocineris, &  
renum viis: tornuosis prosunt. Ea apud Hera-  
clo



cleam Ponticam, perinde atque antidoto contra  
aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedi-  
cti illinitur, cum polenta iure decocti subacta: tri-  
ta in farinam & cum fico in pilulis sumpta, aluum  
emollit: excepta melle, cum æris squama & resina  
dèycit: apposita ex melle, vuluæ vitia extrahit:  
mammarum duritias discutit: vulnera glutinat: vl-  
cera quæ serpūt, cum inelle illita, cohibet. Alterum  
est genus aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ spe-  
ciem incuruatis, prætenubus, coma supradictæ: flo-  
re candido: semine nigro: hæc etiam pinum redolet.  
Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, ala-  
bus, pilosis: caule aspero, candido: luteis floscu-  
lis, semine iuxta alas. Resipit & hæc pi-  
num. Hæc duæ vim superioris ob-  
tinent, sed non vsque  
adeo efficacem.

\* \*

TERTII LIBRI  
FINIS.

2



PEDANII  
 DIOSCORIDIS  
 ANAZARBEI, DE  
 Medicinali materia,  
 Liber IIII.

Ioanne RVELLIO Sueſſionenſi  
 interprete.



Ribus autè libris, amantissime  
 Aree, tradidimus odora-  
 menta, olea, arbores, unguenta, anima-  
 lia, frumenta, olera, radices, suc-  
 cos, herbas, seminaq; . In le-  
 tem quarto differemus de radicibus, & eis, quæ re-  
 stant, herbis.

Betonica.

CAP. I.

**C**estron psychotrophon vocitatur, quoniam  
 frigidus locus inueniatur. Latini betonicam  
 appellant. Herba est, caulem ferens tenuem, cu-  
 biti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia  
 quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odora-  
 ta, prope radicem maiora: in summis caulibus,  
 semen veluti satureiæ spicatum inest. Decerpta  
 huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radi-  
 cibus nititur, vt veratri, tenuibus. Quæ ex hy-  
 dromelite in potu, pituitosam vomitionem euo-  
 cant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieri-  
 bus



bus vuluæ malo opportunus, & ad laxandos vteri  
 strangulatus, denarij pondere cum hydromeli-  
 te: tres in vini sextario drachmæ, contra serpen-  
 tium morsus ebibuntur. Herba magna vtilitate  
 illatis à serpente vulneribus illinitur: aduersus  
 etiam venena drachma ex vino pota conuenit: præ-  
 sumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit: vri-  
 nam ciet: aluum subducit: medetur comitialibus  
 & insanis, pota ex aqua: & iocineris lienisq; vi-  
 tii, drachmæ pondere in aceto mulso: concoctionem  
 adiuuat, si quis eam fabæ magnitudine secundum  
 cœnam cum melle cocto deuorarit: modo consimili  
 acida ruclantibus propinatur. Stomachicis eam  
 manducare & succum deuorare proderit, si postea  
 dilutum vinum sorbeatur. Datur sanguinem ex-  
 creantibus, tribus obolis, cum diluti vini egelidi  
 cyatho: ischiadicis, renum & vesicæ doloribus, ex  
 aqua: aquæ inter cutē binis drachmis ex hydrome-  
 lite, si febricitant: sin aliter, ex mulso: regio mor-  
 bo laborantes recreat, menses pellit, drachmæ  
 pondere cum vino pota: aluum purgant dra-  
 chmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem cya-  
 this. Facit cum melle ad tabem & purulentam  
 excreationem. Folia sicca tritaque fictili vase re-  
 conduntur.

Britanica. CAP. II.

**B**ritanica aut vetonica, folia habet sylue-  
 stris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gu-  
 stu adstringentia: radicem tenuem & breuem:



caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, privatim depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accommodatam. Valet etiã ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia. CAP. XII.

**L**Yfimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem suppressit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in peste sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturcitur: vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, seu polygonum.

CAP. XIII.

Nunc Centi  
modia.

**P**olygonum mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculu cinctos, qui per terram, ut gramen, repunt: folia ruia, sed molliora longioraq;: semine sub omnibus folijs turgescente: unde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excreationi, cholera, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio: nam vrinam aperire ciet. Cum vino potus, contra serpentium mor-

si 43



sus auxiliatur, daturq; in febris per horam ante  
significationes: feminarum profluvia impositu si-  
stet: idem succus purulentus auribus \*instillatur. \*ηγεῖ τῶν πλῆ-  
Facit eximie ad genitalium vlcera, cum vino, ad ὠτὰ λυγία. *α.*  
iecto melle, decoctus. Stomachi feruori, sanguinis  
reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sa-  
cris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vul-  
neribus folia illinuntur. Sanguinaria femina fruti-  
cat vno caule, arundini teneræ simili, densis geni-  
culis, & in se tubarum modo factis: articulos in or-  
bem cingunt apices, foliolis piceæ similes. Radicis  
nullus vsus: nascitur in riguis. Huic quoque spissan-  
di refrigerandiq; natura, ad eadem valens, sed inef-  
ficacior.

Polygonatum. CAP. V.

**P**olygonatum nascitur in montibus, frutice Vulgò sigil-  
lato cubito altiore: folijs lauri, latioribus, & leuioribus, Salomo-  
ribus, sapore mali cotonei, aut punici, cum qua-  
dam adstrictione flores per singulos foliorum exor-  
tus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à  
radice supputatione: radicem habet albam, mol-  
lem, longam, crebro geniculatam, densam, graueo-  
lentem, digitum crassitudine aequantem: quæ vul-  
neribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas  
in facie delet.

Clematis. CAP. VI.

Est quæ La-

**C**lematis humi serpit: lato, pinguiq; solo pro-  
tini Vincæ  
uenit, viticulas spargens crassitudine iunci peruincam  
exiguas: folio lauri figura & colore, multò mino-  
vocant.



Flammula  
vulgò.

ra. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluvia  
& dysenterias sedant: subdita in pecto cum lacte  
& rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vuluæ meden-  
tur. Dolores dentium commanducata finit: imposi-  
ta serpentium moribus, iuuamentum præstat. Fer-  
tur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota epi-  
tulari. Gignitur in terrenis. Est & altera clematis,  
que viticulosum emittit ramulum, rubesceniem,  
lentum: folium gustu admodum acre, ac exulce-  
rans: repit per arbores, ut smilax. Semen tritum,  
pituitam bilémque detrahit, in aqua aut hydrome-  
lite potum. Folia eius illita lepris purgant. Cum  
lepidio conditur ad cibos.

## Polemonia.

## CAP. VII.

**P**olemoniam alij philateriam, Cappadoces  
chiliodynamin appellant, ramis exilibus,  
vtrunque pinnatis: folys paulò quàm rutæ maio-  
\*Polygoni. ribus, ac longioribus, calaminthæ aut \*sanguina-  
riæ proximis, quibus in summis velut corymbi de-  
pendent, nigro semine: radice cubitali, albican-  
\*Struthio. te, \*radiculæ simili: nascitur in montosis & aspe-  
ris. Bibitur in vino radix contra serpentes & dy-  
senteriam, & ex aqua aduersus vrinæ difficulta-  
tem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto  
drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis pla-  
gæ alligatur. Tradunt, eum, qui radicem gusta-  
uerit, à scorpione non feriri: eumque, si ictus sit,  
nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa  
mitigat.

A H



## ANNOTATIO.

\*Flores lutei.] Ne moueâre sicubi fortè,  
vt nos plerisque locis, candidis floribus con-  
spexeris: solent enim pro loci varietate in  
vna eademq̃ue herba flores non rarò com-  
mutari: id quod Dioscorides etiam in Atra-  
stylide, ac multis aliis plantis fatetur.

Symphytum, siue alus.

## CAP. VIII.

**S**ymphyton petræon, id est alus, nascitur in pe-  
tris, ramis tenuibus, paruis, origano simili-  
bus: capitulis thymi: \*surgulosum totum, odo- \*Ita Plin.  
ratur, gustu dulce, saluam ciens: longa radi- Græcus  
ce, subrufa, digitali crassitudine. Decoctum in ξυλῶδες,  
aqua mulsæ & potum pulmonis vitia purgat: san- id est, ligno  
guinem reiciantibus, & renum malis, ex aqua sum.  
datur: ad dysenteriam, rubraq̃; foeminarum pro-  
fluuia, in vino decoctum: ad conuulsa verò & ru-  
pta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commandu-  
catum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vul-  
nera recentia enterocelasq̃; conglutinat, & illitu  
cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coa-  
lescent. Est & alterum symphyton, quod ali- Nunc Con-  
qui pecton vocant: id caulem emittit bicubitalem, solida ma-  
aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt son- ior.  
chi inanem, circa quem breui interuacante spa-  
tio, folia exeunt angustâ, buglossâ proxima, ob-  
longa, hirsuta: caule secundum angulos quosdam  
striato: folijs tenuibus ex alarum sinu prodeuntia



bus, in quibus\* flores lutei, & circa caulem velut  
verbasci semina emicant. Tam caulis, quam folia,  
aspera lanugine horrent, tactuque pruritus con-  
citant: radices demittuntur: foris nigrae, intus can-  
dida, viscosae: quarum est usus. Tritae & potae cruen-  
tis excreationibus, ruptisque proficiunt, recētia vul-  
nera illis & cōglutinant: carnes quoque, si cōcoquan-  
tur, cogunt additae: inflammationibus, praesertim  
sedis, cum senecionis folijs vtiliter illuminantur.

Holostium. CAP. IX.

**H**olostium herba est pusilla, tribus quatuor-  
ve digitis supereminens extra terram, folijs  
viticulisque coronopo aut gramine proximis, gu-  
stu adstringentibus: radice alba, praetenui usque, in  
capillamenti speciem, longitudine quatuor digito-  
rum: nascitur in collibus terrenis. Usus eius ad ru-  
pta, in vino potae: nam & carnes coguntur, deco-  
ctionibus addita.

Stæbe. CAP. X.

**S**tæbe vulgaris est notitia: cuius semen & fo-  
lia stringunt: quapropter decoctum dysente-  
ricis infunditur: auribus quoque purulentis instil-  
latur. Illita folia oculis ab iclu cruentis prosunt, &  
erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum. CAP. XI.

**C**lymenum caulem fert fabae, quadratum: fo-  
lia plantaginis, folliculis supra caulem in sese  
inflexis, ut in iride, & polyporum cirrhus. Proba-  
tissimum est è montibus. E frutice toto cum ra-  
dice



dicte succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: coliacos, rubraque foeminarum profluvia, refrigerando infrenat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut filiquae recentibus vulneribus impositae, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymenum. CAP. XII. Vulgò Cas

**P**ericlymen: simplex fruticat, ex intervallis prifolium, & parua folia habens, ipsum amplectentia, sub= Matrisyl= candida, hederacea: inter folia furculi exeunt, in uas. quibus baccae, hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nasceitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculus, propter asidentibus. Semen eius postquam ematurrit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in vino, quadragenis diebus, lienem absorbit, lassitudinem discutit: sed urinam ciet, statim à sexto die cruentam. Orthopnoeæ, & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur: perunctis ex oleo, februum algores abigunt.

Tribulus. CAP. XIII.

**T**ribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus, viticulus in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris: iuxta annes & rudera nascitur. Est & alterum genus



genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori. Ad sunt ei & capillamenta quædam spica: cea: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; refrigerantis & inspissantis est natura: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Vlcera in ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillasq; persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitave, ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos sanguinant, & è dulci semine & esculento panem, quo rescuntur, faciunt.

Limonium. CAP. XIII.

**L**imonium, folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio equalem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis cæliacisq; prodest: rubra feminarum profluvia sistit. Nascitur in praiis & palustribus.

Lagopus. CAP. XV.

**L**agopus herba sistit aluum in vino pota: aut in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

Med



## Medium.

## CAP. XVI.

**M**Edion in saxis & opacis nascitur. folia habet \*iridis: caulem tricubitalem, & in eo \*Alj serio florem grandem, purpureum, rotundum: semine dracnici, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum, menstrua pellit.

## Epimedium.

## CAP. XVII.

**E**Pimedium, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atque duodenis, neq; florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra. graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increescere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinus drachmu, post menstruas purgationes, quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

## Gladiolus.

## CAP. XVIII.

**X**Yphion, alij phasganon, alij machæronion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna pusillorum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, superna



perna vberior: nascitur in aruis. Superior cū thure illita, admiſto vino, ſpicula & aculeos è corpore extrahit: panos cum lolij farina & hydromelite diſcutit: quæ de re huiusmodi emplaſtris inferi ſolet. Menſes impoſita trahit. Superiorem radice ex vino pota, venterem ſtimulari, & inferiore ſumpta ſterileſcere tradunt. Superiorem quoq; vtiliter inſantiū enterocelis, cū aqua potui dare præcipiunt.

Sparganium. CAP. XIX.

**S**parganion, aliqui xiphidion vocant: folia habet gladioli, ſed arctiora, & in terram magis procumbentia: in ſummo caule veluti pilulæ prominent, in quibus ſemen. Contra ſerpentis venena, radix cum vino datur.

Xyris. CAP. XX.

**X**yrus, folia habet iridis, latiora, & in caſumine mucronata: quorum medio caulis erumpit, ſatis craſſus, cubitalis, ex quo ſiliquæ triangulares dependent: in quibus purpureus flos, in medio puniceus: ſemen in folliculis: ſimile fabis, rotundum, rubrū, acre: radix longa, geniculata, ruſa. Contra capitis vulnera, fractaq; eff. cax eſt: aculeos & ſpicula omnia citra moleſtiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radice centaury ac mellis quinta: tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex paſſo bibitur, ad conuulſa, rupta, coxendicū dolores ſtrangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potiū, vrinā vehementius impellit: & cum aceto, lienē abſumit.

ANC



## Anchusa. CAP. XXI.

**A**nchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleia appellatur, folia habet lactucæ in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoque versus humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ ætate provenit, ac manus inscit sanguineo colore: læto sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera ulcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta medetur: lepris & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vulva indita. Eius decoctum renum vitij leni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Siccant alium folia in vino pota. Radice pigmetarij vtuntur ad vnguentorum spissamenta. Est & altera, quæ aliqui alcibiadion, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum vergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ messibus sanguineum succum fundunt: in subulosis nasciuntur. Vis ei folijsque inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maximè viperarum, auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alio ligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen madidatum, si in serpentis fauces inspuatur, eum interficit. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & misturtio pota, latas ventris tineas excutit.

Lyc



## Lycopsis. CAP. XXII.

**L**ycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactucæ, longioribus, asperioribus, latoribusq; crassis, ad radicis caput recedentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutus adnatis multis, cubitalibus: flore in ijs paruo purpurascens: radix cerubra, & adstringens: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

## Echium. CAP. XXIII.

Vulgò lin- **E**chion, folia habet prælonga, aspera, aliquan-  
gua hirci- tum tenuia, anchusæ proxima, minora ta-  
na. men, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; utroq; latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo caule breuiora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modò à serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri nō patitur. Folia & semē idē præstāt munus. Lumborum dolores sedat, in vino aut sorbitione sumpta, & lac extrahit.

## Ocimastrum. CAP. XXIII.

**O**cimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos didrantes, hirsutos: \* Melathij. siliquis hyoscyamo similes, semine, ut \* gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum, qua viperarum cæterarumq; serpentium mor-  
sib



sibus medeatur. Datur ischiadici cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & speruacua.

Erinus.

CAP. XXV.

**E**rinus nascitur apud fontes & fluuios, filius ocymi, sed minoribus, parte superna diuisis, dodrantalibus surculis quinis senisve, flore candido: semine nigro, paruo & acerbo: folia & caules \* lacteo succo turgent. Semen drachmis duas \* Sic Plin. bus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculorum In Græco fluxiones colubet. Succus cum sulphure & nitro simpliciter, instillatus, aurium dolores sedat.

Succo.

Gramen.

CAP. XXVI.

**G**ramen gemculatu serpit ramulis, à quibus gradices spargit dulces, articulis præinctis: folia acuminata, dura, & vt arundinis parue, lata, in exilitatem fastigiantur, eaque iumenta & boues pascunt. Trita radix illi vulnere conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrine difficultatibus: calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone, id, quod iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inuiti: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhæ dimidio deco-



quatur, adiciaturque piperis & thuris tertiae portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum: id in area pyxide reconditur. Decoctum radicis idem, quod herba, praestat. Semen vehementius urinam impellit, alium vomitionesque sistit. Natus in Cilicia gramen, quod incolae cinnam appellant, boves inflammat, si eo virenti saepe pascantur.

Sideritis.

CAP. XXVII.

Nunc herba Iudaica, **S**ideritis aliqui heracleam vocant: folia habet marrubij, sed longiora, saepe ad fiondem quereus aut saluae accedentia, minora tamen, & aspera: caules edit quadratos, dodrantem altos, ac quandoque etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantumque substringens: in quibus per interstitia orbiculatae vertebrae, ut in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum: nascitur in petrosiss. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt. Altera sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numerofo, virique per oras diuiso: pediculo longo, prodeuntibus e summo alarum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quam betae rotundius aliquando, ac durius. Huius vis, foliorumque, ad vulnera, praecipua est. Sideritis aliam esse tradunt, quam Crataeas heracleam vocat, in macris, & vineis nascentem, folijs ab una radice multis, coriandro similibus, circa cauliculos dodrantales, teneros, leues, subcandidos atque subrubicundos: flore



flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea vis est, vt quauis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

## Achillea. CAP. XXVIII.

**A**chillea, quibusdam Achillea sideritis, draconales aut maiores gerit scapos, fusurum effigie, minutulus folijs circumdatos, ex obliquo crebras habentibus incisuras, sectionibus coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore inulto, non insuauis, verum medicato: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis [purpureis] & aurum emulantibus: prouenit laeto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta vulua profluua, in vellere. Decocto quoque insident facmina fluxione vulua laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

## Rubus. CAP. XXIX.

**R**ubus, notitia vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & facminarum profluua, praeteris morsui accommodatissimum. Gingiuis firmant, & oris vitis folia comamanducata medentur, cohibentq; illita, vlcera quae serpunt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt, & condylomatibus, & haemorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imprimuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturque



succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascens, quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur alius præmaturi cibo, necnon flore in vino poto.

Rubus Idæus. CAP. XXX.

**I**dæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Caterùm flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. CAP. XXXI.

**H**elxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulus exilibus, quibus complectitur quodcunque contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorum succus potu deicit aluum.

Elatine. CAP. XXXII.

**E**latine folia habet helxina, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulus, quibus senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum poleia tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

Eup



## Eupatorium. CAP. XXXIII.

**E**upatorium, fruticosa herba est, vnicum esse Est Offici-  
rens caulem, lignosum, nigricatem, rectum, narū Agri=  
tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum amplio- monia: ea=  
rem: folijs per intervalla quinquefolij, aut canna- rum autem  
bus potius similibus, quinquepartitō aut amplius Eupatoriū  
diuisis, nigricantibus, & ipsis per ambitum ferra- fortē Can-  
tis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum nabis sylue  
spectans, quod siccatum vestibus inhaeret. Contri- stris, de qua  
ta huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlce- precedenti  
ribus, quae agrē cicatricem trahunt, medentur. libro.

Herba & semen in vino potum, dysenteria, ioci-  
neris vitijs, & serpentium ictibus, liberat. Nec  
desunt qui aberrantes \* argemonen hanc appella \* Gracus  
rint, cum tamen longē alia sit, uti exposuimus. Artemisiā

## Quinquefolium. CAP. XXXIII. habet: sed

**Q**uinquefolium ramulos fert sed lucarum si- esse, ut nūc  
militudine, tenues, dodrantes, in quibus vides, arge  
semen: folia menhae, quina singulis monen le=  
pediculis, rarō plura, in ambitu serrata: florem ex gendum, ex  
candido pallescentem, auri amulum. Nascitur in anemone  
riguis, & aquarijs ductilibus. Subrubram habet (de qua li-  
radicem, oblongam, veratro nigro crassiore. bro q.) non  
Plurimis pollet remedijs. Ius radice decocta ad obscure co-  
fertius, si in ore contineatur, dentium dolores se- gnoscas.

dat: putrida oris ulcera, collutione sistit: arteria  
scabritas, gargarizatu lenigat: contra alui pro-  
fluvia, & dysenterias auxiliatur: item articu-  
lorum coxædicūque cruciatibus potum. Cocta in



aceto, & illita, serpentia ulcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit: ignes sacros, reduntias, condylomata, psorasque sanat. Tenera radicum succus, contra iocineris, pulmonumque vitia prodest: ite aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana vero, ternum: in quotidiana, unius. Ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus prosunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus quam fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium praestant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

## ANNOTATIO.

\* Spicam lolio similem. ] Non obscure hinc elicitur Lolium spica esse insignitum. ac proinde explodendam eorum sententiam, qui Nigellam vulgo cognominatam, cuius in segetibus vbique tam vber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidem non spicam, sed purpureum florem emittit.

Phoenix. CAP. XXXV.

**P**henix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, \* spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octo-



nasce spicas. In aruis tectisque recenter illius nascitur. Harum virium compos, ut in vino auster, pota, alui profluvium, & emanantem vulua sanguinem sistat, vrina impetus infranet. Sunt quæ ad alligatam in puniceo vellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

Idæa radix. CAP. XXXVI.

**I**Dæa radici folia sunt ea, quæ rusco: circum ea veluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus ad strictionem opus est. Pota, citam aluum, mensæque, & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radix. CAP. XXXVII.

**G**ignitur Rhodia radix in Macedonia, costis similis, leuior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.

Equisetum. CAP. XXXVIII.

**E**quisetum in riguis & scrobibus nascitur: Vulgò Caudiculi prodeunt inanes, geniculati, in se da equina. farcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncta circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, vicinis arborum caudices scandens, obuolutumque dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda: radix lignosa, dura. Vn herba spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericus in vino potus: vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tri-



tis folijs, & illiis. Radix cum sua herba tussim, orthopneam, ruptaque adiuuat. Folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, enterocelæq; in unum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equisetum caulis est rectus, equalis, cubito maior, inanis comis per intervalla brevioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneribus remedio est, eadēque fungitur facultate.

Coccum infectorium. CAP. XXXIX.

Coccum, quo infectores utuntur, frutex est surculosus, parvus, cui grana ceu lentes adherent, quæ electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia: ultimum ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: vulneribus, nervisque præcis, cōvenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium. CAP. XL.

Tragium nascitur in Creta tantum insula, lentisco semine, folio, & ramis simile, singu-

\* Ita Plin. lis tamen minoribus, \* succus ei lacteus, gummi Græcus non dissimilis. Semen, folia, lacrymæque, illius spidex simplicula è corpore eiciunt: omnia quoque corpori imciter, succu pacta, euocant: pota stranguri medentur, calculos.

vesicæ frangunt, menses trahunt. Modus in sumptione est, drachma una. Fama est, sylvestres capris sagittis confossus, eius herba pabulo spicula excu-



excutere. Est & alterum tragium, quod tragosceros aliqui vocant, folia scolopendry habet, & radicem sylueſtris raphani, tenuem, candidam: quam crudam vel coctam eſſe dyſentericus prodeſt. Folia autumno, hirci virus olent: exinde ſibi Nominis tragi nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & cauſa precipitys.

Tragum. CAP. XLII.

**E**ſt etiam herba tragos, quam aliqui ſcorpion aut traganon vocant: maximè in maritimis naſcens. palmum alta, aut amplior, frutiſoſa, humilis, oblonga, ſine folijs, puſillis circa ramos acinus, ruſis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, guſtu multum adſtringente. Racemorum acini decem ex vino poti, caliacis, & ſceminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisq; & in paſtillos digeſti aſſeruantur, quibus vtuntur cum opus eſt.

Iuncus. CAP. XLIII.

**I**unci duo genera: vnum leuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem ſaſtigiatur. Cuius etiam duo aſſignantur genera: vnum ſterile, reliquum fert ſemen nigrum, rotundum, & craſſiore conſtat calamo, carnoſioreq; Tertius eſt iuncus, qui vocatur oſſochænos, prioribus carnoſior, aſperiorq; is ſimilem ſupradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriuſque toſtum, ex diluto vino potum, ſiſtit aluum, & rubra ſceminarum profluua: vrinam cit, capitisque dolores facit.



Qua proxima sunt radici folia tenera, cōuenienter illuminantur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus illicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen. CAP. XLIII.

**Officinæ Hepatica.** **L**ichen, qui saxi est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adheret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & lingua defluxiones inhibet.

Paronychia. CAP. XLIII.

**P**aronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome. CAP. XLV.

**C**hrysocome palmi altitudine fruticat: coma specie corymborū, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum æquant: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosi opacūq; nascitur. Radix excalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet: contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum. CAP. XLVI.

**C**hrysogonum dense fruticat, querni folijs: flore coronarij verbasci: radix ut rapum exuberat, intus raberrima, foris nigra. Quæ tri-



cum aceto, atque imposita, muris aranei morfi  
his auxiliatur.

Elichrysum.

CAP. XLVII.

Ally Helio

**E**lichryson quidam chrysanthemon, nonnulli chryson.  
& id amaranton vocant, quo deorum simul Officinis  
lacra coronant: ramulum habet candidum, virens Stachas  
tem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatys citrina,  
angusta, abrotano similia: comam aurea lucis in  
orbem, umbella rotunda veluti siccis corymbis de-  
pendentibus, radice tenui: nascitur in asperis, &  
torrentium alueis. Contra serpentium ictus, co-  
xædicum dolores, vrinæ stillicidia, rupta q; coma de  
vino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinem con-  
cretum ventris ac vesicæ absomit, pota cum mul-  
so: ieiunus, trium obolorum pondere, sistit destilla-  
tiones, data in vino albo diluto: restibus inseritur,  
ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum.

CAP. XLVIII.

**C**hrysanthemon aut caltha, nonnullus bu-  
phthalmos; herba est tenera, fruticosa, laues  
proferens caules, & multifida folia: flores supra mo-  
dum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, unde  
buphthalmi nomen traxit: propter oppida na-  
scitur. Cuius caules oleris vice manduntur. Flores  
cum cerato triti, steatomata discutere produntur:  
regio morbo correptis, colorem breui reddunt, si se-  
quente longo balnei vsu, post exitum ebibantur.

Ageratum.

CAP. XLIX.

**A**geraton fruticosa herba est, palmari longi-  
tudine



itudine assurgens, simplex, humilis, origano maxime similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti seruēs: huius vsta nidor urinam cit, & vuluæ duritias emollit.

## Verbenaca.

## CAP. L.

**P**eristerion, siue verbenaca nascitur in aquis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columba circa hanc perquam libenter versari soleant. Dodrantis altitudine, & interdum amplius adolescit. folia è caule prodeunt incisa, & subalbida: ea singulari ramo, radicēque sola, constare saepius inueniuntur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosaceo imposita, vuluarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant: veteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

## Sacra herba.

## CAP. LI.

**S**acra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia quercus, sed minora angustioraq; eisdem diuisurus in ambitu, colore aliquatenus caesio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitæ, aduersus serpentes pollent: eadem drachmæ pondere cum iheris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur: veteres tumores & inflam



Inflammationes mitigant sordida vlcera purgant.  
 ta in vino decocta, consillarum crustas abrum-  
 oris nomas gargarizatu cohibet. Aut, si aqua  
 irgatur triclunum, qua maduerit, latiores con-  
 ctus fieri. Datur potandum in tertianis febris  
 is, tertium à terra geniculum, cum folijs circun-  
 antibus, quartanis, quartum. Sacram vocant her-  
 im, quoniam multum ad amuleta, expiationesq;  
 mmendetur.

## Astragalus.

## CAP. LII.

**A**stragalus, paruus à terra frutex, folijs &  
 ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo:  
 idice rotunda, rhaphani modo grandi, quæ adna-  
 is appendices firmas habet, nigras, præduras,  
 eluti cornua inter se implicatas, gustu adstrin-  
 gentes. nascitur in vêtosis, opacis, & in nivalibus.  
 o Memphis Arcadiæ scatet. Alium sistit radix in  
 vino pota: vrinam mouet: vetustis vlceribus, sicca  
 efficaciter inspargitur: sanguinem suppressit: æ-  
 rè propter duritiâ tunditur.

## Hyacinthus.

## CAP. LIII.

**H**YACINTHUS folia habet bulbi: dodrantalem  
 caulem, læuē, minimo digito tenuiorē, her-  
 acei coloris: comam procumbentem, florum pur-  
 pureorum plenam, incuruam: radicē quoque bul-  
 aceam. Quæ, ut creditur, pueris cum vino albo  
 illita, pubertatem coërcet, & non patitur erum-  
 pere: sistit alium pota, & vrinam impellit, pha-  
 langiorumq; morsibus auxiliatur. Semen adstrin-  
 gentius



gentius est, theriacis expetitur: regium morbum  
emendat cum vino potum.

Papauer erraticum. CAP. LIII.

**P**apauer erraticum, quod rhœada vocant, ve-  
re quidem in aruis cum hordeo nascitur, flo-  
re protinus deciduo, unde & nomen apud Gra-

\* Locū de- cos accepit. \* Folia erucæ, aut origani, aut cicho-  
prauati es- rio, aut thymo similia spectantur: sed longiora,  
se manife- diuisa, scabra: iuncus ei caulis, reclus, cubitalis,  
stè apparet. asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum  
Sunt enim albus: oblongum caput, sed quàm anemones mi-  
herbæ quas nus: semen rufum: radix longa, subalbida, mino-  
hic comme ris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita  
morat Dio- quinque aut sex, in vini cyathis tribus ad dimi-  
scorides, di- dias decocta, potui dabis, quibus somnus accera-  
uerfa planè sendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua  
facie, ut uni mulsa pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præ-  
eidemq; re- standum mellitis placentulus, & dulciarijs libis  
Elè compa- admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflamma-  
rari nequa tiones sanant: eorundem fotus & persusione somnus  
quanti pos- allicitur.

sint: quo- Papauer satium. CAP. LV.

modo autē **E**Satini papaueris genere, quod hortense est,  
instauran- semen in panem densatur, qui sanis in usu  
dus, peritio sit: eo etiam ex melle pro sesama utuntur: thylaci-  
ribus cogi- tum vocant. Capitulum habet longum, & semen can-  
tandum re- didum. Sylvestre verò, caput insidens demissumq;  
linquimus. & nigrum semen, quod pithitis nominatur: non-  
nullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius  
scā



capo lacteus succus emanat. Tertium magis syl-  
 vestre, & ad medicinas valentius, multò hu lon-  
 gius, productiore capitulo. Omnium in commu-  
 ne natura refrigeratrix: quare si capita ipsa &  
 filia decoquantur in aqua, somnum fotu concilia-  
 bunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Caly-  
 ses cum polenta triti, & cataplasmati admisti,  
 ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. Tur-  
 untur quoque virides, & digeruntur in pastillos,  
 qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque  
 per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; ad-  
 iecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lento-  
 rem. Id medicamentum in tussi, arteria fluxioni-  
 bus, & coliacorum affectu, doloris leuamentum  
 præbet. Efficacius tamen redditur, addito hypo-  
 cistidis succo & acacia. Papaueris nigri semen  
 tritum cum vino bibitur, contra citam aluum, &  
 foeminarum profusua: in perurgilijs fronti tem-  
 poribusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis  
 refrigerat, inspissat, siccaturq;: sumptum erui ma-  
 gnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum  
 allicit: tussi, atque coliacorum valetudini auxilia-  
 tur: verum si copiosius hauriatur, nocet, cum le-  
 thargicos efficiens interimat. Ad dolores capi-  
 tis cum rosaceo perfusum efficax est: aurium do-  
 lori, cum amygdalino, myrrha, & croco instil-  
 latur: inflammationibus oculorum cum torrefa-  
 cto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,  
 cum aceto: podagricis, cum lacte mulieris & cro-  
 co:



co: somnū accersit, subditū sedi pro balano. Opti-  
 Opiū quod mūm habetur graue, & densum, gustu amarum,  
 opimum. odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, le-  
 ue, cauidum, neque asperum, neque grumosum,  
 quod inter colandum non ut cera coëat, & in so-  
 le diffundatur: dein admotum lucernis, non atra  
 luceat flamma: extinctū deniq; odoris vim conser-  
 uet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris la-  
 Eius adul- et lucæ succo, adulterant. Verū glaucio fucatum,  
 teratio. in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo suc-  
 co fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur:  
 gummi vitiatum, splendet, & infirmum est.  
 Nec desunt, qui eò dementia deueniant, ut adi-  
 pem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad ocu-  
 lorum medicamenta, dum mollius, atque rufius  
 appareat. Diagoras, ut Erasistratus author est,  
 vsum eius damnavit, oculorum lippitudinibus &  
 aurium vitis infundi vetans, quoniam visus  
 aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit  
 Andreas, illitos eo protinus excacari, si non adu-  
 leretur. Mnesidemus vsum duntaxat olfactan-  
 di probauit, quoniam ad conciliandum somnum  
 conueniret, alioqui nobis ut noxio interdicat. Quæ  
 commentitia esse, experimentoprehenduntur:  
 siquidem effectus, virium huiusce medicamen-  
 ti fidem faciunt. quare non alienum fuerit scri-  
 ptis mandare, quoniam modo is excipiat suc-  
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & præ-  
 lo exprimunt, terentesque in mortario, digerunt

in



in pastillos: id meconium vocatur, multum opio-  
gnatius. Porro opij faciendi ratio hac est: Cum Opij colli-  
ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne gendratio.  
venitus adigatur, ex obliquo in rectum summam  
cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem,  
digito in concham abstergere: nec multo post re-  
dire, ut concreta inueniatur: etenim quatum, aut  
postero die etiam offenditur, in vetere pila teri  
debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur,  
retrocedendum est, ne vestibus succus dera-  
datur.

Corniculatum papauer. CAP. LVI.

**P**apauer ceratites, id est, corniculatum, folia Vulgò pa-  
habe. candida, hirsuta. v. r. basco similia, in am papuer cor-  
bitu syluestris papaueris more serrata: caule non inuatum.  
dissimili: flore pallido: calyculo fetuigraci, in corni-  
culorum modum inflexo, unde nomen mutuatur: se-  
mine papaueris, pusillo, nigroq: radice per sum-  
ma caespitum nigra, crassa. nascitur in mariti-  
mis & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua de-  
cocta ad dimidiis, coxendi cum & iocineris affe-  
ctus, potus sanet: prodest his, qui crassa quadam,  
aspera, aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum le-  
uiter purgat semen, acetabulo in aqua misa potio.  
Cruetas emarginat, illuta ex oleo folia floresq: &  
argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abs-  
tergunt. Sunt qui glaucium, hoc papaueris gen. re-  
facilitari existimarunt, falsi quadam foliorum co-  
gnatione.



## Spumeum papauer. CAP. LVII.

**A**liud papaveru genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule do  
 \* Struthio. drantali: folijs admodum parvis, \* radicle simili-  
 bus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba est,

\* Sic ex & spumea tota: \* radice in summo caespite. Legitur  
 Theophras- æstate semen, cum integrè adoleuit, deciditq; exic-  
 scit. Videtur catum. Datum acetabuli mensura in aqua malsa,  
 enim locus vomitione expurgat priuatim huiusmodi purgatio,  
 in Græco comitialibus prodest.

Dioscoridis

## Hypecoum.

CAP. LVIII.

codice cor-  
 ruptus.

**H**ypecoon, aliqui hypophœon vocant: nascitur  
 in segetibus aruisq; folijs ruta, exilibus ra-  
 mis. Natura eadem, quæ papaveris succo.

Apollinaris, siue hyoscyamus.

CAP. LIX.

Nunc Inf-  
 quamus.

**H**ioscyamus, frutex est caules emittens cras-  
 sos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta:  
 flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquam pa-  
 nicorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut pa-  
 paueris. Tres eius differentiæ: Una semine nigro, flo-  
 ribus penè purpureis, smilacis folijs, cytini prædu-  
 ris, & spinosis. Alterius semen sublauium, ut irio-  
 nis: flores lutei: folia, & siliquæ simplices. Am-  
 bo insaniam gignunt & soporem, ideo in commu-  
 ni usu damnantur. Tertium genus, ut quod milis-  
 simum esset, medici receperunt: pingue, lanuginos-  
 sum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis  
 rudcribusq; nascens. Cuius occasio si non adsit,

ru



rusum vsurpari oportet: niger, vt deterrimus, im-  
probat. Recenti semine, caulibus folijsq; tussis, suc-  
cus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus  
ad annum vsque prorogatur: nam facile corruptio-  
nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine sepa-  
ratim in aqua calida tuso, & expresso. Liquamen-  
tum autem succo lacteo præstantius est, & magis  
dolores finit. Contusa herba recens, addita trime-  
stri farina, digeritur in pastillos, & reconditur.  
Liquamentum primum, & quod à sicco semine  
exemptum est, collyrijs, quæ doloris sensum aufe-  
runt, commodissimè inferi solent: contra acutas ca-  
lidasq; fluxiones, dolores aurium, atque vuluæ ma-  
la, prosunt: cum farina autem aut polenta, oculo-  
rum, pedum, cæterarumq; partium inflammatio-  
nes placant. Semen eadem præbet: tussi, destilla-  
tionibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax:  
contra mensium abundantiam, & rumpentem  
aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaueris se-  
mine, & aqua mulsæ, bibitur: podagra subuenit: le-  
stibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tri-  
tum ex vino illinitur. Alijs quoque cataplasmatu,  
quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet.  
Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus,  
per sese, & ex polenta, utilissimè impimentur: re-  
centia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinun-  
tur: cum vino terna, quaternæve pota, sanant al-  
gidæ febres, quas epialos vocant. Cocta olerum  
modo folia, si acetabuli mensura manduntur, me-



diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt, si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium. CAP. LX.

**P**syllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa fieni modo, in totum herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacio mine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicuni simili: unde & nomen. in aruis & incultis nascitur. Vse ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articularum morbus, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum. CAP. LXI.

**H**ortense solanum, frutex cibus idoneus, pusillus, multis concavis alis: folio nigro, maiore quam ocymi, & latiore: fructu rotundo, viridi,



di, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit: herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polemiæ illinuntur: ægylopia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æstuant stomacho auxiliantur: parotidis, cum sale detrita, illitu discutunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera, quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad ægylopias cum pane: infaniam a lustrationi, quam syriasim vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum corticis limbo simo subactus, & luteo appositus, ægylopijs presentaneo est remedio. Est & aliud solum, Arabum quod peculiari nomine halicacabon aut phrysalis exemplo. da, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant: folijs culis orbiculatis vesiculis similibus: semine intus fuluo, rotundo, laui, acinorum vix effigie: quo coronarij vtiuntur, corollis inorquentes. Vini vsumq; hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine poto, & urinam pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra, reconditur, ad eadem valens.

Officinis

Alkekengi

Arabum

phrysalis exemplo.



## Solanum somniferum. CAP. LXII.

**S**olanum somniferum, aliqui etiam halitaca-  
 bon appellant, fruticat multis ramis, densis,  
 caudicosis, fructu contumacibus, pinguium folio-  
 rum, cotoneæq; mali similitum plenis: flore grandi,  
 rubro: fructu in folliculis crocatis: radice gradi, sub-  
 rubra cortice vestita: nascitur in saxis, non pro-  
 cul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ ponde-  
 re potus, somnificam vim habet, opio mitiorem.  
 Semen vehementer urinam cit. Corymbi duode-  
 cim, hydropicis dantur: si quid numero adiciatur,  
 alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua co-  
 piose mulsæ, potui data. Succus pastillis inseritur,  
 & medicamentis, quæ doloris leuamentum præ-  
 bent: decoctus in vino, si in ore contineatur, den-  
 tium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum  
 melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

## Manicum solanum. CAP. LXIII.

**S**olanum manicon, aliqui perison, alij thryon  
 appellant. Huic folium erucæ simile, manus  
 aliquando, suis acantho, quem paderota vocant,  
 accedens: caules à radice proceros emittit decem  
 aut duodecim, vna altitudine adolentes: caput  
 in cacumine, oliuæ figura, sed ut platani pilule  
 hirsutus, verum manus, latiusq;: florem nigrum:  
 postquam eo exiit, racemus exit rotundus, ni-  
 ger, denis aut duodenis acinus constans, similibus  
 hederæ corymbis, ut vna mollibus: radice firma-  
 tur candida, crassa, cana, cubitali: gignitur in  
 mont



montibus, vento perflatus, & platanetis. Radix drachma unius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non inuicundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad treis vsque dies mentis alienationem affert: quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & vomitione reiecta.

## Dorycnium. CAP. LXIII.

**D**Orycnion Crataeas halicacabon, aut calearum vocat: frutex oleae nuper prodeuntis similis: nascitur in petris, non procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs oleae similibus colore, minusculis, firmiter, prater modum scabris: flore candido: siliquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinque intus aut senis seminibus, exigui erant magnitudine, laeuis, firmis, versicoloribus: radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec desuere, qui dicerent, semen in amatoria expeti.

## Mandragoras. CAP. LXV.

**M**andragoram, aliqui antimalum, alij circaeam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quae foemina existimatur, thridacis appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quam lactuca, virosus ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit forbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inhaeret bene ma-



gnis, binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris for-  
 ris, intus albis, crasso cortice vestitus, caule vi-  
 duus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnul-  
 \* Alj mo- lis \* norion vocitatus: huius folia magna, alba, læ-  
 rion. ta, leuia vt betæ: mala quàm alterius duplo maio-  
 ra, colore in crocum inclinante, iucunde cum gra-  
 uitate quadam olemia: quorum pomorum cibo, ali-  
 quantum opiliones soporantur. radix, alterius si-  
 milis, maior & candidior, orbata & hæc caule.  
 Succus fit è cortice recentis radice tuso, & præli-  
 subiecto: qui insolatus ubi concreuerit, fictili re-  
 conditur. Malus quoque succus depromitur, sed ali-  
 quantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus  
 lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices  
 in vino ad tertias coquunt, & defecatum ius ser-  
 uant: cyathosq; vno vtuntur, in peruiigijs, & do-  
 loribus, & ante sectiones vstionesq; ne sentian-  
 tur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt vera-  
 trum, per vomitiones bilem atram pituitamque  
 extrahit: verum potu largiore, vita admittitur.  
 medicamentis ocularibus, & his, quæ dolores fi-  
 niunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur: se-  
 mioboli pondere inditus, per se menses & partus  
 expellit: subditus sedi pro balano, somnificus est.  
 Radix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum  
 eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere  
 optaueris, formam, ipsum facile præstat. Folia re-  
 centia conuenienter oculorum inflammationibus,  
 & collectionibus, quas vlceru citarunt, cum po-  
 lent



lenta illuminantur: duritias omnes, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delent, si quinis senisve diebus, sensim perficiuntur. Folia servantur in muris, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ietibus ex melle aut oleo, medetur: strumas atque tubercula, cum aqua dissipat. articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum è cortice radicis, ad hunc modum: Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi ŷs, qui secari aut amburi debent, vt antè dictum est: si quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterino quodam pressu, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus: nimio tamen odore percussu, obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat: appositumque cum sulphure ignem nō experto, rubra foeminarum profluvia sistit. Scarificata punctusq; multifariam aperta radice, erūpens lacryma, cauo vase recipitur. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est: sed non vbiq; vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacus iuxta specus enatum: folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniore,



drachmæ pondere deuoratam, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtiuntur, cum scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum manico solano potam.

ACONITUM. CAP. LXVI.

**A**conitum, aliqui pardalianches, alij cammaron, alij thelyphonon, alij myoclonon, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut  
 \* Ita Plin. cucumeris, tria aut quatuor, minora & \* sublit=  
 Græcus suta: caulem palmo altum: radix scorpij caudã  
 μοργα æmulatur, & alabaſtri modo splendet. Torpescunt,  
 χῆα, id est, vt fama est, scorpiones admota radice, stupentq;:  
 subaspera. qui rursus hellebori contactu excitantur. Ocu=  
 vira autẽ lorum medicamentis leuandi doloris gratia adycci  
 lectio po= tur. Enecat pantheras, sues, lupos & feras o=  
 tior, herba, mneis in carnibus obiectum. Est & alterum aco=  
 si quãdo se= nitum, quod aliqui cynoclonon, alij lycoclonon ap=  
 se obtulerit pellant. Huius genera sunt tria: vnum, quo vtuntur  
 aspectus in tur venatores: alia duo in vsum suum vertere me=  
 dicabit. dici, è quibus tertium, quod Pöticum nominatur,  
 plurimum in Italia, montibus Iustinus exilit: à  
 priore distans, quoniam folia faciat effigie plata=  
 ni, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora:  
 caulem filicis pediculo similem, nudum, cubita=  
 li altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis ob=  
 longis recondit: radices in modum squille marinae  
 cirrorum nigrescunt. Quibus ad venationem lu=  
 por



orum vitur: inserta siquidem crudi carnibus,  
& deuorata, lupos enecant.

## Cicuta. CAP. LXVII.

**C**icuta caulem edit geniculatum, vt feniculus. \* Plinius  
li, grandem, \* folia ferulae, angustiora, gra- lib. 25. cap.  
u odoratu: rami, mox umbellae in summo pro- 13. Corian  
leunt: flores quoque albicantes: & semen aniso dro assimi-  
andidius: radice non alta, concaua. Cicuta ele- lauit, cui  
hale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. propius sa-  
Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimi- ne, quam  
tur contusis cacuminibus, priusquam semina & ferula, quae  
coma siccescant: qui sole densatur in pastillos. feniculi co-  
Multus ad medendi rationem vsus est aridi: como- stat folijs.  
le miscetur collyrijs, quae leuandi doloris gratia Cicuta o-  
temperantur: ignes sacros, & viscera quae serpunt, mnibus ho-  
illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testi- die coperta,  
bus circumlita, libidinum imaginationes in somno, videtur ac-  
compefcit: sed genitale resoluit: lac puerperarum cedere.  
mammis apposita extinguit: in virginitate mam-  
mas coerces, & increfcere non patitur: pueris pra-  
stat, vt eorum testiculi cibum non sentientes, in-  
tabescant. Efficacissima vis Cretica, Megarensi,  
mox Attica, & in Chio & Cilicia nascenti.

## Taxum. CAP. LXVIII.

**S**Milax a Graecis, taxus a Latinis appellatur,  
arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-  
dem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispania  
contermina nascens. Aviculae quae Italica ta-  
xi



xi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripiuntur. Narbone tam præsens est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut eius umbra subsideant, ledantur, & saepenumero moriantur: quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus.

Apocynum. CAP. LXIX.

**A**pocynum, siue cynocræbe, brassica canina, frutex est longus viticulus constans, malè olentibus, lentis, vitiliumque modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutius, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine nudo albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibum data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

CAP. LXX.

**N**erion aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocant. frutex est vulgaris notitia, longioribus quàm amygdala folijs, crassioribusque: fructu in rosam conformato: fructu\* nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem, radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsum nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimus venena sunt: hominibus verò c



ra serpentium morsus praesidia, è vino pota: eo  
 agni ruta addita: imbecillæ etiam animantes, ut  
 pecus & caprae, si aquam bibant, in qua folia ea  
 caduerint, moriuntur.

## Fungi. CAP. LXXI.

**F**ungorum differentia duplex: aut enim man-  
 dumur, aut perniciales sunt. Multis de causis  
 enenosi gignuntur, ubi videlicet clauus ferreus,  
 in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit, aut  
 iuxta serpentis cauernam, arborésque, quæ pri-  
 atim pariunt noxios fructus, erumpant. Continēt  
 qui tales sunt, nescio quod strigmentū cōcretamq;  
 ituitam, terrāq; eruti, quā celerrimè cōputre-  
 unt, atque marcore vitiātur. Sed qui veneno im-  
 uti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent:  
 argius tamen sumpti nocent, & ægrius concoeli  
 strangulant, aut choleram morbum citant. Remē-  
 dio est nitri potus, aut luxiuum cum acida mu-  
 cia, aut feruescente satureia, aut origani iusculū:  
 ebullantur etiam gallinacei fimi potus ex aceto,  
 ut eiusdē delinctu cū melle multo. Corpus alit,  
 sed agrè dissoluitur, cū magna ex parte inte-  
 ri ipsi, cum recrementis alui reyciantur.

## Colchicum. CAP. LXXII.

**C**olchicon, aliqui ephemeron, sunt qui agre = Censetur  
 stem bulbum vocant, autumnu exitu florem Hermoda =  
 dit croci, canalicantem, ab eo tempore, folia bul- = Etylus officina  
 i, sed pinguiora caulem palmo altum, ferētem ru narum.  
 im semen: radicem foris è nigra rufescentem,  
 quæ



quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur: bulbis eius mediam habet rimam, fissuramq;: quæ flos erumpit: plurimum in Messenia, & Colchia nascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis voluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem, quæ fungus: bubulum etiam lapotum auxiliatur: itaq; cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

## Ephemerum. CAP. LXXIII.

Fortè no = **E**phemeron, aliqui syluestrem irin appellant.   
 strum Li = **E**folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem   
 lium cōual **E**florem candidum, amarum: semen molle radice   
 lium. **E**nam, digitali crassitudine longam, adstringen   
 tem, odoratam: nascitur in syluis & opacis. Huius   
 radix dentibus præcipua, si decocto colluuntur. Folia   
 in vino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est muralis herba.

## CAP. LXXIIII.

Officinis **H**elxine nascitur in præditiis, sepibus, vineis & segetibus: folia ei mercurialis in   
 Parietaria **H** sunt, hirsuta: cauliculi subrubetes, & circa eos re   
 luti semina aspera, adherentia vestibus. Folia re   
 frigerandi spissandiq; naturam habent, quæ ex cau   
 sanant illitu sacros ignes, adusta, condylomat   
 panos incipientes, tumores, inflammationesq;. Su



us eius cum cerussa, ignibus sacris, & ulceribus  
ue serpunt, commodè illinitur, imponiturq; poda-  
ris cum hircino adipe aut cerato cyprino: veterē  
ussim emēdat instar cyathi haustus: tonsillis in-  
flammationem sentientibus utiliter & gargari-  
zatur, & oblinitur: aurium dolorem cum rosaceo  
nstillatus lenit.

Alfinc. CAP. LXXV.

**A**lfinen, aliqui amhyllion, nonnulli myos ota Vulgò mor-  
vocant, quoniam masculorum aures folia suis gallinae  
mutantur. Lucus opacisque gaudet, unde alfinc di-  
cta est. Hac erat eadem quae helxine, nisi humi-  
ior esset, & folijs minoribus, \* nec hirsuta. cum \* Ex Plinio  
eritur odorem cucumis reddit. ] Vim refrigeran- adiecta.  
ti adstringendique obtinet: oculorum inflāmati-  
onibus cum polenta illinitur. Succus aurium dolori-  
bus infunditur: quin & emendat omnia quae hel-  
xine, id est, muralis herba.

Lens palustris. CAP. LXXVI.

**L**ens palustris, inuenitur in aqua non fluen- Officinis  
te, muscus lenticulae similis, refrigeratoriæ lenticulae  
aaturæ. Propter quod cōuenienter collectionibus, aqua  
gni sacro, & podagris, illinitur per se, & cum po-  
enta: glutinat & procidētia puerorū interanea.

Semperuium, seu sedum.

CAP. LXXVII.

**S**emperuium magnum ideo nominatur, quo-  
niam perpetuò folia vireant: cuius caules cu-  
biti altitudinem implent, interdum excedunt, pin-  
gues,



gues, crassitudine pollicari, virentes, characietia-  
 \*Vox addi thymali modo infecti: folia pingua, \*carnosa, ]  
 ta ex Plin. magnitudine pollicari, in cacumine linguae simi-  
 nio. lia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia  
 inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi:  
 nascitur in montibus, & testaceis: supra domi-  
 cilia etiam seritur. Eius vis refrigerare, & ad-  
 stringere: medentur igni sacro, nomis, ulceribus  
 quae serpunt, oculorum inflammationibus, ambu-  
 stis igni, podagris per se, & cum polenta illita fo-  
 lia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut  
 rosaceo perfunditur: datur in potu contra pha-  
 langiorum ictus, dysenteriam, aluique profluvia:  
 teretes tineas potus in vino excutit: subditus in  
 vellere, mulierum abundantiam sistit: succus ocu-  
 lorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptus,  
 Vulgò vera inungitur. Semperuium paruum in petris, parie-  
 micularis. tinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nasci-  
 tur; caulibus ab una radice multis, tenuibus, cre-  
 bro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus,  
 mucronatis: caule à medio emicante, palmum al-  
 to: umbellam herbidosque flores, & tenues gerente.  
 Folia eisdem cum priore viribus praedita sunt.  
 Tertium videtur semperuii genus, quam aliqui  
 andrachnen agriam, aut telephon vocauerunt,  
 Romani illecebram, pusillus, crassioribusque folijs,  
 hirsutis, portulacae proximus: nascitur in saxis. Vis  
 ei excafactoria, acris, exulcerans: illita cum axu-  
 gia strum. is discutit.

Vmb



## Vmbilicus Veneris. CAP. LXXVIII.

**C**otyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formā tornato, in euidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vino circumlitus, inſtiliatuſve, conteſta genitalia nudat: inflammationibus, ſacris ignibus, ſtrumis, pernio= nibus, illitu auxiliatur: ſtomachi ardorem refrige= rat. Folia cum radice comeſa, calculos frangunt, vrinam cient, hydropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria. Eſt & alterum genus eiſ= dem, cymbalion aliqui vocant, pinguibus folijs, la= tioribus, ligularum modo denſis circa radicem, medium oculi ambitum deſcribentibus, vt in ma= iore ſemperuuo, adſtringentis guſtus: cauliculo tenui, in quo flores & ſemina hyperici: radice miniſcula. Facit eadem, quæ ſemperuuum.

## Vrtica. CAP. LXXIX.

**D**vo vrticæ genera: ſylueſtris, aſperior, la= tioribus, nigrioribusque folijs ſemine lini, ſed minore. Altera non æquè aſpera, minuto ſe= mine. Folia vtriuſque illita, canis morſibus, addi= to ſale, medentur: gangrænis, carcinomata, ſor= dida vlcera, & quæ cacæthe vocantur, item lu= xata, panos, tubercula, parotidas, ſuppuratio= nesque ſanant: lienosis cum cerato imponuntur: fa= ciunt ad profluuiarium, cum ſucco trita, & naribus indita: menſes ciunt, eadem detrita cum myrrha, & impoſita: procidentes vuluas, recen=

Z



ria contactu resilire cogunt. Semen potum ex passio, venerem stimulat, vuluæ ora patefacit: cum melle delinctum, orihopnceæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchyliis folia, alium emolliunt, urinas mouent, inflammationes discutunt: decocta cum pīisana, vitia peccoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrha medico pota. Inflammationem turgentem tuam gargariæ aut succus reprimat.

## Galiopsis.

CAP. LXXX.

**G**aliopsis frutex in totum caulem, & folia habet verrucæ, leuora, & quæ grauem odorem trita reddant: flore purpurascens, tenui: nascitur circa sepes, edificiorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusque, duritias & carcinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas discutunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescentia, gangrenas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

## Galion.

CAP. LXXXI.

**G**alion, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat: ramulum foliumque habet aparine simillimum, retum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustus illinitur, sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatum vsquedum albescat.

laß



lāsitudines reficit. Radix venerem concitat. Nas-  
citur in palustribus.

Senecio. CAP. LXXXII.

**S**enecio cauliculo est cubitali, subrubro, folijs  
continuis, eruca modo per extremitates diui-  
sis, sed minoribus multò: luteis floribus, qui cele-  
riter dissecti vanescunt in pappos. Nomen verò si-  
bi vindicauit, quoniam flores capillorum ritu, ve-  
re canescant. radice supernacua: nascitur maxi-  
mè in macerijs, & circum oppida. Folia cum flo-  
ribus refrigerant: quare illuta cum vini modico,  
vel per sese, testium & sedis inflammationes sa-  
nant: quin & ex manna thuris medentur, cum re-  
liquis vulneribus, tum ijs quæ nerui acceperunt.  
Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præ-  
stant: verum recentes epoti, strangulant. Totus cau-  
lis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores  
à bili contractos, persanat.

Thaliætrum. CAP. LXXXIII.

**T**haliætron folia coriandri habet, pinguiora  
paulò: cauliculò rutæ crassitudine, in quo fo-  
lia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem  
perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

Marinus muscus. CAP. LXXXIIII.

**M**arinus muscus nascitur in scopulis, testa-  
ceis que hand procul à mari, gracilis, capil-  
laceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, &  
collectiones cohibendi, & podagras, quas refrige-  
rare opus sit.



Phycus marinus. CAP. LXXXV.

**P**hyci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta iuxta terram, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratorem, non podagra modò, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem verum ijs uti humidis conuenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fucò quidam putant mulieres suum calorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Potamogeton. CAP. LXXXVI.

**P**otamogeton, filium betæ simile, hirsutum paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra veterum vlcerum nomias. Nomen ex eo inditum est, quòd palustribus, & aquis enascatur.

Stratiotes. CAP. LXXXVII.

**S**tratiotes in aquis nascens, usdem supernatat, & sine radice viuit: unde cognomentum traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia: quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit à reumibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, inumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Stratiotes millefoliũ. CAP. LXXXVIII.

**S**tratiotes millefolium exiguus frutex, palmi  
Vulgatum millefoliũ. salitudine, aut amplius assurgit: folijs aucu-  
larum



larum pennas imitantibus, breui admodum disse-  
ctoque foliorum exortu. Folia syluestre cuminum  
simulant, præsertim breuitate atque scabritia, bre-  
uiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surcu-  
los in cacumine gerit, exiguos, & capitula in mo-  
dum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in  
asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus  
ad vlcera vetera, recentiâque, profluentem sangui-  
nem, & fistulas.

## Verbascum. CAP. LXXXIX.

**V**erbascum differentias summas habet duas, Tapfus bar-  
hoc nigrum, illud album: in quo mas & batius vul-  
fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt gò.  
brassicæ, pilosiora multò, & latiora, candida:  
caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus:  
flores albi, aut subpallidi: semen nigrum: radix lon-  
ga, gustu acerbâ, crassitudine digiti: nascitur in  
campestribus. Verbasum, qui mas appellatur,  
oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori  
caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi  
nigriore latioreque constaret folio. Syluestre folia \* Sic Plin.  
fert saluæ, altas virgas, & \* lignosas, & circa qui exu-  
eas ramulos, quales marrubium flores luteos, auris d'as vide-  
æmulos. Sunt & phlomides duæ, hirsutæ, rotun- tur legisse.  
dis folijs, humiles. Tertia lychmitis appellatur: Græcus co-  
ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quater- dex d'as  
nis, vel paulò pluribus, hirsutus, crassis, pingui- d'as, id  
bûsque apta ad lucernarum lumina. Radix pri- est, arbore-  
rum duarum adstringit: quare quod magnitudine scemes.



ludicrum talum aquet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiqua tussi auxiliatur. Denium dolorem collutione mitigat. Verbasum, cui flos aureus, capillos tingit, & quocunque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illuminantur: cum aceto quoque vulneribus medentur: contra scorpionum ictus, sunt auxilio. Syluestri folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam feminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

## Aethiopis. CAP. XC.

**A**Ethiopis folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaque, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, crassum ac scabrum, similem apiastro, aut arctio, multus concavum alis: semen erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices ab eodem capite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quae siccae nigrescunt duranturque, ut cornua possint videri: plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriae scabritijs, decocta radix, & pota: quin & cum melle, eclegmaticis vicem prabet.

## Arction. CAP. XCI.

**A**Rction, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco folijs, nisi quod hirsutiora



ra, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulci que. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta peritionesque fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. CAP. XCII.

**P**ersonata folia habet cucurbitæ, maiora & Vulgò lap-  
hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem al- pa maior,  
bicantem, quanquam & interdum vidua caule re & Barda-  
periat: radice grandi, intus candida, foris ni- na.  
gra. Hæc drachmæ vnius pondere pota, cum pineis  
nucibus, purulenta & cruenta extinsientibus au-  
xiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum con-  
tractos, illitus sedat. Folia vtiliter antiquis vlceri-  
bus illinuntur.

Petasites. CAP. XCIII.

**P**etasites pediculus cubito maior, crassitudine  
pollicis, à quo prægrande folium, galeri mo-  
do amplum, ceu fungus dependet. Contra phage-  
denas, & vlcera, quæ cacoethe vocant, efficaciter  
illinuntur.

Epipactis. CAP. XCIII.

**E**pipactus ab alijs helleborine, parua herba,  
exiguus folijs. Iocineris vitæ vtilis, & con-  
tra venena pota.

Capnos, seu fumaria. CAP. XCV. Officinis

**F**umaria fruticosa herbula est, præ tenera, co-  
sumus ter-  
riandri similis: folijs candidioribus, vndique re-



numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis delacrymationemq; unde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducua herba biliosam urinam trahit.

Lotus urbana. CAP. XCVI.

**L**otum urbanam alij trifolium vocant: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculis, ceterasque caliginis discutit.

Sylvestris lotus. CAP. XCVII.

**S**ylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sepe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine fœnigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasque cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cum melle semine, in vino aut passo bibitur aptissime contra dolores, qui vesicam male habent.

Cytisus. CAP. XCVIII.

**C**ytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, sepe maiores in quibus folia fœnigraci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer recensapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur. Decoctus potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alluciat, prope aluearia ferunt.

Lot



## Lotus Aegyptia. CAP. XCIX.

**E**st & in Aegypto lotus, quæ in campis flumi-  
ne inundatis prouenit, caule fabæ: flore par-  
uo, candido, \*lilio simili, quem tradunt occidente \* κρίων,  
sole comprimi occludique, ad ortum autem aperi- non κρίων.  
ri: adduntque, caput ipsum vespere aquis condi, &  
ad exortum Solis emergere. Caput quale papaue-  
ris, maximum: & intus grana ceu milij, quæ Ae-  
gyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos  
hec habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda co-  
clâq; manditur: decoclâque lutei oui qualitatem  
exhibet.

## ANNOTATIO.

Aliud est à nostro Millefolio, quod pau-  
lò ante stratiotem millefolium esse monui-  
mus.

## Millefolium. CAP. C.

**M**Yriophyllon, siue millefolium, caulis est te-  
ner, singularis, unica mixus radice: pluri-  
mis folijs, lauibus, ferniculo similibus: vnde nomen  
accepit. Caulis flauescit, varius, ac veluti ex indu-  
stria delinatus nascitur in palustribus. Vulnera  
recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride,  
vel siccum ex aceto, oblinatur: præcipitatis in po-  
tu cum aqua & sale datur.

## Myrrhis. CAP. CI.

**M**Yrrhis, simillima est cicuta, caule fo-  
lijsq; radix ei oblonga, mollis, rotunda, odo-  
rata, cibo non insuavis. Quæ pota in vino, pha-

℞ s



longiorum morsibus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos: purgatque à puerperio fœminas: subuenit & phibificis cocta in sorbitione. Aiumt quoque eandem bis tēre die potam ex vino in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Myagrum. CAP. CII.

**M**Yagron, aliqui melampyron vocant, herba est surculacea, folijs rubia, pallidis, tri-  
 \* τήλιδι. pedanea: semen oleosum, \* ξανόγραφο simile. Quod  
 non τρα, contusum igni torrent, perunctusq; virgus ad lucer-  
 χύλω. narum lumina vtuntur: hoc pingui, scabritias cor-  
 poris lenigari, atq; expoliri constat.

Onagra. CAP. CIII.

**O**Nagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, vinum olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua radice maduerit, in potu data feras mitigat, & cicures facit: illitu quoque tetra vlcera mulcet.

Cirsium. CAP. CIIII.

Censetur **C**irsium, caulis est tener, duorum cubitorum, Buglossa of triangulo similis: ab imo foliola, rose speciem referentia: anguli spinosi, per intervalla  
 \* Pli. minor = molles: folia buglossi similia, \* maiora, sub-  
 ra. candida, modicè hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in summo purpurea, quæ sol-

4444



nuntur in lamugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus, seu inguinalis.

CAP. CV.

**A**ster Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum, luteū in re, per ambitum, anthemidis capituli modo diuisum, foliolis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem circundant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, proci dux sedi, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradunt purpureum florē, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiale malum sentientibus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum. CAP. CVI.

**I**sopyron aliqui phasitolon ob similitudinem vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampinos torquetur: capitula sunt in summo caule tenuia, plena seminis, melanthii gustum imitantis. Contra tussim, & cetera pectoris vitia, semen ex aqua mulsæ bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus utile.

Viola purpurea. CAP. CVII.

**V**iola purpurea folium habet hedera minus, tenuius ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus,  
sua



suauissimè olens, purpureus: opacus & asperis nas-  
citur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se  
& ex polenta illinuntur aptissimè stomacho & stu-  
anti, & oculorum inflammationibus, sed & que pro-  
cidenti.

## Cacalia.

## CAP. CVIII.

**C**acalia, quæ leontice vocatur, folia fert ma-  
gna, alba: è quibus medius caulis emicat, re-  
ctus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem:  
nascitur in montibus. Radix in vino madefacta,  
ut tragacantha, delinctu aut manducatu per se tus-  
sibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana, quæ post  
excussum florem innascuntur, trita, & cum cera  
to illita, faciem erugant & cutem extendunt.

## Bunium.

## CAP. CIX.

**B**unium caulem edit quadrangulum, procerum,  
digiti crassitudine, in quo ramuli minutis fo-  
lijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, a-  
pio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima:  
flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus.  
Urinam ciēt, excalfacit, secundas euocat: lieni, ve-  
sicæ, renibus vtile. Tam humidi quàm sicci, expres-  
siq; succi caulibus, folijs, radicibusq; vsus inualuit  
ex aqua mulsa. Pseudobunium palmi altitudine  
fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acri  
gustū. Tormina, atque stranguriam, laterum-  
que dolores, sanant quaterni rami eius poti in a-  
qua illiti quoq; cum sale & vino, tepentes, strumas  
discutiunt.

Cha



## Chamæcissus.

## CAP. CX.

**C**hamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longio Non est, re, ramulis à radice quinis senisve, dodran= quannus id talibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, sonet Græ= ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice te= canica di= nui, candida, inutili: nascitur in cultis. Bibunt con= etio, hederæ uenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ terrestris cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus: eo= vulgò nomi dem pota modo, senis aut septenis diebus, regium nata: quod morbum purgant.

eam paulò

## Chamæleuce.

## CAP. CXI.

studiosius

**C**hamæleuce lumborum doloribus propitia cum d. scri= est herba virens, incuruis folijs, surculisq: p= uone con= flore rosaceo.

ferens, liqui

## Buglossum, seu lingua bubula.

dò cognos

## CAP. CXII.

sces.

**B**uglossum nascitur in campestribus, & sabu= Vulgaris losis. Iulio mense colligitur. Aiumt eam, quæ Borago. treis thyrsis emittit, cum semine & radice tritā, potamq: contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. her= bam abscessibus vitile esse volunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bu= bulas imitans linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

## ANNOTATIO.

Nostrum Cynoglossum caulem & purpureos flosculos edens, nō esse verum ac legitimum, historia eius apertissimè indicat.

Cynog



## Cynoglossum.

CAP. CXIII.

**C**ynoglosson folia latifoliae plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur: provenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri, medentur morsibus canum, alopecij, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herba ex vino potum.

## Phyteuma.

CAP. CXIII.

Struthj.

**P**hyteuma folia habet & radicle, minora: copiosum semen, perforatum, radicem parvam, tenuem, per summa terrae nitentem: quam ad amatoria convenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

## Leontopodium.

CAP. CXV.

**L**eontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumve digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem lanisore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semine usque adeo spissal lanugine involutum est, ut saepe fallat: radice parva cohaeret: quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

## Hippoglossum.

CAP. CXVI.

**H**ippoglosson, frutex est folia habens rusciteae figura, & spinosam coriam, & in summo ceu linguas ex folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmati radix succusque admiscetur.

## Antirrhinum.

CAP. CXVII.

**A**ntirrhinon, alij anarrhinon vocant, herbam

can



caule & folijs anagallidi similem: flore albæ vio-  
 æ purpureo, minore tamen, ideoq; sylueſtris ly-  
 bnis nominata eſt: ſemine vituli narium ſimili.  
 Tradunt perunclos ea, cum oleo lilino, venuſtiores  
 fieri: nec vllō medicamento lædi poſſe, ſi quis ap-  
 penſum geſtet.

Catanance.

CAP. CXVIII.

**E**X eo genere vna, folia coronopi habet, lon-  
 ga, radicem iunci modo prætenuem: capitula  
 ſemina, ſeptenāve, in quibus erui ſemen ineſt. Are-  
 ſcens in terram ſeclitatur, & ſe contrahit ad ſpe-  
 ciem vnguium milui exanimati. Altera mali par-  
 ui magnitudinem explet, radice exigua oliuæ ma-  
 gnitudine: folijs quoque oliuæ colore, & figura,  
 mollibus, diuiſis, humi inclinatis: ſemen, vt cicer,  
 minutum, in virgulis dependet, puniceï coloris, mul-  
 tis foraminibus pertuſum. Vtranq; narrant in a-  
 matoria expeti. Theſſalicæ mulieres huſui tra-  
 duntur.

Tripolion.

CAP. CXIX.

**T**Ripolion in marinis naſcitur locis, quæ alli-  
 dit vnda, recedensq; dimittit, neque in ma-  
 ri, neque in ſiccis: folio glaſti craſſiore: palmeo cau-  
 le, in mucrone diuiſo. Eius, vt tradunt, flores colo-  
 rem ter die mutant, mane candidi, meridie purpu-  
 rei, ſero puniceï conſpiciuntur. Radice alba, odo-  
 rata, calidi guſtus. Quæ drachmis duabus in vino  
 pota, aquam, vrinamq; per aluum extrahit. In me-  
 dicamenta digeritur, quæ venena arcent.

ANN



Officinarum Capillus Veneris. Est enim earum Adiantū, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxj. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, vti suspicamur, fuscis obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiātum, comparatum, album potius, quàm nigrum, appareat.

Adiantum.

CAP. CXX.

**A**dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice superuacua: neque caulem, neque fructum, neque florem præfert. Decoctum herbæ potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinæ difficili. Calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet, & mēstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit furfures, & manantia capitis ulcera, ex lixiuo emendat: defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoq;. Decoctū eius cum lixiuo & vino infusum, idem præstat: coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorū additū. Seruitur gratia utilitatis pecorum circa ouilia. Vmbrosis, & pal



alustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Trichomanes. CAP. CXXI.

**T**richomanes nascitur eisdem in locis, quibus Officinis adianton filici simile, sed exilius: folijs lentius polytrichonula, tenuibus, in ordinem virinque digestis, ad quod idem uersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore tamen cum e splendentibus. Eadem quæ & adianton præstare Adianto. posse constat.

Xanthium, siue Lappa. CAP. CXXII.

**X**anthium nascitur lato & pingui solo, & la- Vulgò lappacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pin- pa minor. rui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atriplicis habet, infecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu vestibus adherescit. Is autè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro autè perfrictum, illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asservant. Semen aptissimè tumori bus imponitur.

Aegilops, siue festuca. CAP. CXXIII.

**A**egilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternive, rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cū farina herba ægylopsis medetur, diuitias Marcello discutit. Succus farinæ admixtus, siccatur, & suppositi corundem gratia reponitur. \* Bromus herba ægyllops.

A



lopi similis, exiccatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adycitur rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam aloen addunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux. CAP. CXXIII.

**G**laux cytiso aut lenticulae folijs similis, quae superne virent, auersaeque candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quini senive, tenues ab radice, dodrantem alti: flores violae albae, purpurei exeunt, minores tamen: nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

Polygala. CAP. CXXV.

**P**olygala palmi altitudinem petit, folijs lenticulae, gustu adstricto. Quae pota, lactis abundantiam facit.

Osyris. CAP. CXXVI.

Censetur  
Linaria  
vulgò ap=  
pellata.

**O**syris, frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuque contumaces: & in his folia, quaterna, quina, senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescunt. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

Aspera smilax. CAP. CXXVII.

**S**milax aspera, folia habet periclymeni: samentia tenuia, multa, rubi modo aut paliuri

acu



aculeata: arbores scandit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumque leniter mordent. Nascentur in palustribus & asperis: radice dura, crassaque. Folia & acini, & ante & post epti, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcentur.

## Læuis smilax. CAP. CXXVIII.

**L**æuis smilacis folia hedera similitudinem habent, molliora, læuora, tenuiora: huius sarmenta nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: flores circunquaque exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadam topiariorum arte, teniora contra æstus molestiam faciliantur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio pito, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

## Ruscus. CAP. CXXIX.

**S**yluestris myrtus, aliquibus oxymyrsine, aut Officinis myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: fr. Bruscus. lium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum: bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo nitus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lentis, fractu contumaces, foliosi: radice graminis



simili, acerba, & subamara. Folia & bacca in vino pota & urinam cient, menses pellunt, vesicae calculos frangunt, stillicidio urinae medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & precipitibus locus enascitur. Decoctum radice in vino potum, eosdem prabet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

Laurus Alexandrina. CAP. CXXX.

**L**aurus Alexandrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, \* Rusco dodrantales, interdum longiores: radice \* sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice posita sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio urinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. CAP. CXXXI.

Vulgò Lau-  
reola.

**D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra: radix inutilis: nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens vel aridum in potu, menses ciet & vomitus: caput inanit commanducatum, sternutamenta mouet. Bacca quindecim pota aluum resoluit.

Cha



## Chamædaphne. CAP. CXXXII.

**C**hamædaphne virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tennes, leues: folia lauri similitudine, leuiora multò, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cum vino succus, menses & urinam ciet: idem facit pefso appositus.

## Veratrum album. CAP. CXXXIII.

**H**elleborum album, Latini veratrum album vocant, fert folia plantaginis aut betæ syluestri similia, sed breuiora, & nigriora, \*rube- \*Plin. cana scentia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis conlium dorso uolutum, quæ abdicat cum arefcere incipit: radices rubescētia. cibis nititur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguo capite cæparum modo exeuntibus: nascitur in montibus & asperis. Radices mēfibis colligendæ. Optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modicè extentum, nec tamen iunci modo mucronatum, quod si angendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non admodum feruens, neque saluam subinde ciens, (huiusmodi autem strangulat.) Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem varios extrahit humores. Collyris admiscetur, quæ caliginem oculorum discutit. Partus impositum necat, menses pellit, ster-



nutamenta excitat, mures interficit cum melle & polenta subactum, absumit carnes si coquatur una. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut plisane succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulle, aut quavis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita massatur. Præparatio corporum, ac victus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maxime à Philomede Siculo Ennensi, cui nunc assentimur: quippe longum nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pulis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitus non intempestivè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. CAP. CXXXIII.

**H**elleborum nigrum, appellatur melampodium, quoniam caprarum pastor, nomine Melampus, furentes in se Proctidas, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen cucini, quod in Anticyra sisamoides vocant:



cant: quo deiectiones moliuntur: radicibus cohaeret nigris, tenuibus, à capitulo capæ simili confibratis. quarum est vsus: in collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est, quod ex huiusmodi petitur terris, vi ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpus lentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq;: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituitasq;: datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente & in sculis, quæ purgationis causa sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses indutum trahit, partus necat, purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat: erodentibus medicamentis commiscetur: hydropicorum ventri vtilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma: consitum proximè radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius resparsu domos expiari arbitrantur: quare inter fediendum stantes, Apollinem.



Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquilæ volatus: adulare enim non sine periculo tradunt: namq; si aius effusionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiantur oportet, quoniam halitu caput aggrauat: quare propter, ad id arcendum, fossuri allium præsumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnum. CAP. CXXXV.

**S**esamoides magnum, in Anticyra helleborum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longior folio flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis pituitæq; detectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsæ. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasq;: semen ex aqua mulsæ potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Sylvestris cucumer. CAP. CXXXVI.

Vulgò Cucumer asinus.

**C**ucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque semen



menta sativi refert: radice candida, magna nascitur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totū amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: podagras discutit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginem, lepras & vitilignes absterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, bilem puitamque deiciunt, præsertim in hydropicis: (deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet) radice selibra, in vini præsertim Libyci hemina conteritur, danturque ex eo terni cyathi triduum, dum tumor abunde deprimi cernatur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum, quod elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucu- **Elaterium.**  
meres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur non  
ele una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, virisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur: simulque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur, quod ita pressum est, residere sinitur, atque in vicinam peluim demittitur. Coacervata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pres-



sa abijciuntur. Humor in pelui agitatur, & linteo  
 opertus Soli exponitur: dumque steterit, tota su-  
 pernatans aqua cum humore concreto, effundi-  
 tur. Hoc vero identidem fieri solet, donec existens  
 aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimen-  
 tum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in  
 pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi  
 abundantiam, cribratos cineres humi inspar-  
 gant, & medium cavantes, triplicatum linteum  
 obtendant, per quod elaterium cum sua humidi-  
 tate diffundunt, siccaturumque in pila, ut dictum  
 est, conerunt. Aliqui pro dulci aqua marinam  
 perfundentes, ita eluunt. Alij in novissima lotio-  
 ne, mulsam aquam respergunt. Elaterium opti-  
 mum esse constat, laeve, non ponderosum, cum can-  
 dore leniter humectum, gustu amarissimum,  
 quodque lucernarum luminibus obiectum, facile fla-  
 gret. Porraceum tamen scabrumque, si turbidum  
 spectetur, atque erui cineruque plenum sit, graue  
 & vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis  
 succo amyli immisceant, ut candorem ipsum &  
 lenitatem imitentur. A bimatu ad decennium de-  
 iectionibus utile est. Integer modus, obolus est: mi-  
 nimus, semiobolus: pueris, chalci duo: siquidem co-  
 piofius, periculum adfert. Bilem ac pituitam  
 vtriusque parte extrahit. Optima suspensio est pur-  
 gatio. Quod si in animo sit deiectionem moliri, ad-  
 iecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat,  
 ex aqua, erui magnitudine catapolia dato, postea  
 cyat



cyathus unus aquæ tepidæ sorbeat: ad citandas tamen vomitiones aqua diluens elaterium, subiectis linguae partes penitissimè penni oblinito: quòd si quisquam difficilius euomat, oleo aut unguento irino resolutio, somnum inhibeto. Porro his qui eximie vacuantur, continuè vinum, & oleum dari conuenit: etenim vomendo restituntur. Quòd si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, pomi, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, & partus enecat, in pessa subditum: morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat: efficacissimè anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. CAP. CXXXVII.

**S**taphis agria, sine herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles, nigrosq;: fert florem glasti, & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulsæ dentur, crassum humorem per vomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent: prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuo potui dare: quoniã pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris. Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheumat



matissimum gingivarū sistit: vlcera oris manātia,  
cū melle sanat. Vreniibus malagmatis imponitur.

Thapsia. CAP. CXXXVIII.

**T**hapsia nomen ideo accepit, quòd in Thap-  
pso eiusdem nominis Insula primum inuen-  
ta sit. Tota verò natura ferulae similis est: graci-  
liore caule: folijs fœniculi: umbella anethi in cacu-  
mine, à singulis surculus erumpente: flore luteo: se-  
men quale ferulae, latiusculum, sed aliquantò mi-  
nus: radix foris nigra, intus candida, longa, a-  
cris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ra-  
tio hæc est: Facto in ambitu scrobe, cortices inci-  
duntur: aut radix in fornicis speciem in se exca-  
uata, cooperitur, quòd merus succus confluat: opor-  
tet illuc sequenti die se conferre, & congestum suc-  
cum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, &  
succus organo per quallum expressus fictili cras-  
so insolatur. Aliqui folium vñ terunt: sed in-  
validior huiuscemodi succus. Hoc autem interest,  
quoniam qui ab radice manauit, grauius olet,  
& humidus permanet: è folijs autem extractus,  
exiccatur, atque teredinum iniuriam sentit. Qui  
succum colligit, stare debet non obuersus vento:  
aut potius, cū dies apricus est, & à flatu silet:  
quoniam ob halitus acrimoniam facies vehemen-  
ter intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustula:  
ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas  
partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cor-  
tex radice, quàm succus, purgandi vim habent,

&



& lacteus succus in aqua mulsa potus: nã vtrinque  
 hilem extrahunt. Radicis modus, quaterni obo-  
 li, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, ter-  
 ti oboli: lactis, obolus vnus quod eo amplius assu-  
 mitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio con-  
 uenit suspiciosi, & diuturnis laterum doloribus,  
 reiectionibusque, datur in cibis aut obsonio, qui-  
 bus difficile sit vomere. Tam radix, quàm succus  
 omnium maximè, quæ pares cum eis vires adepta  
 sunt, vim habent extractoriam ex alto, vbi ex-  
 imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas  
 aliò transferenda est: vnde succus illitione, aut ra-  
 dix recens affriclu, alopecias explent. Radix suc-  
 cusque cum æquis ceræ thurisque portionibus, su-  
 gillat a liuoribusque tollunt: sed non plus binis horis  
 dimittantur: locus deinde aqua maris calida fo-  
 ueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle il-  
 litus succus: lepras tollit: tubercula discutit, per-  
 unctus cum sulphure. In diuturnis pulmonum, la-  
 terum, pedum, articulorumque valetudinibus vti-  
 liter illinitur. Valet ad integendam colis glandē,  
 ys qui natura, non circumcissione, curti sunt: tumo-  
 rem enim excitat, qui pinguium fotu emollitus,  
 præputij iacturam resarsit.

## A N N O T A T I O.

\* Sine foliis, Spartium, vt in agro Mons-  
 pessulano eius feracissimo sæpe obseruaui  
 (à G. Rondelletio eius loci clarissimo Me-  
 dico primùm admonitus) cum primū erum-  
 pit,



pit, plurimis foliolis turget, quibus omnibus cum ad consistentiam pervenit (quo solo fortassis tempore visum Dioscoridi) exultur, adeo ut ramuli eius iuncea deinde appareant. Est tamen hoc diversum plane ab eo, cuius Plinius lib. xix. cap. xi. meminit. Ceterum an spartium hoc loco depictum, sit idem cum genista Latinorum, malo equidem dubitare cum Plinio, quam eorum iudicio subscribere, qui diversi generis plantas esse contendunt: & pro genista fruticem quandam rebus alligandis (quod in illa tamen requirit Plinius, & Maro in Georgicis, cum lentam appellet, satis innuit) parum idoneum ostendant.

## Spartium.

## CAP. CXXXIX.

**S**partium frutex est, longas ferens virgas, \* sine folijs, firmus, fractu contumaces, quibus vires vincuntur: semen lenticulae, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albae violae, luteum. Purgant per superna vehementer, hellebori vice, citra periculum flores, & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem movet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus, ischiadici, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadici clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

Sil



Silybum.

CAP. CXL.

**S**ilybon, lata spina est, folia ferens chamaleon-  
nis albi. Hæc recēs cum sale oleoq; cocta estur.  
Radiciſ succus drachmæ pondere potus, vomitio-  
nes ciet.

Glans vnguentaria.

CAP. CXLI.

**G**lans vnguentaria, fructus est arboris myria-  
cæ similis, magnitudine auellanæ nucus, cu-  
ius nucleus græcarum nucum more tritus, humo-  
rem reddit, quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vi-  
tur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, &  
Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, res-  
dens, candida, quæ faciliè delibretur. Ea drachmæ  
pondere pota, lienem absumit: cum loliæ farina, &  
aqua mulsæ, podagricis illinitur: psoras lepræque  
lecocta in aceto, vitiligines & nigras cicatrices  
cum nitro, emendat: & cum lotio lentigines, varos  
& papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomi-  
tiones mouet, & aluum cum hydromelite resol-  
uit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimi-  
tur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstrin-  
git: verum tussæ & expressæ succus abstergenti-  
bus medicamentis adycitur, quæ aduersus pruri-  
tines & scabritias idonea sunt.

Narcissus.

CAP. CXLI.

**N**arcissum sunt qui ut lilium, liriū appella-  
larint, folia porro similia, tenuia, multo mi-  
nora, & angustiora: caulis vacuus, & sine fo-  
lijs, supra dodramem attollitur: flos albus, intus  
croc



croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrum, longum: probatissimus nascitur in montibus, suavi odore: ceteri porrum imitantur, atque herbaceum virus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, vomitoria est: ambustus igni prodest, cum exiguo melle trita: praecisis nervos illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit: vitia cutis in facie, vitiliginisque cum semine vrticae, & aceto emaculat: cum eruo & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit concoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

## Hippophaes.

## CAP. CXLIIV.

**H**ippophaes, quo fullones vestes interpolant, in sabulosis, maritimisque nascitur, surculaceo frutice, undique denso & largo, folijs olea, longioribus, inoliioribusque: inter quae candicantes spinæ emicant, siccae, angulosae, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescences: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsiæ, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Syncerus, pituitas, bilem, aquasque detrahit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frutex cum radicib



dicibus siccatus tunditur, & cum aqua mulsa dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, uti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. CAP. CXLIII.

**H**ippophæston, id, quod aliqui hippophaes appellant, nascitur eisdem locis, quibus hippophaes, estq; spinæ fullonæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: manibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exsiccat. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsa, aquam pituitasque detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitijs, & orthopnææ conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus. CAP. CXLV.

**C**ici, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor provenit parua siue taputia maior: altitudine, folio platani, maiore, leuiore, & minor. grimore: ramis, caudicibusque cauis, in ariditatis morem: semine in vis asperis, quod corticibus exitum, ricinum animal representat: ex quo oleum, nomine cicinum, exprimitur, cibus scdum, lucernis emplastrisque vile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamque per aluum extrahunt: vomitionesque mouent, sed in iucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosque expurgat.

B



Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresque leniunt: rigentes mammæ cohibent. eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Tithymali. CAP. CXLVI.

**T**ithymali genera septem, quorum masculus, characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter, myrtites, qui femina existimatur, eumque myrsiniten aut caryiten vocant: tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt: alius, helioscopius: quintus, cyparissias: sextus, dendroides: septimus, platyphyllos dicitur. Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueola foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur: nascitur in asperis, & montibus. Succus aluum purgat: trahit pituitam bilēque, binis obolis in posca sumptis: & cum aqua mulsa, vomitiones mouet. Appetente vindemiarum tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Aliqui adiciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasve guttas instillant, ut cum his inarescant: quas ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quò venius aspiret, stare quenquam, neque

man



manus oculis ad mouere conuenit: sed antequam colligas, corpus, præsertim faciem, collum, scro-  
mque genitalis, adipe aut oleo cum vino perun-  
gere. Fauces autem exasperat: quapropter cata-  
uolia, cera aut decocto melle oblini par est, & hoc  
modo dari: binas tamen ternasve ficos, purgatio-  
nis gratia, sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo,  
berunctos in sole capillos euellit, renascentesque  
laues, & exiles efficit: denique omnes perimit.  
Dentium cauernis inclusum, leuat dolores: sed ce-  
ra dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & lin-  
guam vitiet. Tollit illius impetigines, formican-  
tes verrucas, pensiles, & quæ thymi florem re-  
presentant. Valet aduersus pterygia, carbuncu-  
los, phagedænis ulcerum, gangrænas, fistu-  
lasque. Legitur semen autumnino, & siccatum sole  
leniter tunditur, feruefactumque loco mundo repo-  
nitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei  
succus effectum præbent, dimidio acetabulo pota.  
Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepidio,  
& caseo contuso. Radix drachmæ pondere in hy-  
dromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum  
aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

Fœmina, quam myrsiniten, aut caryiten voca-  
runt, similis suapte natura daphnoidi: folijs myr-  
ti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, &  
pungentibus: ramulos ab radice mittit dodran-  
tales: fructum fert alternis annis, nuci similem,  
mordaci gustu: nascitur & hæc in asperis. Suce



cus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones invalidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur paraios, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellant. Nasitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quibus senisve à radice exeuntibus: folijs lini, angustis, parvis, oblongis, in versis quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut eruum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitulis incluso. Helioscopi nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus semenque, ut aliorum. Eadem quæ superioribus vires, non tamen usque adeo validæ.

Ciparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem piceam emulatur, unde nomen traxit. Candido succo madet, cui eadem vis quæ superioribus. In petris nascens, dendroides cognominatur, ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, caliculis rubentibus: folijs myrti tenuioris: fructu  
char



characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, simili-  
 que modo reconditur. Platyphyllos, verbasco simi-  
 lis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt  
 aquas. Pisces necat, tusus, & aquæ inspersus. Re-  
 liqua tithymalorum genera, quæ suprà scribuntur,  
 idem efficiunt.

## Pityusa. CAP. CXLVII.

**P**ityusam specie à cyparissia differre constat,  
 etsi tithymalorum generi assignetur. caulis  
 supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: fo-  
 lys piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut pur-  
 pureo: semine instar lenticulæ, lato: radice cras-  
 sa, candida, succo referta. quibusdam in locis fru-  
 tex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per al-  
 uum radix, drachmis duabus data in aqua mul-  
 sa: item seminis drachma: succi cum farina sub-  
 acti cochlearium, in catapotio datur: modus fo-  
 liorum drachmæ tres.

## Lathyrus. CAP. CXLVIII.

**L**athyrus, quam aliqui tithymalum appel-  
 lant, eamque tithymalorum numero adscri-  
 unt, caulem emittit cubiti altitudine, & digita-  
 i crassitudine, inanem: gignuntur in cacumine  
 ale, & folia in caule oblonga, amygdalini pro-  
 xima, latiora, & leuiora: quæ autem in summis  
 ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolo-  
 chiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine  
 fructum summus surculus gerit, triplici loculamen-  
 to insignem, rotundum, ceu capparim, in quo gra-

Officinis  
 Cataputia



na intercurfantibus membranis inter se distincta continentur, erius maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquantur ad eosdem effectus.

## Peplus.

## CAP. CXLIX.

**P**eplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut ruta, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet, supernuacua, ex qua fruticat: nascitur inter vias, & in hortis. Colligitur messibus: siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus insus & feruesfactus reconditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto: obsonijs inspersa conturbat aluum: muria conditur.

## Peplis.

## CAP. CL.

**P**eplos, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimo maximè nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs satiuæ portulacæ, rotundis, inferuè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo.



peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

Chamaesyce. CAP. CLI.

**C**Hamaesyce aliqui sycen nominant. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, pepium planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: semine sub folijs rotundo, ut in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedant, in pecto appositi, tollunt tumores ac verrucas omnium generum illiti: decoctorum cibo, alius resoluitur. Succus simili effectû prodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur: aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosissq; nascitur.

Scammonia. CAP. CLII.

**S**cāmonia, ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præseferant: folijs helxine, aut hecderaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangularis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graecolente: radice prælonga, crassitudine cubitai, candida, graui odore, succo granida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto radix in testudinis speciem cultro excavatur, quo fit ut in eam confluat succus, qui conchis demum ex-



cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fo-  
 diunt, in quos subiectis inglandium folijs, profun-  
 dunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur au-  
 tem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore  
 quam simillimum taurino glutini, fungosum, te-  
 nuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiae de-  
 portatur. Nec attendere solum par est, si lingue  
 tactus albescat (hoc enim euenit adulterato, quod  
 admisto fit tithymali lacte) sed longè magis an-  
 tea narratis. Item si nō vehementer linguam ex-  
 urat, id quod misti tithymali argumentum est.  
 Natione autem Syriacum & Iudaicum deterri-  
 ma habentur, graua, densa, erui farina & tithy-  
 malo vitata. Succus drachmæ vnius aut quater-  
 num obolorum pondere haustus, ex aqua pura vel  
 mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad  
 resoluendam aliuū binos obolos cum sesama, aliōve  
 semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris pur-  
 gationis causa, succi tres oboli, cum duobus vera-  
 tri nigri & aloes drachma vna. Fiunt purgatoriū  
 sales, drachmis viginti succi scammonia, in senos  
 salis cyathos adiectus. Horum modus proportionē  
 virium: integer quidem, tria cochlearia: medius,  
 duo: minimus, vnum. Radicis drachma vna aut  
 altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli de-  
 coctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum  
 hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadi-  
 cis utili. Partus enecat succus, vuluæ in lana sub-  
 ditus: tubercula discutit cum melle aut oleo illi-

145:



tus: decocto in aceto peruncta lepræ abiguntur:  
diurni capitis dolores ex aceto & rosaceo per-  
funduntur.

Chamælea. CAP. CLIII.

**C**hamælea surculosa fruticat, ramis dodran-  
talibus: folia oleæ similitudinem habent, te-  
nuiora & amara, quæ gustata linguam mordent: Arabum mo-  
& arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, re-  
folijs præsertim in catapotio deuoratis: namque duæ  
absynthy partes, adiecta chamæleæ una, hydrome-  
lite excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea au-  
tem in ventre non liquescunt: siquidem quotquot  
fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis  
sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa. CAP. CLIIII.

**T**hymelæa est, qua granum gnidium, quod Granum  
est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apo- Gnidium.  
linum vocant, quoniam satini lini frutex suapte  
natura similitudinem referat. Virgas edit per-  
pulchras, multas, tenues, binum cubitorum altitu-  
dine: folijs chamæleæ, angustioribus, & pinguioribus,  
viscosis, gummosisque, si mordeantur: flore  
candido: fructu myrti in modum rotundo, qui in-  
ter initia virescit, & tandem rubescit: inuolucrum fru-  
ctus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per  
inferna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si vi-  
ginti granorum pars interna bibatur: verum fau-  
ces adurit. Itaque cum farina aut polëta, aut in vna  
acino dari debet, aut melle cocto obductum deno-



rari. Qui agrè desudant, trito semine cum nitro & aceto, iniunguntur. Folia quæ peculiariter cneorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere convenit. Illitum acetabuli modo, cum diluta vini potione, aquam extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina vna acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nasquitur in montibus & asperis. Hallucinantur, qui coccongnidium fructum esse chamæleæ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

## Sambucus.

CAP. CLV.

**S**ambuci duo genera: vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglandis, ternaria, quaternaria, ex interuallis circa ramos exeunt, grauiâ odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus cauliculusq; circinata umbellæ, quæ florem candidum pariunt, mox acinum terebinthi similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vni sumq;. Alterum genus, chamæactæ vocatur, Romanis ebulum, longe humilius est, magisq; herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq;, graueolentibus, in ambitu serratis: muscario sambuci flore & acino eiusdem: radicibus

dice



dice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem  
 utriusque vis, & vsus exiccans, alius detrahens  
 aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum more co-  
 quuntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Cau-  
 les teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix  
 in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiu-  
 uat: prodest viperarum morsibus, eodem pota mo-  
 do: vulvas emollit insidentium decocto, patefacit  
 earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino  
 poti eodem funguntur munere: denigrant capillos  
 illiti. Folia, si pratenera ac mollia ex polenta illi-  
 nantur, inflammationem mitigant: ambustis &  
 canis morsibus illitu profunt: vlcera quæ dehiscunt  
 in fistulam, agglutinant: ijs, qui podagra ten-  
 tantur, cum seuo taurino aut hircino profunt il-  
 lita folia.

## Pygnoconomum. CAP. CLVI.

**P**Ygnoconomon constat eruce folijs, acrioribus,  
 scabris & crassis, caule quadrangulo: flore  
 ocymi: semine marrubij: radice nigra, aut palli-  
 da, rotunda, exigui mali figura, terram redolente:  
 inuenitur in saxosis locis. Semen graui somnia, &  
 tumultuosa facit, drachmæ instar potum: tumores  
 discuit, illitum cum polenta, & spicula, adactosque  
 corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula,  
 panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsæ duum  
 drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem ex-  
 trahit.

Apios,



## Apios.

## CAP. CLVII.

**A**pios ramulos duos siue tres iunceos spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamen & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice \* hastulæ regie, in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fecunda: intus habet corpus cæcidum, extrà cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilē pituitasq; extrahit: inferior, per aluum: tota vtrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat penna selectum, exiccatur. Purgat vtraque parte is succus, sesquibolo potus.

## Colocynthis.

## CAP. CLVIII.

Coloquintida officinis.

**C**olocynthis sarmenta foliaq; satiui cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pile conglomeratum, vehementer amarum: quem legere oportet, cum cæperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsa, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pile teruntur, & infusæ clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitijs, vt quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant: foetus admotæ enecant: dentium dolorem tollit, si vna repurgetur & luto oblita cum aceto & nitro infernescat, hoc



hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua mulsa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmenta alui detrahet: stomacho supra modum aduersatur: subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur. Virentis succo vtilissimè ischiadici perfricantur.

Epithymum.

CAP. CLIX.

**E** Pithymon, flos est è thymo duriore, sat ureiæ Aliud à no-  
simili: capitula habet tenuia, & leuia, & in stro Epithy-  
eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cū mel-  
le detrahit pituitam bilem q; atram, per inferna.  
Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, ace-  
tabuli mensura, ad quatuor drachmas, cum melle,  
sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia &  
Pamphylia gignitur.

Alypum.

CAP. CLX.

**A** Lypon surculosa herba est, subrubra: graci-  
libus ramulis: tenuibus folijs, flore molli,  
eui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acris suc-  
co, semine epithymi: gignitur in maritimo, maxi-  
mè Libyæ, quàm largissima: quanquā alibi quoq;  
plurima prouenit. Semen atram bilem deiecit, se-  
mensura epithymo pari cum sale & aceto summa-  
tur: verū interanea leniter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

CAP. CLXI.

**E** Mpetron aliqui \* phacoides vocant, nasci \* Galenus  
tur in montibus, & maritimis, salso gustu, prasoides.  
sed quò propius terreno fuerit, amarius sentitur.

Tra



Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris.

CAP. CLXII.

**V**itis sylvestris sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortiensis solam, longioribus ac latioribus: muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis vuis simili, post maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruefacta radix in aqua, & in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideò hydropicis datur. Vuae eius, vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Enascentes viticulae, cibi gratia, sale condiuntur.

Vitis alba.

CAP. CLXIII.

Officinis  
Bryonia.

**V**itis albam aliqui bryoniam vocant. Folijs, viticulis, pæpiniq; satiuam vitē imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur fructus rubens in vua dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam ciet. Folia, fructus, radix, acrem vim sortiuntur: itaque ulcerum phagedenis, gangrenis, chironijs, putrentium tibi arum tædio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie, varosq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & fixo magraco. Eodem effectu prodest decocta in oleo, usque dum lique scat: sugillata tollit, & reducias

com



Committit inflammationes discutit illita ex vino:  
 suppurationes rumpit: medicamento aptè immi-  
 scetur, quod carnem exest: infracla ossa extrahit,  
 trita & imposita. Datur comitialibus in potu dra-  
 chma pondere, quotidie, anno toto. Prodest attoni-  
 tis, & vertigine laborantibus, consimiliter assum-  
 pta. Contra viperarū ietus pota drachmis duabus,  
 auxiliatur: partus necat, mentem interdum sub-  
 iurbat: seminarum locis apposita, partus secun-  
 dasq; morātes trahit: cit vrinā pota. Eclegma ex  
 ea fit cum melle, difficilē spirantibus, strangulatu  
 oppressis, iussientibus, vulsis, ruptis, & laterum do-  
 loribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, trigin-  
 ta diebus, consumit: illinitur ad eadem cum fico.  
 Ad muliebres in seffus decoquitur: siquidem vulnus  
 iurgat, sed abortū facit. Succus ē radice vere ex-  
 irimitur, qui trahit pituitam, cum aqua mulsā po-  
 us. Ad psoris & lepras, semen efficaciter illini-  
 tur. Lactis abundantia facit succus eius, si cum tri-  
 fico decocto sorbeatur.

Vitis nigra. CAP. CLXIIII.

**N**igra vitis, quam aliqui nigram bryoniam  
 vocant, folia fert hederæ, smilaceæ proxi-  
 ma, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis  
 ius arbores, quasi adminicula, comprehendit:  
 uetus racematim coherent, qui inter principia  
 irent, & post maturitatem nigrescunt: radix fo-  
 us nigra, intus buxæ colore. Viticulae, quæ pri-  
 o germinum partu erumpunt, in olera recipiun-  
 tur:



tur. menses pellunt, urinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutione tentatis, prosunt. Radix eadē, quę vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix.

CAP. CLXV.

**F**ilici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pennata, subgravi odore: radice per summa cæspitum nigra, oblonga, filices multas fundente, subadstringente gustu: nascitur in montibus, & saxosis. Radix latus in eas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammonie aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio: cuius rei probatio talis fertur: Peribiti filix, quam per ambitum sata copiosior arundo coronet: & contra, evanescens abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Filix femina folijs est simplicis, surculosis, altioribusque, & quę non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quę ex nigro in luteum flavescent: aliquę etiam nunc rubrę inveniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle, e clegmate sumpto: pote cum vino, drachmis tribus, ter



eretes tineas eyciunt: datæ fœminis, sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortiũ, si supergrediantur. Farina humidis vlceribus & cicatrici reputantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus melitur. Folia recentia, in oleribus cocta manduntur vt ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

CAP. CLXVI.

**F**ilicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercuum, salui altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui berinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirri, seu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Aridæ farina aquæ mulsæ insparsa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatus efficaçiter illinitur, & aduersus rimas, quæ inter digitos sunt.

Dryopteris. CAP. CLXVII.

**D**ryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multò minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilotrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorẽ euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

C



## Cnicus. CAP. CLXVIII.

Officinis, **C**nicus folijs constat oblongis, per ambitum di-  
 Cartamus. Cuisis, asperis, spinosis: caule sesqui pedali: capi-  
 tulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine  
 candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore  
 in obsonijs utuntur. Seminis tusi & expressi succus  
 cum aqua mulsæ, vel iure gallinacei alius purgat,  
 sed stomacho aduersatur. Ex eo autem sunt offula,  
 quæ placentulas vocant, adiectis succo amygdali,  
 nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt.  
 Hæ in partes quatuor fiunt, quæ nucis in-  
 glandis magnitudinem impleant: è quibus ante  
 coenam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio tem-  
 perandi hæc est: Cnici candidi sextarius, amyg-  
 dalorum tostorum & delibratorum cyathi tres,  
 anisi sextarius unus, aphronitri drachma una,  
 cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus  
 lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultas  
 te donat.

## Mercurialis. CAP. CLXIX.

**L**YNOXOSTIS, aliqui parthenion, alij hermubota-  
 nion appellant: folijs constat ocyni, helxine  
 cognatis, sed minoribus: ramulis duplici genicu-  
 lorum nodo cinctis, alarum cauis multus: fructus  
 femine, copioso, quandam racemorum speciem  
 præbente: mari, è foliorum sinu dependente, par-  
 uo, rotundo, cæbinis testiculis unâ coherentibus:  
 frutice dodrantali aut maiore. Viraque in oleri-  
 bus manditur, ad aluum ciendam: cocta in aqua,  
 epo



epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat ut ma-  
res gignantur, hunc facere: ut facmina, illam, si à  
purgatione bibantur, & trita folia genitalibus  
admoueantur.

Cynocrambe. CAP. CLXX.

**C**Ynia aut cynocrambe, cauliculum binum do-  
drantum altitudine emittit, mollem, subalbi-  
dum: folia mercuriali aut hederæ similia, certis in-  
terstijis subalbida: semen folijs adhæret, paruum,  
rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient:  
oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam  
& bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium. CAP. CLXXI.

**H**ELIOTROPIO magno flos est effigie scorpionis  
caudæ, unde scorpuro ei nomen: & quo-  
niam folia cum sole circumagat, heliotropion dici-  
tur. Folia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, &  
maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe  
quini exiliunt, multius alis concavi: flos in cacumi-  
ne candidus, aut subfulvus incuruatur ut scorpio-  
nis cauda: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in  
arboribus. Decoctum herbæ ex aqua, fusciculo manus  
potu pituitam bilemq; per aluum extrahit:  
scorpionum ictus ex vino potum, & illi-  
um, rodest: ad alligatur ad conceptus arcendos.  
Aunt per horam unam ante accessiones, seminis  
grana quatuor cum vino quarianis finire: tria  
verò, tertianis. Illud semem fornicantes ven-  
rucas pensilesq; & thymos, & epimychidas exic-



cat. Folia infantium de stillationibus, quas syria-  
 seis vocant, podagris, luxatisq; utilissimè illinun-  
 tur: menses cient: partus trita & imposita pellunt.  
 Heliotropion paruum nascitur in palustribus,  
 iuxta lacus, folijs, antedicto proximis, rotundiori-  
 bus: semine, acrochordonum verrucarum modo,  
 pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota,  
 adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, la-  
 tas tineas teretēsque excutit. Pensiles verrucas,  
 quæ acrochordones vocantur, cum sale illi-  
 ta tollit. Scorpioides herbula est, folijs  
 paucis, semine caudæ scorpionis  
 effigie. Illita scorpionum  
 ictibus præsentat  
 neo est au-  
 xilio.

QVARTI LIBRI  
 FINIS.




PEDANII  
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

*Medicinali materia,*

*Liber V.*

IOANNE RVELLIO Sueßionensi  
interprete.



Superioribus quatuor libris, amicis-  
sime Aree, tradidimus de aromati-  
bus, oleis, vnguentis, & earundem  
lacrymis ac fructibus, itē animali-  
bus, melle, lacte, adipe, cerealibus,  
oleribus, necnon de omni radicum, herbarum, suc-  
corum, seminūque ratione. In hoc autem totius  
operis quinto differemus de vinis & metallicis, &  
vite nostram commentationem auspici.

Vitis vinifera.

CAP. I.

**F**olia vitium & triti capreoli, capitis dolo-  
res illius mitigant, & inflammationem sto-  
machi ardorēque, cum polenta: folia etiam per-  
se, ut quæ refrigerent & adstringant, imponi so-  
lent. Potus eorum succus dysentericis, sanguinem  
excreantibus, stomachicis, & grauidarum mala-  
cie medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua  
capreoli & poti. Lacryma vitium, quæ veluti gum-  
mi in caudicibus concrescit, ex vino pota calculos

C 3



pellit : illita lichenis & psoras leprâsque nitro prius perscriptus sanat : eadem cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet : maximeq; sanies, quam accensa sarmenta vitium viridia exudarunt : qua & peruncta verrucarum infor- micationes extrahuntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, detractus in sede condylomatis, & thymis, illitus ex aceto medetur : prodest luxa- tis & viperarum morsibus : contra lienis inflam- mationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto. Labrusca duorum generum est : alterius vua non maturescit, sed flore tenuis cenanthen nomina- tam perducit. Altera ad frugem pervenit, parvis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clavicula, quibus repunt, vim habent cultæ viti si- milem.

Vua.

CAP. II.

**V**va recentes aluum turbant, & stomachum inflant : innocentiores, quæ decerptæ diu pependere, (ideo quòd in eis copia humoris exicca- tur) vilisq; sunt stomacho, agrisq; atque cibi aviditatem excitant. In vinaceis & ollis servatæ, ori & stomacho gratæ sunt : aluum sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sanguinem excre- antibus conveniunt. Similesque, quæ in musto fue- re. Sapa aut passo conditæ, stomachum magis in- festant. At quæ solem prius passæ in aqua coale- sti conduntur, minus vinctæ sunt, siticulosi, ar- dentibus & longis febribus salubres. Reconditi  
vin



vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præ-  
 duris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysen-  
 tericos, celiacos, & feminas fluxione vuluæ labo-  
 rantes iuuat infusa: ad defeciones, ac fetus as-  
 sumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obti-  
 nent, stomacho vtilis sunt: inspargitur farina to-  
 storum, plentæ modo, dysentericis, & celiacis,  
 & solutus stomacho. Vua passa alba adstringen-  
 tior est: prodest esitata caro earum iussi, fauci-  
 bus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per  
 se cum nucleus: & decocta in patinis cum melle,  
 admissa milij ac hordei farina & ovo, valet ad  
 purgandum caput: eiusdemque gratia cum pipere  
 commanducatur. Testium inflammationes sedat,  
 illita cum lomento fabarum, aut cumini farina.  
 Faucos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis  
 putredines, & gangrenas, sine nucleis trita, &  
 cum ruta imposita sanat: podagræ conuenienter  
 cum panacis succo illinuntur: mobiles ungues illita,  
 celerius extrahit.

Oenanthe. CAP. III.

**O**Enanthe vocatur vitis sylvestris fructus,  
 cum floret. Recondi debet sicili non pica-  
 to, collectaque substrato lineo, in umbra siccatur.  
 Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice.  
 Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac cun-  
 de vrinæ vtilis: aluum sistit, ac sanguinis excrea-  
 tiones: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca  
 & illita efficax est: capitis doloribus tam viri-



dis, quàm sicca, ex aceto & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes agylopos, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat, pessus miscetur, ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardores, cum polline polenta & vino illinitur. Cinis cremata in testa, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: redunias & pterygia, abscedentes gingivas, cruentasq; cum melle sanat.

## Omphacium.

## CAP. IIII.

**O**mphacion, succus est acerbae ruae, nondum maturefcentis, è Thasia vite aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur, semperque quod cervicis vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: nocturne à subdialibus locis in lectum referre: quandoquidem nocturni rores ipsum concrecere non sinunt. Eligendum est flauium, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, ruam, ulcera oris, humida gingivarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione vulvæ laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, & erosionibus angulorum convenit.

Bib



Bibitur ad recentē sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & ac quatiore est vtendum: valde siquidem exurit.

Vini natura. CAP. V.

**V**Ino vetere nerui leduntur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est: quare ca uendum ijs, qui intestinae alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouū inflat, aegrè coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Aetate medium, utraque vitia fugit: quare ad victus sanorum aegrorumq; vsurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias inter utrunque vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distāt: siquidem dulce crassius partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, vt vultum, turbat: sed minus inebriat, renibus & vesicae aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & ceteras fluxiones colibet, minusq; urinam expellit. nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho aduersatur: sitim stimulat, ner-

C 5



uos infestat, alium aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod vis sole siccatis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramnion, aut protropion: & sapa, quæ sit misto igni decocto, Græci sirion aut hepsema appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsythia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc media, medias sortiuntur vires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota, & vomitionibus reddita: contra cicutas, meconium, pharicon, toxica & concretum ingrumos lac: item contra remum, ac vesicæ pruritus, rosiones, exulcerationesq;. Inflant tamen, & stomacho aduersantur. Prinatim, prodest melampsythium, si venter rheumatismum sentiat. Album, magis cæteris emollit aluum. Gypso conditum nervus officit, caput aggrauat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra venena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excalfaciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimica. Quæ verò aparachyta vocant, ut quæ admistam sapam recipiunt, caput implent: temulentiam gi-gnunt, ægrius in halitum expirant, stomachum malè habent. Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet, quod inueteratum perquam facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstringit, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque ijs, qui visus



visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros  
 minimè idoneum. Albana crassioribus constant  
 partibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem  
 emollium (sed concoctionem non æquè adiuuant,) &  
 nervosa minus infestant: vetustate, eadem  
 austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum  
 sit dulce, est & Albano crassius: corpus & co-  
 lorem alit: ægrè tamen coquitur. Surerninum,  
 valde austerum est: quare intestinorum & sto-  
 machi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, ca-  
 put minus tentat: inueteratum suavius redditur,  
 & stomacho utile. Adrianum & Mamertinum  
 in Sicilia æquè crasse partibus gignuntur: mo-  
 dicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, mi-  
 nusque, ob suam tenuitatem, nervos tentant. Pa-  
 rætypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odo-  
 ratum ac tenuius est: quare liberaliter epotum  
 fallit. diu seruat ebrietatem, & soporem adfert.  
 Istricum, Parætypiano simile est, sed urinam ve-  
 hementius pellit. Chium tamen antedictis mol-  
 lius, & aptum potui est: bene alit, & minus ine-  
 briat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis  
 utile. Lesbium facile membra subit, Chio leuius,  
 & alio idoneum. Ephesium eandem vim habet,  
 quod Phygælitæ nominatur: verum Asianum è  
 Tmolo monte, Mesogites appellatum, capitis do-  
 lores ciet, & nervos ledit. Coum verò & Cla-  
 zomenium, quoniam multam sibi maris aquam  
 vendicant, facile corrumpuntur: flatus movent,  
 alunt



aluum turbant, neruis officiunt. Vinum omne (ut  
 reliqua in commune dicantur) merum ac synce-  
 rum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in  
 membra distribuitur, stomachum adiuuat, appe-  
 tentiam ciborum inuitat, vires alit, ac robur au-  
 get: somnum conciliat, & commendat colorem. Po-  
 tum liberalius auxilio est contra assumptam ci-  
 cutam, coriandrum, pharicum, ixiam, meconium,  
 argenti spumam, taxum, aconita, fungosque: contra  
 serpentium morsus, & omnium ictus, quæ refri-  
 gerando necant, aut stomachum in vomitiones ef-  
 fundunt. Facit ad longas inflationes, rofionesque  
 præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutio-  
 nem, & si venter aut interanea rheumatismum  
 sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus cor-  
 pus immodico sudore digeritur, maximè alba, ve-  
 tusta, & odorata. Quæ tamen vetustate dulcescunt,  
 renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur:  
 vulneribus, inflammationibusque in succida lana  
 imponuntur: tetra vlcera, & phagedenica, &  
 fluxionibus obnoxia, cōmodè perfunduntur. Quæ  
 marinam non receperunt, austera & alba, ad sa-  
 norum victus vsurpantur. In his præstant Itali-  
 ca, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signi-  
 num, & permulta Campaniæ, & Paratypia-  
 num ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Ma-  
 mertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Les-  
 bium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò &  
 nigra, stomacho negotium exhibent, inflationem



pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tentant. In media etate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Non sitire, & modicè cibos proluui, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua: siquidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorque potus, acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè post aquæ potus, utilis: nãque modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alicuius gratia facta temulentia remedium adfert frigida. Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acriua, paulò ante maturitatẽ decerpta, triduo aut quatruiduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadus insolatur. Vinum adstringendi habet: prodest dissoluiis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malaciæ, & crudus: in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini metr



metretæ extractæ fuerint calcatis rinaceis, ex-  
 pressoq; decocto ad tertias partes, & additis in  
 singulos congios modi eius, qui remansit, binis sa-  
 lis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa.  
 Lora intra annum videndum: etenim celeriter exo-  
 lescit. Conuenit agris, quibus timemus noxam vi-  
 ni, coacti sæpe desiderijs eorum obtemperare: item  
 à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vi-  
 num, quod adynamon vocant, loræ vires habens,  
 hoc modo: Pares aquæ, & musti mensuræ co-  
 quuntur molli igne, donec absumatæ aqua: quod  
 ubi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur.  
 Aly marinæ, & cœlestis aquæ, mellis & musti  
 pares miscent portiones, decapulant, & quadra-  
 ginta diebus insolant: quo ad annum viuntur  
 ad omnia eadem. Vinum è syluestri riuâ nigrum  
 adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus,  
 & cæteris, quibus constrictione, & contractione  
 opus est.

Vinum melitites. CAP. VI.

**M**elitites datur in longis febribus, quæ sto-  
 machum infirmant: namq; aluum leuiter  
 emollit, urinam ciet, stomachum expurgat. Pro-  
 dest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo ca-  
 piti, & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem  
 est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è vi-  
 no veteri, austero, & melle exiguo. Melitites au-  
 tem adiecto ad quinque cōgios austeri musti, mel-  
 lis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quâ  
 magis



magis ad effervesendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumque effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

## Mulsu. CAP. VII.

**M**ulsu est vetere vino austeroque, & bono melle factum, praefertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum venit. Vetus corpus alit: media etate, alio prodest, urinam pellit: à summo cibo sumpsum nocet: & inter initia potum, implet dein appetendi aviditatem reuocat. Fit mulsu duabus vini metretis, admixta una mellis. Aliqui, quò celerius praeberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum mellis adijciunt: & ubi ferbuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

## Aqua mulsu. CAP. VIII.

**A**qua mulsu easdem quæ mulsu vires possidet. Cruda vitumur, cum moliri detectionem, aut vomitionem incitare volumus: ut is, qui venena hauserant, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illò dixere microsphyctos, tuissentibus, peripneumonicis, & is qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditiuumque, quod aliqui hydromeli propriè vocant, media etate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus, respondet, & similem vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamen  
usus



usus damnatur, inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibū fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit, duabus pluuie aquæ veteris ad vnā mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt, qui hydromeli appellant, quod à melle elutis aqua factus confici ac seruari soleat: sed meracius conferi conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

## Aqua.

## CAP. IX.

**D**E aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordiis commoratur: ad hæc, quæ & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aliū enim conturbat) pituitam expellit. Si verò calida ad fetus adhibeatur, elicit & discutit: neruorum vitij, & perniciis, ante vlcerum prodest. Miscetur cataplasmati ex hordeacea farina, & emplastris, & discuiantibus malagmati. Ad mouendas deiectiones tepescit infunditur, & ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lentes, & mammas rigentes



tes, foueri vtile est: liuores solu discutit: ad venenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpiorum, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. Et malo habitu confectis iam diu corporibus, nervisque, balnea ex ea vtilis: hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquae mistione reposita, virus deponit. Sunt qui etiam praecoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem, dant gallinae aut piscium inscula, ad domandam morsus acrimoniam.

## Thalassomeli.

## CAP. X.

**Q**uod thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Temperatur autem aquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, & picato vase per Canis aestus insolatur. Alij ad binas marine coctae singulis mellis adijciunt, & vase condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

## Acetum.

## CAP. XI.

**A**cetum refrigerat, & adstringit: stomacho vtile, & appetentiam excitat: erumpentem vndeunque sanguinem, potu in se sursum sistit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis vulneribus inditur & inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum: reprimit

D



procidentia sedis, vulu. eq; item abscedentes gingi-  
uas, & sanguine manantes. Ad nomus, & ignem  
sacrum, ulcera quæ serpunt, lepras, impetigines,  
pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. phas-  
gedenas ulcerum, nomasque fotu continuo cohi-  
bet: podagricis calido fotu, cū sulphure auxiliatur.  
sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capi-  
tis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut  
spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, gra-  
uitatem aurium, & sonitus, sibilosque feruentis va-  
por proficit: instillatum quoque aurium vermes  
necat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta ace-  
to spongia admoueatur, & pruritus permulcet.  
Contra venenatos serpentium ictus, qui refrige-  
rando nocent, calidum commodè fouetur: & frigi-  
dum, is, quæ exurens virus eiaculantur. Calidum  
potum, atque vomitionibus redditum, aduersus  
omnia venena efficax est, præsertim contra meco-  
nium, & haustam ciciniam, conglobatum in ven-  
tre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, ta-  
xiūq; cum sale. Haustu voratas hirudines, si sor-  
beatur, eicit: tussim veterem mitigat, & recen-  
tem laceffit. In orthopncea calidum commodè sor-  
betur, gutturus fluxiones gargariatum inhibet,  
anginis & vnae procidenti conuenit: contra den-  
tium dolorem, calidum colluitur.

Acetum mulsum. CAP. XII.

**A**cetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc  
modo temperatur: Aceti heminae quinque,  
salus



salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies effervescente cortina. atque ubi refrigerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo confectatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ, quam sepa vocant, haustum meconium, ixiâmve, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. CAP. XIII.

**A**cida muria, quam Græci oxalmen vocant, contra nomas fitu, putrida ulcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus inijciatur, & prociuiam sedem reprimat: dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat: furfures & manantia capitis ulcera exterget.

Thymoxalme. CAP. XIII.

**T**hymoxalme veteres viebamus, dabantque laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrôsq; trahit. Hoc modo faciliatur: Thymi trii acetabulum, salis idem modus, ruta, pulegi, polenta, singulorum exigue portiones in vas coniunguntur, aquæ terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.



## Scillinum acetum. CAP. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit : Scilla , quæ candida fuerit , expurgata conciditur , traieciturque lino segmenta modicis intervallis , ne se contingant , siccantur in umbra quadraginta diebus : minima eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur , & vase diligenter operto septenus diebus in sole madescit : post eum numerum dierum scilla eximitur , & expressa abicitur : defecatum acetum transfunditur , & reponitur . Aliqui scillaminam , quinque aceti sextarijs miscent . Alij citra exiccationem repurgantes , parem mensuram adijciunt , & senis mensibus macerari patiuntur . Id multò magis humorum lentitias digerit : gignas humore prægnantes collutione stringit : firmatque , & motos dentes stabilis : putredines oris , & graues halitus tollit : durat fauces sorbitione , & callosas facit : vocem expedit , & limpidam canoramque reddit . Datur stomachicis , ægrè cibum concoquentibus , melancholicis , comitialibus , vertiginosis , mente capitis : item vuluarum strangulationibus , lienis incremento laborantibus , ischiadicisque . Imbecillos admodum recreat : corpus sanum reddit , & bonum colorem præstat : oculorum aciem exacuit : tarditatem quoque aurium infusione purgat . In summa , ad omnia efficax . Cauendum tamen intestinis exulcerationibus , in capitis dolore , aut nervorum vitijs . Datur quotidie ieiunis sorbendum , inter initia exiguum , paulatim ad au-



adaugendo, ad cyathum vsque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. CAP. XVI.

**S**cillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vt dictum est, scillam, & sole siccata[m] contundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in videnos sextarios musti recentis ac boni demergito: vbi trimestri spatio maderit, elutriatum vinum, obstructio diligenter vase, recondito. Licet quoque sic humida scilla vti: In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & valde inueterascere. Alia parandi ratio: Scilla dissecta & repurgata tres minas, in Italicam metretam musti demittito, & senos menses in vase obstructo macerari finito: post id tempus defecatum & excolatum vinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item ijs, qui reuomunt cibum, & si pituita in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aque inter cutem, regio morbo, difficili urinae, torminosis, inflationibus, resolutioni nervorum, horroribus longis, vertiginosis, & vulsis. Menses pellit, minimeque nervos infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Marina vina. CAP. XVII.

**M**arina varie faciliuntur: Aliqui enim statim quum decerpta sunt ruæ, aquam



maris admiscant. Alij in area rurs sole siccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius rurs in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Que tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modò meliora non adsint: aluum subducunt: profunt purulenta extuscentibus, aut si dura aluus exerceat. Que ex Aminaeis rurs sunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatu creat. Verum quò plenior habeatur historia, ys, qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quòd frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quedam ex ys facilia, minoris curæ ac impendij, que cadunt in vsus: uti que ex cotoneis malis, pyris, siliquis, item myrtibaccis componuntur.

Cydonites. CAP. XVIII.

**C**Ydonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pōdo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defecatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, densi succi cotoneorum tusorum pressorumque adijcere, & ita recodere. Vinum hoc adstringit prodest stomacho, dysenteria,



ria, hepaticu, renum vitis, & vrina difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in quibus plurimum mellis, quo penitus demersa contegatur, conijciuntur: ad post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem, quæ superior compositio.

## Hydromelum. CAP. XIX.

**F**it hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub Canicula sydus insolatæ, additis ad unam mel-melitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

## Omphacomelites. CAP. XX.

**O**mphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerba rux adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes mellis optimi destumati singulæ partes adijciuntur, & insolatur in vasa transfusum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet: stomachicus cæliacisquæ conuenit. Vsus post annum est.

## Apiites. CAP. XXI.

**F**it & è pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apiites nomine sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mellilibus, sorbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbata sunt, & adstringunt stomacho vitia sunt, atque intestinas fluxiones cohibent.

## Oenanthinum. CAP. XXII.

**F**it è feraci vite syluestri, quod vocatur oenanthinum: Sicci flores minus duabus musti ca-



do macerati: post triginta dies mutantur, mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, coliacos, & dysentericos.

Rhoetes. CAP. XXIII.

**F**it è punicis malis maturis quod rhoeten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluvio exortam: stomacho vile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites. CAP. XXIIII.

**R**hodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumque minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum vinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febris carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidus aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli vocant, quod arteriæ scabritus conuenit.

Myrtites. CAP. XXV.

**M**Yrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem exceßerint, tussis, & organo expressis. Alii qui ad tertias coquunt. Alii baccas prius sole torrent, & quaternis sextariis contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt, & vini veteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-

re



re adstringit. stomacho utile, fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites.

CAP. XXVI.

**M**Yrsinites sic temperatur: Rami nigrae myrti cum suis bacis & folijs tusi, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo super sint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

CAP. XXVII.

**L**entiscinum similiter vt myrsinites temperatur: nec secus terebinthinum. Nanque baciferi eorū rami sumi debent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicae, & stomachi, & sanguinis profluvio: ulcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vulvae ac sedis in seissione cohibent.

Palmeum vinum.

CAP. XXVIII.

**P**almulas maturas, quas vocant chydeas, in vrceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquae congijs infundito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congijs infudisse satius est: post de

D 5



cem dies detracto ab ariditate linteis assumito vini crassum & dulce, & reposito. Suave illud quidem, sed capiti noxium contra fluxiones, propter adstrictionem vim, eff. cax: stomachicis, coeliacis-sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sexto, & ultio faciunt: quod tandem acore vitatur.

Catorchites.

CAP. XXIX.

**C**atorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypri pro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem humoris adijciunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricæ, quæ chelidoniæ aut phaniceæ appellantur, præsertim nigra, macerantur, ut diximus, & post decem dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aquæ, in qua vinacea maduerint, infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acore contrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est: flatu gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit: aluo tamen prodest, urinam ciet, menses trahit, lactus ubertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio, quam Zythion appellamus. Aliqui sex amphoræ, decem salis sextarios adijciunt. Alij muriæ amphoræ: quod non facile vitatur, & aluo idoneum fore censerent. Alij thymum & fenniculum imo subijciunt, & caricæ superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & sycomoræ eodem modo vinum, sed in acetum acre deg



degenerat: quoniam non ita praeualet vis eorum,  
ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum vinum. CAP. XXX.

**R**esinatum vinum populatim facilius solet:  
copiosum in Galatia: quoniam vinum illic  
coacescat, vna non maturescit, ob calis algorem,  
nisi picea resina temperetur. Resina autem cum  
cortice tunditur, & amphora dimidiata hemina  
permiscetur. Aliqui, ubi efferbuit, excolant, sepa-  
rantes resinam: alij relinquunt. Hæc vna vetustate  
dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & vertigi-  
nes faciunt: concoctionem tamen adiuvant. & vri-  
nam ciem: tussientibus, ac desillatione vexatis cõ-  
ueniunt: item cæliacis, dysentericis, & hydropicis,  
& scæminis fluxione vuluæ laborantibus: aliis ex-  
ulcerationibus infunditur. In hoc autem genere  
nigricans magis albo constringit.

Strobilites. CAP. XXXI.

**S**trobilites sit maceratis in musto nucibus pi-  
neis, recentibus, fractisq; præbetq; resinati ef-  
fectus. Si quis madefactas nuces pini musto deco-  
quat: potum assatum conuenit ijs, qui tabitudine  
conficiuntur.

Cedrinum vinum. CAP. XXXII.

**C**edrinum, iuniperinum, cupressinum, lauri-  
num, pineum, aut abiegnum, simili ratione  
sunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum edunt,  
aut soli, aut balneo, aut igni, adnouere oportet,  
ut confudent, congioq; vini minam vnã permi-  
sce



scere, & post duos menses transfundere, & antequam recondantur, insolare. Facilitiorum vinorum vasa impleri debent: namque non plenissimis, vina in acorem corrumpantur. Medicata autem vina, rectè valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt, urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoque è fructu cedri maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibri: diebus quadraginta insolari debet, & defecatum in vasa transferri.

Fit etiam vinum è baccis iuniperi, non aliter quàm cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussis antiquæ utile sine febre, pectoris laterumque doloribus, torminibus ventris, & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus vuluæ causarijs, hydropicisq;: facit aduersus ventris tineas & horrores: contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. CAP. XXXIII.

**P**icatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primò marina aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda: congys octo musti, vncia picis vna aut altera adijcitur: ubi efferbuerit, & constiterit, in vasa diffundit



ditur. Hoc genus vini exalfacit, concoquit, purgat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis & vultus, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus,ussi, suspensibus, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, praesertim in succida lana impositum.

## Absynthites. CAP. XXXIIII.

**A**bsynthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italicarum amphorarum, admistam absynthij Ponticilibrā decoquunt ad tertias: & ubi infuderint sex aceti sextarios, & absynthij selibrā, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dumque conqueuerit, defecant. Alij absynthij minam in amphoram demittunt, tusamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij absynthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacae, cinnamomi, cassiae, floris iunci odorati, calami, elatae, palmarum singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis, ternisve mensibus dimitunt: postea defecatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti cadum, Celticae nardi drachmas quatuordecim, & absynthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas: & post quadragesimum diem elutriant. Alij in senos sextarios musti, absynthij libram, & siccae pini resinae sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stomacho:



cho: urinam cit: tardam concoctionem accelerat hepaticis, regio morbo, & renū vitij auxiliatur. fastidia discutit: ys prodest, quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam praecordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; ventineas, & remoratos menses: contra hausta iuxta venena quā plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites.

CAP. XXXV.

**H**YSSOPITES ē Cilicio hyssopo maximè laudatur, sitq; similiter, foliorum hyssopi tusorū libra in amphoram musti coniecta, linteolorum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, ut deglutatus pondus scalo fasciculus fidat: vinum post quadraginta dies defecatum elutriatur. Contra peccoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim & suspiria prodest: urinam cit, torminibus, & laboribus febrim circuitu repetentibus auxiliatur menses mouet.

Ex diuersis plantis facta.

CAP. XXXVI.

**S**IMILI modo chamædrites fieri solet. Excalfacit, discutit: convulsis, regio morbo, vultu inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aqua inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stæchadites non secus temperatur. Congijs sex, stæchadis minam addere oportet. Crasitiem, inflationes laterū, nervorumq; cruciatus & perfrictiones discutit: comitialibus commodanda.



datur, cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem  
acetum è stachade herba, vi paulò antè diximus,  
aceto macerata, quod eosdem implet effectus. Fit  
vinum è betonica, quam cēiron psychotrophon ap  
pellūt. Herbam semine maturo pregnantem, cum  
suis ramulis minæ pondo, congijs duobus vini  
macerant, & post septimum mensem transfun  
dunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutere  
ipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, factitia  
vina, sibi misturarum vires adsciscunt: quare non  
difficile fuerit ijs, qui illarum naturas norint, vi  
norum vires coniectura quadam consequi: verum  
tamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus.  
Fit etiamnum è betonica acetum, ad eadem vi  
tia vtile. Tragoriganites fit quaternis trago  
rigani drachmis lineolo colligatis, in quaternos  
musti sextarios coniectis, & post tertium mensem  
transfusus. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, la  
erum doloribus, spirituum discursationi, aegris  
concoctionibus. Enapis fit vinum, nomine buni  
es, drachmis duabus tusi napi in sextarios duos  
musti additis, & ceteru eodem modo factis. Pro  
dest stomachicus, & dimicatione, aut longo equi  
atu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor ma  
cerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus  
stomachi fastidia: menses, & purgamentum à  
artu subducit. Marrubij adulti folia tundi  
in sextarios octo in musti metretam demit  
to, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc  
vinum



vinum pectoris vitij, & omnibus, quibus marrubium. Thymi tusi & cribrati uncias cetum linteum colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet contra agras coctiones, fastidia, dysenteriam, nervorum & precordiorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo est salutare vinum fit, quod eadem quae thymites praestat. Sic quoque organites ex heracleotico origano conficitur cum supradicto. Facit eadem quae thymites. E calamintha, pulegio, & abrotono vina fiunt eodem quo thymites modo, prosunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quod urinam moveant. Fit item est conyzæ vinum, contra venenata ante alia efficax.

## Aromatites.

## CAP. XXXVII.

**A**romatites ita fit: Palmae, aspalathi, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingentibus effis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quadraginta diebus quiescere finito: deinde ubi faece expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami uncia, plu drachmae septem, costi drachmae duae, nardi Syriacae drachmae sex, cassiae uncia, croci drachmae quatuor, amomi drachmae quinque, asari drachmae quatuor: omnia simul trita & linteum colligata in cadum musti demerguntur, & postquam vinum deferbuerit, transfunditur.

Fac



Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrina, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs, qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituitæ crassitiem extenuat: colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & vesicæ vitijs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

## CAP. XXXVIII.

**F**it & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit: Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma una, iridis drachmæ sex, anisi drachmæ tres: omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex vini sextarios coniiciuntur: vinum post triduum colatur, & in lagenâ reconditur. Datur post deambulationem, meraculum, cyathi vnius mensura. Fit quoque neclarites ex helenio herba: Radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: vrinam pellit. E Syriacâ nardo, & Celtica, malabathroq; vinum facitatur, hac ratione: Singulorum selibram in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinæ difficultatem: prodest stomachicis, atque ijs quos palor decolorat. Aly vnciam, aut sextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem, in musti ampho-

E



ram adijciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus urinam ciet: hydropicus, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radix syluestris nardi recentis & trita cribrataq; bessem, in congiuum musti conijcito, duos menses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinae, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta.

CAP. XXXIX.

**R**adix dauci contusa drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, praecordiorum, & vuluamenses pellit, ructus ciet, & urinam: prodest tussi, ruptis, vulsisq;. Salvia vnciam in musti amphoram, quod idem cum cerasmio est, mittito. Valet contra renum, vesicae, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti congiuum mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthopnoea: lenis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aquae inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Viana ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, &

urinae



urinam mouent. Seminis apyrecentis, maturi &  
 cribrati uncia nouem in linteo colligata in mu-  
 sti amphoram demittantur. Appetitum excitat:  
 stomachicus, & difficili urinae auxiliatur: faci-  
 les spiritus facit. Ex feniculo, anetho, & pe-  
 troselino, uina eodem modo sunt, & ad eadem ef-  
 ficacia. Fit & è flore salis uinum, multò ad pur-  
 gandum efficacius, quàm uinum aqua mari-  
 na temperatum. Fauces, vesicam, renes, & sto-  
 machum infestat: quare neque in secunda, neque  
 aduersa uale tudine prodest. Fit etiam uinum  
 quod phlogiston vocant, quoniam partus necat,  
 & abortus facit: veratro, aut scammonia, aut  
 syluestri cucumere, iuxta radices vitium salo: si-  
 quidem uites sibi illorum vires adsciscunt. Id vi-  
 num partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ  
 antè vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilu-  
 tum. Ramorum thymelææ cum suis folijs & fructu  
 triginta drachmas mittito in congios tres musti,  
 & leui igne coquito, donec congi duo supersint,  
 defecatumque recondito. Aquosa purgat excre-  
 menta, & lienem absunit. Chamæleæ dum flo-  
 ret, cum folijs tusa & cribrata decem drachmarum  
 pondere, in musti congium additur. Post duos men-  
 ses uinum in vas transfertur. Aquæ inter cutem,  
 hepaticæ, & lassitudine confectæ, efficax est:  
 item mulieribus, quæ à partu egre purgantur.

Chamæpitimum simili modo fit, ad eadem  
 conueniens: urinam quoque ciet. Librum radicis



mandragoræ concidito, segmenta lino trañcito,  
 quod selibram æquat in musti cadum demittito,  
 ibiq; esse finito ad mensetres, deinde transfundi-  
 to. Media potio, hemina dimidium: bibitur, passio  
 in duplum addito. Aiunt heminam vini congio  
 mistam, potu soporem adferre: cyathus unus cum  
 sextario vini potus, enecat: mediocris vsus eius,  
 doloris sensum aufert: fluxiones incrassat: olfactu,  
 potuque, & cum inditur, idem præstat. In com-  
 gium musti aqua marina diluti, drachmas duode-  
 cim nigri veratri triti in linteo mundo, mittito:  
 dumq; efferbuerit, in marinæ aquæ congios qua-  
 tuordecim aut quindecim, ubi pleniusculè fregeris,  
 inijcito: post aliquot dies colato, & vitior. Dato  
 cyathum unum ex aqua balnei in potu, ad aluum  
 soluendam, ijs qui euomuerunt à cœna. Alia ratio:  
 Veratri drachmas viginti, iunci odorati uncias  
 duodecim, spicæ Syriacæ uncias tredecim, cri-  
 bratas, & linteo colligatas in septem vini Coi  
 sextarios diebus quadraginta macerandas indi-  
 to, postmodum colato: dabis in potu sesquihemi-  
 nam. Aliter: Decoctæ marinæ aquæ ex alto pe-  
 titæ sextarios duodecim, veratri candidi libras  
 sex, in musti amphora quadagesimo die, quàm  
 madefeceris, colato, & vitior. Alia ratio: Vera-  
 tri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas,  
 in senis musti sextarijs diebus quinsidenis mace-  
 rato, mox colato & semestri exacto, vitior. Id vi-  
 ni genus abortus facit, & partus necat. Aut vnus  
 in



in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in vinum mittito pondo drachmarum viginti, & biduo residere finito, conijcito veratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos & trientem, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis heminas tres aut duas dilutus. Purgat à partu, & abortu feminas: fœtus extrahit, contra strangulatus vuluæ efficax. Scammonites sic fit: Radicis scammonia per menses effossæ, tritæ, & linteo colligatæ drachmas quinque in musti congiuum mittito, ad dies triginta. Alium purgat, bilem & pituitam extrahit.

Metallica omnia, & primùm Cadmia.

## CAP. XL.

**E**X cadmia generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans, racemosi facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, onychitæ lapidis similis, cuiusmodi sunt, quæ è veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est, crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi xonis cincta, ob quod eam xonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet,



terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamenti botrytis nomine, & onychiatis, viiles: reliquæ ad emplastra, & farinas, quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exicare, corporis meatus insarcire, excrescentia in carne coërcere, crustas creare, & vlcera, quæ cacoethe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex are in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus camerisque fornacum inhxerente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, præ summa fastigia conuexæ & concameratæ, ut quæ ab are iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in corpus concrescunt, & modò genus vnum eius, modò duo, modò omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato lapide, cui pyritæ cognomen est: in quo etiam monte quadam quasi venæ chalcitis, misyos, soeos, melanteria, cœrulei, chrysocolle, atramenti sutory, diphrygisq; inueniuntur. Nec defunt, qui cadmiam in lapidum fodinis inuenirò tradant, falsi quadam lapidum cognatione: qualis inuenitur & apud Cumis lapis, nullam suam ostendens. Li eo deprehenduntur, quòd sunt cadmia leuiore, nullumque alienum mandentibus sap



saporem exhibent : commanducatus item lapis, dentes offendit : cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, profilit, & fumum igni similem eiaculatur: cadmia verò quiescens manet, fuliginemque luteo colore aut areo splendentem expuit, vario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior muliò fiet: sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed viribus nequaquam comparanda ærariæ. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet: mox extinguatur vino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur: sed quæ ad psorarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in vino, rursumque sicili crudo torrent, donec pumicosa videatur: iterumque tritam ex vino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens: hac spodij vice vtuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

CAP. XLI.

**P**ompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodios nigricat, & ple-

E 4



runque ponderosior est, palearum pilorumque plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab arariarum officinarum pavimentis & fornacibus eueritur: pompholyx verò pinguis est, & candida, usque adeò levis, ut in auris euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera: vnum ad aëris colorem vergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamque leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiundo aere, fabri praestantiores facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insparserint. Nanque tenuissima fauilla, quae effertur, in pompholygen coit. Ceterum pompholyx non ex aeris modò materia, & fabril industria facitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximiè follibus proflata. Cuius faciunda ratio hæc est: In domo gemina contignatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis narem: ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuque artificis fabricatum: domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde carbombus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis: idem negotium obit infernè artificis minister, simulq; carbones adicit, usque dum indita cadmiae copia prorsus absumatur. Itaque egesta  
sufficit



suffitu tenuis pars, & leuis materia in summam  
domum euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; ad-  
haerefcit: conflatum autem inde corpus, inter ini-  
tia erumpentibus, aquarum bullis simile prodit,  
postea maius incrementum capessens, glomuscu-  
lis vellerum simile redditur. Ponderosius autem in  
ima loca se recipit: sed hoc fornacibus effunditur,  
illud domus pauimento coheret. Quod tenuiore  
deterius existimandum est, ideo quod multum ter-  
rae collegerit, & spurcicia in aceruatione refertia-  
tur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbi-  
trantur, de qua ante dictum est. Optima creditur  
Cypria, quae accepto aceto halitum aeris praestat,  
colore aliquantum piceo, sapore caeni horrido: &  
si fraudem non experta, flagrantis carbone infer-  
nescit, aereum colorem contrahit. Auedicis  
autem notis diligenter attendendum est. Siqui-  
dem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouil-  
lo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, &  
quibusdam consimilibus. quod facile cognitu fue-  
rit, quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum  
quae ante dicta sunt. Pompholygem in commune  
ita lauari oportet: Ligatam linteo mudo modiceq;  
raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum  
demitto, quod imbrem contineat, & huc atque  
illuc fasciculū deferens, immergito: ita enim limo-  
sa pars eius ac utilis, effluet, & omne sedimentū  
in linteolo remanebit. Postea residere sinens, aquā  
cum cinere colis incernito, & nouam infundens,



agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenâ nihil sidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imutetur: deinde luteo fancibus excepturi vas obtento, aut laxius illigato, colant, & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumosum, quod traiectum est, & supernatat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad vsus recondunt. Quod verò resedit, sensim cribratum, in aliud vas transfundunt, relicto arenoso, quod pessum ierat: rursus lapidosa sidere patimur, & in vas aliud excolant: hoc idem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrari arenas lapillosq; suo pondusculo degrauiatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, vt cadmiam, eluunt. Quinetiam lauat<sup>r</sup>ur vino Chio marina aqua diluto, modis, quos supra diximus: & ita redditur adstringēti<sup>or</sup>, quàm aqua elota. Vis pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. Quod si spodium torrere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, subiectis leuibus



bus prunus, orbiculos continuo versabis, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodium: verum post Cyprium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam spodium saepenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili virtute polleant, ut in spodii locum suffici possint, antispodia vocant, quoq; modo summi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus, & baccis immaturis, in fictile cruculum coniecta, indito operculo continua foramina habente, vruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur: iterum in fictile aliud cruculum transferuntur, quod ubi perassatum fuerit, exempla lauantur ad vsus. Idem quoque fit è termitè sylvestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ananthe, aut mollibus rubi folijs, vel è buxi coma, vel pseudocypero cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alij taurinum gluten: alij succidas lanæ asperas, pice aut melle irrigatas: quæ omnia in spodii vicem vsurpantur.

Aes vstum.

CAP. XLII.

**A**Es vstum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imitetur: nigrum verò plusquam deceat exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis:  
sub



subperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec siglinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrunt. Alij sulphure solo vtuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos vrunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excrecentia in carne consumit, nomas colubet, vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delictum, illitumve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercusve quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eadem vim, sed imbecilliores, habet.

Flos æris.

CAP. XLIII.

**F**los æris, quem nonnulli clauorum veterum psegma, quasi resegmen aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & numero, brevis, ponderosus, modicè splendens, atque cōstringens, qui delimitam æris scobem non recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id faciliè deprehenditur, cum dentium illius

su



dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs forma-  
 ribus fusum, in receptacula delabitur, per cola fi-  
 tularum ad ea pertinetium: tum huic negotio ad-  
 dicti ministri, sordes expurgantes, aquam claris-  
 simam infundunt, refrigerandi proposito: itaque  
 repente concretu, ac addensatione, velut expui-  
 ur, & erumpit antedictus flos. Adstringit & ex-  
 rescentia coerces: offusam oculis caliginem emen-  
 lat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorum  
 pondere datus, crassum humorem extrahit: carno-  
 sarium & sedis vitia absomit: eruptiones papu-  
 arum cum vino cohibet. Candidus contra diutur-  
 nas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam  
 latu impellitur: vuam, tonsillasq; reprimis, fari-  
 na eius cum melle adnota.

Squamma æris. CAP. XLIIII.

Squamma æris excussa ex Cypris officina-  
 rum clauis, crassa quidem ipsa præstantior,  
 quæ helitis, id est clauaris, nominatur. sed ex vi-  
 ti promiscuoque ære, aut cædido, vitiosa intelli-  
 gitur: quam utpote tenuem, & inualidam damna-  
 nus, maxime approbantes crassam, rufam, præ-  
 fertim si aceti respersa æruginem contrahat. Vim  
 habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem,  
 & erodentem: nomas coerces, vlcera ad cicatricem  
 perducit: pota ex aqua mulsa, aquam trahit.  
 Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Addi-  
 tur ad oculorum medicamenta, quod genarum sca-  
 bricitiam absomit, & fluxiones exiccat. Lauatur  
 hoc



hoc modo : Sicce æris squammæ expurgatæ feli-  
bra, cum nitida aqua in mortario manu diligen-  
ter conturbatur, quousque pessum ierit : abicitur  
quod subsidit, & effusa aqua, hemina cœlestis im-  
bris adicitur, & distenta manu, squamma quasi  
destrigenda sit, vehementer confricatur: dùmque  
lentorem emittere cœperit, aqua sensim ad sex he-  
minas vsque superinfunditur, terendo validè: squa-  
ma ad latus mortarij colligitur, ibique appri-  
mitur: quo factò, expressus humor pyxide ex ære  
rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos  
squammæ, valens viribus, & ad ocularia medica-  
menta cum primis efficax. Inutile imbecillumq;  
quod superest, lauatur donec nullam prorsus len-  
titiâ excernat, & linteo apertum biduo con-  
quiescere sinitur, effusâque extante aqua, ubi sic-  
catum erit, reconditur pyxidicula. Alij vi cadmiâ  
lauant, & reponunt. Squammæ ex acie aut mu-  
crombus decussæ, quam vocant stomoma, eadem  
vis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad mo-  
liendam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis. CAP. XLV.

**A**erugo rafa fit his modis: In cadum, aut  
aliud consimile vis aceti quàm acerrimum  
infunditur: superponitur inde inuersum æneum  
vas, præsertim concameratum: sin minus, pla-  
num: sitq; obstructum, nullumque habeat spiramē-  
tum: exempto, quo doliolum obturaueris, opercu-  
lo, decimum post diem insidens ærugo deraditur.

Aut



Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspensa  
 litur, ne ipsum attingat, & totidem post dies ras-  
 litur. Aut massula æris, aut lamina una pluresve,  
 cinaceis non recentibus, sed iam acescentibus cō-  
 luntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex  
 lelimata æris scobe æruginem facere licet, necnon  
 laminis, quibus bractæ auri conclusæ malleo du-  
 untur: si quis eas aceto respargat, & ter aut  
 quater verset, donec æruginem contrahant. Tra-  
 hunt æruginem in Cypris metallis gigni, lapidi-  
 bus quibusdam nonnullis æris habentibus, quibus  
 erugo efflorescit: adduntque per Caniculæ æstus è  
 quodam specu manare: sed illam paucam & opti-  
 nam esse: hanc speluncæ effluentem, copiosam  
 quidē, & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides  
 multos collegerit. Pluribus autē modis adulterant:  
 aliqui punice admixto, alij marmore, alij atra-  
 mento sutorio. Sed deprehendemus punicem aut  
 marmor, dum pollice sinistræ manus madefacto,  
 eruginis portiunculam altero atterimus: siquidem  
 eam diffundi constat: marmoris autem punicisq;  
 partes cōeunt non dissipatæ, demumque tractatio-  
 ne crebra & humoris cōplexu dealbescunt. Quin  
 & denium appressu, si quidem syncera cedit,  
 æris, & sine asperitate. Atramentum verò suto-  
 rium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamē-  
 na, adulterata ærugine illinatur, & ferventi ci-  
 nere aut carbonibus incalescat alterutrum, mu-  
 tabitur, rubescetq; id, quod atramentum sutorium  
 acceperis



acceperit: quod id vstum suapte natura talem  
 sortitur colorem. Aeruginis, quam vocant scole-  
 ciam, duo sunt genera: quædam fossilis est, altera  
 factitia ad hunc modum: In mortario Cyprj æris  
 dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cu-  
 preo conterito, donec strigmenti crassitudinem  
 imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam  
 unam, cum salis fossilis, translucentis, aut marini  
 quàm albißimi, solidiq; aut certè cum nitri par  
 pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sy-  
 dus Caniculæ, donec colorem æruginis contrahat,  
 & cōcretum strigmentosum fiat: ubi autem se in ver-  
 miculorum Rhodiæ similium speciem coegerit,  
 recondito. Efficax & valde boni coloris redditur,  
 si duas partes urinae veteris cum una aceti adie-  
 ceris, & alia, quæ dicta sunt, perageris. Sunt qui  
 æruginem rasilem, quæ in apparatu non respon-  
 dit, gummi misto digerant in formas, & ita ven-  
 dant: quod genus, ut vitiosum, improbaturi. Fit  
 & quædam ærugo ab aurificibus, mortario &  
 pistillo Cyprj æris, cum urina pueris impubis,  
 qua aurum ferruminant. Antedicta æruginum ge-  
 nera, vsto æri omnino respondent, sed magis effe-  
 ctu valent. Sciendum fossilis scoleciæ præstan-  
 tissimam esse: derasam sequi: postremo loco facti-  
 tiam. Mordacissima tamen est hæc, & magis  
 adstringens. Aurificum autem ærugo rase respon-  
 det. Aerugines omnes adstringunt, extenuant,  
 excoalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, lac-  
 crym



crimas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. Vlcera ex oleo cerâque ad cicatricem perducunt: callos & sordida vlcera purgât, cum melle cocta: callum fistularum erodunt, cum ammoniaco, collyry modo in eas adacta. Ad gingivarum autem excrescentias, & extuberationem utiles. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illita: verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina excepta, cum ære & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quancunque velis, minutissime fracta comminuatque, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturque donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad vsum. Sunt qui cruda olla eam vrant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. CAP. XLVI.

**R**ubigo ferri restringit: sistit facinarum profluvia, admota, potiusque præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia: condylomatis prodest, gingivas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquaue, in qua candens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoriam vocant, eadē potest que rubigo, sed inefficax.

F



cus. Aconito, ex acetomulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum. CAP. XLVII.

**L**otura plumbi sic fit: In mortariū plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: limteolo deinde colato, aquam superfundens, quò facilius quicquid est resolutum incerni possit. Hoc iterum facito, usquedum satis tibi habuisse videatur. Vbi confederit, priore aqua effusa, nouam adiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quassitam, mortario pistilloque lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam tritum vehementer, cerussa simile redditur. Alij elimata scobi modicā plumbaginem adiciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrescentia. Sanguinem supprimit: predest contra sedis ulcera, condylomata, & hemorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quæ ægrè cicatricem ducunt: & in totum spody effectus præbet, nisi quòd non obducit crustas. Syncerum plumbum affricctu, marini scorpionis draconisque plagis auxiliatur.

Plumbum vstū. CAP. XLVIII.

**V**stur plumbum sic: Super quàm tenuissimas



mas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur  
 inspargito, additisque alijs rursus laminis, interie-  
 cto semper sulphure, usque dum vas expleueris, suc-  
 cendito flammæ autem plumbo, ferrea rude ver-  
 sato, donec perfectè redigatur in cinerem, nihilque  
 è plumbo non vstum hæserit: tum demum, ob-  
 structis naribus, eximio: alioquin halitus plum-  
 bi noxius sentitur. Aut climatam plumbi scobem  
 in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili cru-  
 do, vt dictum est, imponunt fornaci, aut foco, &  
 circumlinentes operculum, dato exili spiramento,  
 vrunt. Alij pro sulphure cerussam aut hordeum  
 inspargunt. Alij integras laminas imponentes,  
 acri igne vtuntur, & rudicula ferrea continuè mo-  
 uent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis hu-  
 iusmodi vstio: & si vehementius vratur, contra-  
 hit spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis  
 placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum la-  
 uatur vt cadmia, & reconditur. Eisdem effectus  
 habet, quos plumbum elotum, sed multò acriores.  
 Recrementum plumbi, quod scoriam vocant, opti-  
 mum est, densum, fractu conumax, cerussam pla-  
 nè representans, nihil plumbo si habens, quod ad  
 luteum calorem accedit, & vitri splendorem imi-  
 tatur. Eadem, quæ plumbum exustum, potest,  
 sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infu-  
 sa aqua, & refusa summa aque parte, quæ lu-  
 teum colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-  
 tum absumatur. Dein vbi confederit crassamen-



tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondens recremento vim habet, & eodem modo lauatur.

## Stibium.

## CAP. XLIX.

**S**timmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitidularum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod sibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrecentia in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare. Si sit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & ut in uniuersum dicatur, vis vsq; plumbo similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumque restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deslagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum sit. Lauatur, ut cadmia & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

## Molybdæna, seu plumbago. CAP. L.

**M**olybdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Virtiosa



tiola est, quæ aerem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quadam fossilis, ad Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur luaturque eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

## Argenti recrementum. CAP. LI.

**R**ecrementum argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdænæ vim habet: quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, utpote cum adstringat, extrahatq;.

## Spuma argenti. CAP. LII.

**S**puma argenti quadam gignitur ex arena, quam molybdein vocant, in fornacibus conflata, donec perfectè igni incandescat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda, Hispaniensis: hæc sequitur quæ sit Dicaarchia, id est Puteolus, Baijs, in Campania, & Sicilia: plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyris: quæ ex argen-



to, calabritus. Vis autem adstringere, mollire, explorere caua, excrescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Virtur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem inglandium, pruna superpositis: ita accensa follibus, ut conflagret: abstergitur insidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut vino restinguentes, rursus vrunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur ut cadmia. Ut argyritidi nominatae, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in partem magnitudine fabarum confracta, chœnicis Atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro, ansulus vasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur: triticum abijcitur, spuma argenti vehementer manibus affricando infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat: excolata aqua, iterum tota die teritur, & vesperi infusa calida aqua sinitur: mane colis excernitur, alia infunditur, atq; ter die excolatur. Id septem diebus fieri solet: postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque in albuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus salsedinem resipiat. Demum ardentissimo sole siccatur



siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat: mouetur quotidie mane & vespere, aqua que superinfunditur, priore nequaquã effusa. Hoc sit triginta diebus: nanque nisi moueatur, crassescit, vsque in duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum saluginis indicium præbeat. Deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in vas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in ventre suillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus eliquesceus contabescat, exemptamque cum sale pari terunt, & ut supra dictum est, lauant. Sunt qui salis libram vnã, & spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantam vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiscant, lanæque non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adijciens: eadem tertio, quæ supra, facito: in summa,



tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper  
transfundens in mortarium, ad singulas salis fos-  
sili libras, aducito octogenas spumæ argenti dra-  
chmas Atticis, & terito: intermittereque, nitri-  
quàm albissimi cum aqua diluti drachmas qua-  
draginta septem indito: iterum terito, donec satis  
candoris contraxisse videatur. Ita autem fundens  
eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore  
aqua, ubi confidere desierit, colato: tum novam su-  
peradiiciens aquam, manibus probè versatam si-  
nito ut confidat, ac rursus per colum trañcito. Al-  
ternis eadem proseguere, dum pura aqua dulcisque  
effluat, & nullam salsedinem præ se ferat. Postre-  
mò in fictile novum translata, colato sensim  
omni humore, Soli quadraginta diebus sub Cani-  
cule sydus exponito, & siccata vitior. Elotam  
autem constat ad oculorum collyria prodesse, &  
ad cicatricum fixiditate tollendas, ad rugosas fa-  
cies, & cicatricosas, laceratasque, & macularum  
plenas.

## Cerulea.

## CAP. LIII.

**C**erulea fit hoc modo: Infuso in vrceum oris la-  
ti, aut fictile labellum quàm acerrimo aceto,  
laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, sub-  
iecta prius arundinea tegete, firmato: superie-  
ctisque velaminibus, ne halitum expiret acetum,  
ubi resoluta fuerit, defluensque deciderit, humore  
purum ad summa delatum colato, crassamentumq;  
transfundito: debet quoq; siccari in sole, mox tru-  
sat



satili mola teri, aut alijs tritum cribrari. Postea  
 quod superest duri, in tenues partes redigendum,  
 cribrandumq; vicissim eadem tertio quartoq; fa-  
 cienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medi-  
 camentis oculorum assumenda. Secundum locum  
 tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec desunt, qui  
 ligneas rudes, in medio vase appendant, & derafo  
 ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, in-  
 ditoq; operculo circumlinentes dimitunt. Post  
 dies decem, laxato obturamento visunt: cumq; re-  
 soluta materia fuerit, reliqua, ut suprà diximus,  
 exequuntur. Si autem quis in pastillos velit dige-  
 rere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui  
 in sole siccantur. Aestate tamen suprà dictum  
 opus obeundum est: ita enim candida atque effi-  
 cax redditur. Quinetiam hyeme paratur, rrcis  
 supra furnos, balnea, aut fornaces impositis ascen-  
 dens enim calor, idem quod sol præstat. Laualis-  
 simam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut La-  
 cedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc  
 modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili no-  
 uo, maximè Attico, tritam cerussam imposito,  
 & assidue versato: cumq; cinereum colorem tra-  
 xit, eximens refrigerato, & vitior. Est & illud  
 vrendi genus: Trita pulvis nouus supra prunas  
 imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec co-  
 lore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus  
 ministratur. Quæ verò ita parata est, sandyx à  
 quibusdā dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo.



Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, ex-  
tenuareq; insuper excreſcentia leniter reprimere,  
& ad cicatricem perducere. Miſcetur ceratis, &  
emplaſtris, quæ liparæ vocantur. paſtillisq; eſt au-  
tem lethalis eius potus.

Chryſocolle. CAP. LIIII.

**C**hryſocolle laudatiſſima Armeniaca, colo-  
rem porri quàm ſimillimè reddens. Secundū  
locum ſibi vendicat Macedonica, & proximum  
Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur  
quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi  
hæceſt: Tuſam infuſa aqua, mortario expaſſa ma-  
nu ad pilam vehementer fricato, & ſtatim quàm  
conſederit, colato. Alteram infundens aquam, rur-  
ſum terito: hæc viciffim proſequere, donec pura  
ſynceraq; ſpectetur. Dein ſiccato in ſole, & ad uſus  
recondito. Quòd ſi vrere volueris, ex ea terēs quod  
ſatis eſſe videbitur, patinis ſupra carbones appo-  
nito, & alia facito, quæ ſuprà diximus. Dos chry-  
ſocolle ad purgandis cicatrices: excreſcentem car-  
nem coërcet: adſtringit, purgat, excalfacit, & mo-  
dicè corpus mordendo exeſt. Inter medicamenta  
intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem  
inferre poſſunt.

Lapis Armenius. CAP. LV.

**A**rmenius lapis præfertur leuis, colore cœ-  
ruleo, perquàm æquabilis, calculo carens,  
& friabilis. Eadem quæ chryſocolle præſtat, ſed  
inefficacius. Quinetiam uſum habet ad pilos in  
pal



alpebris alendos.

Cœruleus. CAP. LVI.

**C**œrulei origo ex ararijs metallis in Cypro: copiosior ex arena litorali: secundum quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis, lauatur ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum. CAP. LVII.

**I**ndici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum in secloria dant officinae: & est spuma purpurea, innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur quod cœrulei speciem prabet, succum suum sorbet, & leue. Inter medicamēta est, quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, & reprimat vlcera.

Ochra. CAP. LVIII.

**O**chram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, nō lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, colligiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat: caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris. CAP. LIX.

**H**allucinantur qui cinnabarin minio eandem



dem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur: in metallis verò strangulantem halitum eructat; itaque facies incolæ vesicis obvelant, ut per illis spectent, nec respirando noxium aërem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris verò ex Aethiopia deferitur, & magno constat: hætenus inuenitur, ut vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem: conuenit ad oculorum medicamenta, verum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepta, medetur.

Argentum viuum. CAP. LX.

**A**rgentum viuum fit ex minio, quod abusu suè cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succenditur: siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argentiſodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam



iam omnem exedit, & defluere facit. Potum vim  
erniciale[m] habet: suo enim pondere interna ex-  
st. Remedio est lac multum subinde potum, & ro-  
uilionibus reiectum, aut vinum cum absynthio,  
aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origa-  
num, vel hyssopum cum vino, auri limata scobs, id  
est, ramentum quàm tenuissimum epotum mira-  
culi est auxilio.

## Rubrica Sinopica.

## CAP. LXI.

**R**ubrica Sinopis maximè probatur grauis,  
densa, ad iocineris imaginem vergens, cal-  
culorum expers, concolor, cum diluitur, impendio  
fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibus-  
dam, expurgataq[ue] defertur in Sinopem urbem, in  
qua venditur, vnde cognomētum accepit. Vim ha-  
bet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem,  
& adstrictoriam: quapropter vulnerarijs empla-  
stris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs cō-  
misceri solet. Aluum sistit, in ouo sumpta aut cly-  
stere infusa: datur iocineris vitio laborantibus.

## Rubrica fabrilis.

## CAP. LXII.

**R**ubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior  
est. Optima Aegyptia, & Carthaginiensis,  
lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia  
quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & dege-  
nerante in rubricam.

## Lemnia terra.

## CAP. LXIII.

**L**emnia terra, cuniculoso in specu nata è  
Lemno insula, palustri loco defertur, inibi  
ele



electa, & caprino sanguini permixta: quam incon-  
 le cogunt in pastillos, & imagine caprae signant:  
 unde & sphragida egos, hoc est, sigillum caprae,  
 appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa  
 venena singularem, pota cum vino, & praesumpta  
 euomi venena cogit. Contra iclus morsusq; anima-  
 lium, quae exitiale virus eiaculantur, prodest. An-  
 tidoti familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia vtan-  
 tur: est & dysenteriae vitilis.

Atramentum sutorium. CAP. LXIIII.

**A**tramentum sutorium genere quidem vnum  
 & idem est, molle & concretum: sed in spe-  
 cie differentias tres habet. Vnum nanque humo-  
 ribus stillatum in cuniculos quosdam colatus, con-  
 crescit: quare ab ijs, qui Cypria metalla perficiunt,  
 stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion  
 vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alte-  
 rum simplici ratione fit in speluncis: postea transfu-  
 sum in excauatos scrobes, concrementum ca-  
 pesit, quod pecton, id est concretitium, proprie  
 nominatur. Tertium dicitur coctile, & in Hi-  
 spania fieri solet: sed inutile, ac inualidissimum  
 esse constat. Ratio parandi haec est: Aqua ma-  
 defactum decoquunt, mox in piscinas transfun-  
 dunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus co-  
 alescit, in complures forinulas digestum, tessera-  
 rum specie reddentes, quae racematim inter se co-  
 haerescunt. Optimum esse creditur, caeruleum, gra-  
 ne, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium  
 est



est, ab alyslonchoton nominatū. Proximum, concretitium. Coctile verò ad insectus & denigratio-  
nes, aptius ceteris esse compertum est: sed ad me-  
dicinæ usum inualidius esse, experimenta docent.  
Valet adstringere, calfacere, et crustas inducere:  
latus ventris tineas necat, drachmæ pondere deno-  
ratum, aut cum melle linctum: remitus ciet: ad-  
uersus hausta fungorum venena, ex aqua potum  
auxiliatur: purgat caput, aqua dilutum, & in vel-  
lere naribus instillatum. Vritur, ut paulò post in  
mentionem chalcitis ostendemus.

## Chalcitis. CAP. LXV.

**C**halcitis præfertur similis ari, friabilis, nec  
lapidosa, nec inueterata, intercurrentibus  
oblongis venis, splendentibusque. Huic absterforia  
vis inest, excalfaciens, & crustas ulceribus  
obducens: purgat quæ oculis & eorundem angulis  
herent. In genere leuiter exedentium est. Ad  
ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, efficax  
est. Sanguinem è vulua, & naribus erumpen-  
tem, cum succo porri sistit: gingivarum vitia, de-  
pascencia ulcera, tonsillasque, eius farina compe-  
scit. Vsta, & cum melle trita, oculorum medica-  
mentis longè utilior redditur. Callum genarum,  
& scabritiam absument, abstergeique. Fistulas tol-  
lit, collyrii modo in eas adacta. Fit ex chalcite  
medicamentum quod psoricon vocat, duabus eius  
partibus, cum vna Cadmiæ additis, & ex aceto  
tritis. Oportet autem in sicili obruere fimo, diebus  
quad



quadraginta, per Caniculæ ardores: sic enim fit acrius. Idem, quod chalcitis, potest. Alij pares utriusq; portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viniis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfectè inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum & miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitiæ flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum per flatus carbonibus, vsquedum luteo colore palleascit: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

CAP. LXVI.

**M**isy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionem cum chalcitide eandem, præterquam quod psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantum differens. Aegyptium aut cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur sed ad ocularia medicamenta multò supradictis inferius.

Melanteria.

CAP. LXVII.

**M**elanteria gemina est originis: quedam in faucibus cuniculorum, quibus res eruitur, salis modo concrescit. Alia verò in summis fa-



facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quadam. Præstat, quæ sulphurus colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Sory.

CAP. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melanteriam esse, Saberrantes, siquidem sui generis est sory, ei non absimile: verum soræi virus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro. Præferitur Aegyptium, quodque frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorantoneque magnum virus olens, ita ut stomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillis misyos modo non emitit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & rstonem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos demigrant. Hæc autem ferè omnia, & alia, quæ rstonem experta nō sunt, perustis validiora esse existimantur: præter salem, & vini fecem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com-

G



busta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges. CAP. LXXIX.

**D**iphrygis tria genera esse creduntur. Quidam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur: lutosum nanque extrahitur ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. Diphryges ideo vocatum est, quod & à sole, & à sarmentis vritur, are scat, & ferme torreatur. Alterum perfecti aeris, quasi subsidens fax est: siquidem post frigida aquae effusionem, ut supra retulimus, cum de flore aeris differeremus, sublato aere, fornacis ima parte cohaerens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum aeris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumque colorem rubricae contraxerit, eximientes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia, quae lapidem aeris gignit, fieri: quando in dictis aeris assata, & in scrobes translata perurit. Tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Praefertur quod saporem aeris reddit, aeruginusque, adstringens, & vehementer exiccans linguam. quod sibi exusta ochra non vendicat: quae cremata, diphrygis vice venit. Vis eius adstringere, per purgare, extergere, siccare, ex crescentia consumere, vlcera serpentia, & quae cacoëthe vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes ter rebinthina aut cerato exceptum discutit.

Aur



## Auripigmentum. CAP. LXX.

**A**uripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiae permistum, in squamulis fissile: quale in Mysia Hellepontus nascitur. Huius duo genera fluxerunt: Vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua viuis carbonibus subiectis, assiduoq; versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. crustas cum vehementi vredine, & violento morfu excitat: reprimat quae excrescunt, & capillos euellit.

## Sandaracha. CAP. LXXI.

**S**andaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens. Dos eadem & vstio, quae auripigmento: explet alopecias, resinae excepta, & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisq; vlcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusisientibus. Suffitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, rapto per fistulam nido re: vocem expedit, cum melle delincta: suspiriosis



cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen. CAP. LXXII.

**O**Mne aluminis genus fere in Aegypto, & in  
eisdem metallis inuenitur: etenim scissile  
quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur  
& in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedo-  
nia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiae,  
Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus,  
sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum  
ad medendi usum, scissile, rotundum, & li-  
quidum expetuntur. Optimum est scissile, præser-  
tim recens, candidissimū, gustu perquam adstrin-  
gens, graue olens, calculorum expers, nec glebu-  
lose aut assulose compactum, sed sigillatim in capil-  
lamenta quædam canescentia dehiscens, quale est  
quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegy-  
pto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini  
persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non  
adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod ma-  
nu confectum est: sed ex figura deprehenditur. Assu-  
mendum autem suapte natura rotundum, bullis tur-  
gens, albo propius, atque validius adstringens, præ-  
terea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine  
præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegy-  
ptium, aut ex insula Melo. Liquidi probatio, ut  
sit limpidum, lacteum, æquale, & semper succo  
madens, sine lapidibus, atque quendam coloris igni-  
culum expirans. Vim habent excalfaciendi, strin-  
gendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis ocu-  
lor



lorum offundunt: genarum carnem, ceterasq; ex  
 crescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius  
 intelligitur. Vri & torrerī chalcitidis modo debet.  
 Putrescentia vlcera compescunt: sanguinis fluxio-  
 nes inhihent: gingiuas humore pregnantes com-  
 primunt: motus dentium cum aceto & melle fir-  
 mant. Profunt cum melle vlceribus oris, eruptio-  
 nibus papularum, & fluxionibus aurium, cum san-  
 guinalis herbe succo: lepris conueniunt cum brassi-  
 cæ folijs aut melle cocta: itē pruritui, & vnguium  
 scabritijs, pterygjs, & perniionibus, aspersa cum  
 aqua. Valent cum aceti fece, & galla, pari ponde-  
 re cremata, ad phagedanas vlcerum, & cum salis  
 duabus partibus, ad vitia quæ pascunt: surfures  
 cum eruo & pice illita abstergunt: ad lendes, pedi-  
 culos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Con-  
 tra tumores, & graue alarum inguinumque vi-  
 rus, illinuntur. Ex Melo autem aduectum, mulieri-  
 bus præstat ne concipiant, ante coitum ori vuluæ  
 inditum: partus quoq; extrahit: gingiuus, si caro ex-  
 creuit, vna ac tonsillis accommodantur: ori, auri-  
 bus & verendis cum melle illinuntur.

Sulphur.

CAP. LXXIII.

**S**ulphur optimum existimatur viuum, quod apy-  
 ron vocant, nitidula modo splendidum, perlu-  
 cens, minimè lapidosum. Probat in genere sul-  
 phuris ignem experti, quod viret, ac præpingue spe-  
 ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur.  
 Supradictum sulphur calfacit, discunt, & cele-



riter concoquit: prodest tussibus, suspiriosis, puru-  
lenta extusis in ovo sumptum, aut suffitum:  
præterea partus, isti nidore extrahit: lepras, liche-  
nas, scabros ungues, cum resina terebinthina mi-  
stum, aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras ef-  
ficax est: vitilignes tollit: scorpionis ictibus, addita  
resina, medetur: cum aceto verò, draconis marini  
scorpionisque plagas sanat. Pruritus toto corpore  
erumpentes, cum nitro detersum, sedat: regium  
morbum emendat, insparsum fronti cochlearis  
mensura, aut in sorbili ovo sumptum. Facit ad gra-  
uedinem, & destillationes: sudores quoque con-  
spersum inhibet: podagricus, cum aqua & nitro il-  
litum, conducit: gravitatem auditus, suffiti nidore  
raptim per fistulam hausto, sanat: lethargicos suf-  
fitu excitat: erumpentem undecunque sanguinem  
sistit: contusis auribus, cum vino & melle illitum  
medetur.

## Pumex.

## CAP. LXXIIII.

**P**Vmicis probatio, ut magnopere levis, spon-  
gius, scissilis, nec arenosus, item teri faci-  
lus, & candidus. Crematur flagrantissimus car-  
bonibus obrutus, & ubi canduerit, extractus, vi-  
no restinguitur odorato: iterumque incensus ex-  
tinguitur: & tertia uestione exemplius, & per se  
refrigeratus, ad usus conditur. Vus eius adstringe-  
re, gingivas abstergere: purgat cum calfactione,  
que caliginem pupillis offendunt: explet ulcera, &  
ad cicatricem perducit: excrescentia colibet. Fit ex  
far



arina eius dentificium. Corpori crustam obdu-  
cit: auellendus capillis aptus. Theophrastus author  
est, si quisquam in bullientem vrceum vini pumi-  
cem iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal. CAP. LXXV.

**S**alsibilis efficacior est, communiter, si est can-  
didus, calculus vacans, & perspicuus, densus,  
equali compage. Peculiariter Ammoniacus natio-  
ne laudatur, si modo findi facile possit, & in recta  
segmenta diduci. In marino sale eligendus est can-  
didus, & equalis, densus. Probatissimus in Cypro  
fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia  
& Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacu-  
stris præfertur: sed multò validissimus est, Phry-  
gius nomine tapæus, aut tritæus, aut gantæus. Sa-  
lis natura in commune perquàm utilis est: adstrin-  
git, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, exte-  
nuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quòd  
alius alio sit præstantior. Quin & à putredine  
vindicat. Admiscetur medicamentis psoras abster-  
gentibus. Excrescentia in oculis reprimat, & pte-  
rygia consumit, cæterasq; carnis extuberationes  
tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines  
ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores au-  
xiatur, doloresque in saccis fotu mitigat, & pru-  
ritus sedat, ex oleo & aceto infriëtus ad ignem,  
donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasq;. An-  
ginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: ton-  
sillis vnaq; cum melle tostus. Vlceribus in ore



manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedænis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerasen, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus, cum melle & aceto: aduersus vesparum ictus, & teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo vitulino: furunculos cum vna passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum moribus auxiliatur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita ut vinculus loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatus imponitur cum farina, & melle: ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, & ulcera quæ serpunt, cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusq; prunis, usquedum efferuescat. Aliqui fossilem subactis polline oblinunt, & carbonibus subijciunt, usquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturque, donec iam non exiliat.

Spuma salis, spumo si maris lanugo sine ramen-

tum



um est in exilibus petris inuentum, cui vis eadem  
que sali.

Muria. CAP. LXXVI.

**M**Vria effectus salis præbet, abstergitq; dys-  
sentericis infunditur, etiam si nome intesti-  
na corripit: & ischiadicis veteribus. Ad fotus,  
aque marinæ usum præstat.

Flos salis. CAP. LXXVII.

**F**los salis flumine Nilo defluit: lacubus ta-  
men quibusdam innatat. Assumendus qui  
crocei coloris est, odore ingrato, ceugari. Inter-  
dum longè magis virus olet, gustuq; mordacior,  
& pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut  
scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non  
nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte,  
etiam aqua, diluente factitium colorem. Ad vlce-  
ra, quæ cacoëthe vocantur, & phagedænas, geni-  
talium nomas, & purulentas aureis, efficax est:  
oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tol-  
lit. Emplastris vnguentisque coloris causa, ut rosa-  
ceo, miscetur: sudorem cit: aluum turbat, in vino  
aut aqua sumptus: stomachum malè habet. Addi-  
tur acopis, & sinegmatis, quæ albandi capilli gra-  
tia componitur: & in vniuersum acris est, & fer-  
uentis naturæ, ut sal.

Nitrum. CAP. LXXVIII.

**P**refertur nitrum leue, roseo colore, aut can-  
dido, in foramina delihscens, perinde quasi

G S



Spongiosum quiddam, quale ex Bunis affertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens: qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Caria gignitur. Vim & vstionem salis habet, tam nitrum, quàm spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, vti ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida aut vino infusum, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat: fordes expurgat, cum aceto instillatum. Canum moribus ex asinino adipe aut suillo medetur: resina terebinthina admistum furunculos aperit: aqua inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: ys verò, qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio, ysq; qui cibum nō semiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisque iam remissionibus, & luxatis, cum cerato: in resolutione linguæ, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

Fax



**E**Ligenda fæx maxime à vino vetere, Itali-  
co: suminus, ab alio consimili. Fæx aceti  
viribus longè acrior est. Crematur vt alcyonium,  
intè diligenter siccata. Sunt qui noua testà igni  
largo vrant, vsque dum penitus incendatur. Alij  
vini carbonibus fæcis glebam obrunt, & idem  
opus prosequuntur. Experimentum est legitime  
ustionis, vt aërio nitore inalbescat, linguamq; ta-  
ctu vrere videatur. Eadem vrendæ fæcis aceti ra-  
tio. Vis ei supra modum vrens, & abstergens: vl-  
cera ad cicatricem perducit, adstringit, vehemen-  
ter exest, siccâtq;. Sed recenti vtendum est, quo-  
niam celeriter exanimatur: proinde nõ nisi in re-  
conditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur,  
vt pompholyx. Quæ ustionem experta non est, tu-  
mores & per sese, & cum myrto colubet: ventris  
stomachiq; fluxiones illita sistit: muliebri proflu-  
uium, imo ventri aut genitalibus imposita, miti-  
gat: panos discutit, nondum exulceratos, & tuber-  
cula: rigentes mammæ, suiq; lactis impatientes,  
cum aceto peruncta exstinguit. Cremata verò, vi-  
gues scabros cum resina aufert: addito lentiscino  
oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculo-  
rum medicamentis, vt spodos, adijcitur: cicatrices  
eorum & caligines eadem abstergit.

Calx viua. CAP. LXXX.

**C**alx viua hoc modo fit: Marinorum bucci-  
norum testas igni condito, aut feruenti cli-  
bano



bano, nocte dimittito : postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito : sin aliter, iterum vrto, usque dum vehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in sicile novum conijcito, & exacte pannus operiens, noctem unam conquiescere finito : manè eam extrahens, ubi perfectæ omni opere elaborata fuerit calx, recoquito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è vili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens : quibusdam alijs immixta, ut adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat : ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum.

CAP. LXXXI.

**G**Ypsum vim habet adstringendi, obstruendi : sanguinis eruptiones sudorésque cohibet : sed potum, strangulationis modo ingulat.

Sarmentitius cinis.

CAP. LXXXII.

**S**Armentorum cinis vrendi vim habet : cum Saxungia autem vel oleo illitus, fractus nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimat : serpentium canumque morsibus illitus ex aceto medetur : crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum venena, cum aceto, sale, & melle.

Alc



## Alcyonium. CAP. LXXXIII.

**A**lcyony quinque esse genera compertum est: vnum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnulae oculorum aut spongiae simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achnen vocant. Duo priora in facinorum smegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquoque corpore. Tertium is, qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, leni. Vsum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilothræque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fictile mutat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

Adarc



Adarces. CAP. LXXXIII.

**F**It in cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta salsilago, humidus & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore floris lapidis Asy similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongix. CAP. LXXXV.

**E**Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissis: quarum duriores tragos nominarunt. Faminas autem, quæ contrariis doctes habent. Vruntur eæ ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine, vulneraria sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæve conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetusæ autem inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callósque laxant: siccæ recentes & vacuæ senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, impositu siccant: sanguinis profluvium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crem



rematarum, profluentem sanguinem sistit. Cano-  
lida cura fiunt, è mollissimis recentes, per aestus  
infecta salis spuma, quæ petris coheret: insolantur  
inuerfa, hoc est, parte caua sursum spectan-  
te, & qua abscissa fuerunt, deorsum. Si verò aesti-  
na serenitate ad lunam sternantur, persusa salis  
puma, aut maris aqua, maximum candorem re-  
ferent.

Corallium. CAP. LXXXVI.

**C**orallium, quod aliqui lithodendron appel-  
larunt, marinum esse fruticem constat, qui  
alto extractus, duratur statim atq; emergit, tan-  
quam offuso aëre protinus concreascit. Plurimum  
inuenitur ad Syracusas, in promotorio cui Pachy-  
ro nomen est. Laudatissimum, rubens, colore an-  
therici aut sandycis saturata, nec secus terenti sa-  
tile cedens, æquabili vsquequaque cōcremento, rur-  
sus algæ aut fuci marini odore, quàm ramosissi-  
mum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod  
autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, ina-  
ne, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstrin-  
git, & refrigerat mediocriter: excrescentia coër-  
et: oculorum cicatrices abstergit: ulcerum caua, &  
cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones ma-  
gnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur.  
Quin & potius ex aqua lienem absorbit. Quod an-  
tipathes vocat, corallium esse arbitrantur, specie  
tantum distans. Est autem colore nigro, arboris  
figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Rhs,



Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

**P**hrygius lapis, quo infectores in Phrygia  
vuntur, à qua nomen accepit, nascitur in  
Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè  
grauis, non solida corporis compage, interce-  
dentibus albis segmentis, vt in cadmia. Vritur an-  
tem vino optimo perfusus, viuisque carbonibus ob-  
rutus, perflatur assidue follibus, donec mutato  
colore rufescat: rursus extractus eodem vino re-  
stinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus facien-  
dum: attendendum tamen, ne minimè confringa-  
tur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo rstoque  
adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas qua-  
dātenus inducit, ambustis cum cerato medetur.  
Lauatur vt cadmia.

Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

**A**sus lapis assumi debet pumicis colore, le-  
uis, fungosus, item friabilis, scissiles venas  
lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, sal-  
sugo subflaua est, summo lapide insidens, compage  
tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici si-  
mili, ad luteum vergente: ad motus lingue ali-  
quantum mordet. Vim habet vterque adstricto-  
riam, & modicè erodentem, admixtus liquida  
pici, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Lon-  
gè validior flos existimatur. De cætero siccatus  
flos, vetera vlcera & cicatrici repugnātia sanat:  
excrecentia cohibet, tetrāque vlcera & fungis  
similia, cū melle expurgat: vlcerum caua explet,

&



& expurgat cum melle, depascentiâque cum ce-  
rato sistitur. Fit cataplasma ex eo podagricus, mis-  
to fabæ lomento: & lienosis, ex aceto & vina calce.  
Prodest flos ex melle phibisicis linctus. Podagrici  
iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excanato  
inditis. Funt quoque pulueres, qui corpora erodunt,  
& luxuriantem carnem, & corporum crassitiem  
absument, cum vice nitri in balneo sparguntur. Si  
lauare libet, cadmia modo lauatur.

## Pyrites. CAP. LXXXIX.

**P**Yrites lapidis genus est, à quo aes conflatur.  
Eligi debet æris similitudine, facile scintillas  
edens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna con-  
tinuè flatur follibus, donec rufescat. Alij in multos  
carbones igni candētes, lapidem copioso melle per-  
fusus deiiciunt, & ubi ad fuluum colorem verge-  
re coeperit, extrahunt: efflatōque cinere, rursus ma-  
de factum cremant, donec aquabiliter assiccatus,  
friabilis reddatur: siquidem sæpe facies summa so-  
lum vritur. Ita crematus, siccatusque, reconditur.  
Si eloto opus sit, lauare debet ut cadmia. Tam cru-  
di quàm vsti vis est, excalfacere, abstergere, offu-  
sam oculis caliginem expurgare, duritias concoque-  
re, & concoctis discutere. Resina exceptus excre-  
scencia in carne cohibet, sed calorem quendam &  
adstrictionem parit. Ita vstum nonnulli diphry-  
ges appellant.

## Hæmatites. CAP. XC.

**H**ÆMATITES optimus habetur friabilis, satum

H



rato colore niger, durus & suapte ingenio aqua-  
lis, nulla sorde admista, nulloq; xonarum discursu.  
Vim habet adstringentem, & excalfactoriam ali-  
quantum extenuantemq; : oculorum cicatrices &  
scabritiã cum melle purgat: cum lacte autem mu-  
liebri, lippitudini. si actus, & oculus cruore suffusus  
conuenit: bibitur contra difficultatem vrine, &  
fluxiones mulierum in vino: & ab ijs qui sangui-  
nem reiecerunt, cum succo punici mali. Funt ex  
eo coticule & collyria oculorum vitijs apta. Vri-  
tur vt Phrygius, sine vino dumtaxat. Modus vstio-  
nis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdã in-  
tumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant: Den-  
sam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi  
sunt quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini  
operis, qui fruentem cinerem contineat, condunt,  
pucâque interiecta mora eximunt, experiunturq;  
si trita ad cotem hæmatite colorem reddat: quod  
si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum ob-  
ruunt, & subinde conspicientes, periculum fa-  
ciunt: siquidem in cinere diu demissus, colore mu-  
tato diffunditur. Coarguitur malè confectus, pri-  
mum scissilibus venis: quippe in rectos venarum  
discursus refringitur. At hæmatites longè secus se  
in colore habet: nanque hic floridum reddit: hæ-  
matites verò saturatiorem, atque cinnabarin imi-  
tantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è  
magnete Lipide, vehementer ambuſto. In Aegy-  
pto sponte nature cum metallis enascitur.

Sch



## Schistus lapis.

## CAP. XCI.

**S**chistos lapis in Iberia Hispania gignitur. Probatum maximè qui croci colorem amulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium venarum discursu, petelinum modo, Ammoniaco salis similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & cana repiet muliebri lacte perfusus: ad proci-  
lentia, rupta, item genarum crassitiem, & ruas  
oculorum, magnopere efficax est.

## Gagates.

## CAP. XCII.

**I**n gagatarum lapidum genere præferendus, qui  
celeriter accenditur, & odorem bituminis red-  
dit: niger est plerunque, & squallidus, crustosus,  
perquum levis. Vis ei molliendi, & discutiendi:  
prehendit fonticum morbum suffitus, recreatq;  
pulvæ strangulationes: fugat serpentes nidore: po-  
tagricis medicaminibus, & acopis additur. In Ci-  
cia nasci solet, qua influens amnis in mare effun-  
ditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur.  
locatur autem & locus & amnis Gagus, in cu-  
us faucibus ij lapides inveniuntur.

## Alii plures lapides. CAP. XCIII.

**A**ps thracicus dictus, nascitur in flumine  
quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis  
i gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo re-  
tingui: quod in bitumine accidit. Magnes la-  
pis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad  
æruleum vergente, densus, nec admodum grauis.



Datur cum aqua mulsa, trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnam crematum pro hematite vendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illius humor rhoidas exiccat: eius cinis dentifricio optimus.

Galactites appellatur, quod lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones & ulcera convenienter ilinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter vim glutini, quod ei obhaeret. Melinites omnia galactite similis: hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem vi galactites effectus. Morochithus lapis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, ut pote molli, & facile liquefcente, linteones dealbandis vestibus utuntur. Spiracula corporis obstruere videtur, conueniens iis, qui sanguinem expuunt, celiacis, & vesicae doloribus, cum aqua potus: itidem fluxionibus vulvae, impositus velleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atque delacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, ulcera quae sunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit. Alabastrites vocatus onyx, crematus, resina aut pice assumpta duritias descutit: stomachi dolores cum cerato leuat, & gingivae comprimit. Lapis nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subviridi colore iaspidem imitatus: cum diluitur tamen lacteum succum reddit.

Vel



Vehementer mordet : tenebras , quæ pupillis ob= uersantur , expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione , lineis aequaliter inter se distanti= bus, quasi industria detornatis: solutus nullā qua= litatem manifestam gustui representat. Potest ci= ceris magnitudine tritus ad cotem , ut collyrium, cum calida aquæ cyathis tribus , potu difficultati urinae auxiliari, & calculos in vesica comminue= re. Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alu= mini similis: quo, ut pote flexili, telas & vela tan= tum spectacula gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiore exeunt. Sapphirus lapis, percussus à scorpione po= tu prodesse existimatur. Contra intestinis exul= cerationes bibitur. Excrescentia in oculis, vudisque & pustulas inhihet, & ruptas membranas co= git. Memphites in Aegypto iuxta Memphin in= uenitur, calculorum magnitudinis, pinguis, ver= sicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ut ut non sentiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inueni= tur lunæ imaginem reddere, qui cum ea quidem augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, candi= dus, translucens, levis. Huius ramenta comitialibus in potus dari iubent. Eo cen gestamine ad amuleta mulieres vuntur. Arbores adulligato eodem fru= gifera redduntur Iaspidum quedam sin. trag=



dum imitatur, alia crystallum, colore similis pi-  
 tuitæ: alia non dissimilis aeri, ob id vocatur aeri-  
 Zusa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias  
 ex argumento vocatur: quedam lineis albis &  
 resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata.  
 alia terebinthinæ similis, quæ terebinthi Zusa di-  
 citur: alia colore callida gemmam æmulatur.  
 Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare  
 partum femoribus appensæ. Aetites lapis est velu-  
 ti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante.  
 Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt vul-  
 uæ & parum tenaces, sinistro brachio adalliga-  
 tus: sed parturientibus è brachio amoveatur, &  
 feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Fu-  
 rem deprehendit, si quis in pane conditum offe-  
 rat: fur enim mansum deuorare nõ poterit. Quin-  
 etiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta  
 cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerate  
 exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excalsa-  
 ciente, comitiales magnificè iuuat. Ophitea genera  
 multa: quidam ponderosus & niger: alter cinerei  
 colore spectatur, punctis distinctus: tertius linei  
 quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alli-  
 gati contra capitis dolores, & serpentium ictus pro-  
 sunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & ca-  
 pitis doloribus auxiliari. Lapides in spongys in-  
 ueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vin-  
 pti. Lithocolle glutinum, quo lapides coniam-  
 guntur: conflat autem ex marmore, lapide Pa-  
 rio



rio, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incōmodos oculus pilos replicare. Ostracites testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminis fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtuntur. Menses drachmæ ponderis potius ex vino, sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilicet pōdere, feminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impisus, mamma- rum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

Smyris lapis est, quo annularij sculptores lapides expurgant, ad erodendum & vrendum utilis: gingiuis, quas humor vexat, prodest: dentifricio commendatur. Arena è litoribus sole feruesfacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus, in ea obruantur. Torreri solet ad aridos fatus, pro milio aut sale. E cote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit: virginum mammae cohibet, nec incrementum patitur: potum ex aceto, lienē absunit, & comitialibus prodest. Geodes lapis, adstringit, siccatur, caligines oculorum discutit. Illius autem ex aqua, testium mamma- rumque inflammationes sedat.

## Terra. CAP. XCIIII.

**O**Mnis terra ad medendi vsum recepta, siccioram & primam vim habet refrigerandi, meatusque obducendi, occludendi que: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis. Eretriades duæ sunt, una vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinerem co-



lorem vergens, perquam mollis, quæ si per aramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pessum terit, humor leuiter excolitur: siccata solibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut vespere coisdat: antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si ista desideratur, pastilli magnitudine cicero in fistile perforatum coniunguntur, oræque vasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter follibus perflantur: ubi verò cinis in fauillis se conuerlit, aut aereum colorem contraxit, exempli reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta conglutinat. Samia præfertur candida, leuis, tangenti lingue glutinis modo adherescens, mollis succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion vocant. Dæ enim species eius: vnā, antediximus: altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut eretria, vimq; consimilem habet: sanguinis reiectiones sistit, & fixiæ fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris punice datur. Testium & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arceat: contra serpentium morsus & venena, pota ex aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices vtuntur polliendo auro, ut res  
splen



blendeat. Probaturn candore & durtia. Vis ei ad-  
trictoria, & refrigerans: prodest stomachicis po-  
us: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum  
& vlcera, cum lacte efficax est partus, vt tradūt,  
dligatus accelerat, & conceptus foeminarum cu-  
todit. Chia eligi debet candida, vergens ad cine-  
eum, Samia similis: est autem crustosa, albaq; sed  
Chius formis differēs. Vis eadem quæ & Samia:  
xtendit faciem, & erugat, atq; splendidā reddit:  
lorem in facie & corpore toto cōmendat: in bal-  
eis pro nitro deterget. Eadem præstat Selinustia:  
maximè laudatur, quæ vehementer resplēdet, can-  
ida, friabilis, & humore dilui celerrima. Cimo-  
ia duo genera, candida & ad purpureum incli-  
ans. Optima existimatur, quæ immatā habet pin-  
itudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraque ace-  
o diluta, parotidas, & alia tubercula disciuit: am-  
usta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas  
on sentient: testium duritias, & totius corporis  
ollectiones cohibet, igni sacro imponitur. In sum-  
ia, vtraq; multum in medicina commendatur, si  
icorruptæ originis, nec spuria assumatur. Quæ  
nigritus dicitur, colore ferè eretriæ similis est, gran-  
oribus tantum glebis manum si quis adinqueat,  
efrigerabit tactu linguae, & que adeo glutinosa, vt  
ensilis hereat. Cui effectus idem qui cimolia, pau-  
o tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade ven-  
unt. Fornace æ testæ vehementer tosta, crustus  
lceribus obducunt: quare prurigini & papulae

H 5



rum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, strumas discutunt, cerato exceptæ. Fornacū terra quæ retorrda fuluescit, eiusdē cum testa effectus. Melia colore cineream cretream imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, dera si pumice modo crepiat. Vim habet aluminisam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicē linguā siccatur: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitilignes, & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humore attigerit, faciliē resoluatur. Ex ampelide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, picea longos carbonēs referēs, modicē assulsa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad callibelephara additur, tingendis capillis idonea. Vsus eius ad illinendas vites sub germinationis tempus, vitopote cum innascentes vermiculos enecet.

Fuligo pictoria. CAP. XCV.

**F**uligo qua pictores utuntur, ex vitrariis officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax: fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Au



## Atramentum librarium. CAP. XCVI.

**A**tramentum, quo scribimus, fuligine è tectis  
 coacta colligitur. In singulas libras gummi  
 terne fuliginis uncie adijciuntur. Fit etiam è re-  
 sinarum & pictoria fuligine, de qua paulò antiè  
 diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gum-  
 mi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti suto-  
 rij, singulorum sescuncia. Adlatur conuenienter  
 erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua  
 commodè crassius illinitur, sed non antiè solua-  
 tur, quàm cicatricem induxerit: sanatus si-  
 quidem ulceribus, sua sponte decidit.

Ceterum habes, amice, sime

Aree, ferè quæ tradenda

duximus pro ope

ris modo, quæ

destina-

ne-

ramus, & materia auxilio

liorumq; medicina-

lum copia.

QVINTI LIBRI

FINIS.




PEDANII  
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

venenis, quoq; modo arce-  
antur, vitenturq;

Liber VI.



**S**UPERIORIBVS, amicis-  
sime Aree, libris tradidimus de  
aromatibus, oleis, unguentis, ar-  
boribus, & earundem fructibus,  
lacrymisque: item animalibus,  
melle, lacte, seuo, frumentis, oleribus, herbis, radi-  
cibus, liquamentis, vinis, metallisq;. In hoc verò to-  
tius operis ultimo, facultates medicamentorum re-  
censebimus, quæ prodesse nobis, aut officere pos-  
sunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus in-  
stitutum prosequamur. Huiusmodi autem tra-  
ctatus, cum bifariam distributus sit: in partem  
venena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes,  
aut si quando per imprudentiam dentur, ut tum  
quoque innoxia fiant, irritaque: & in ratio-  
nem ipsius succurrendi, qui iam noxiam sentiunt: pri-  
mum differam de præcauendi modo, quem esse dis-  
ficillimum plerique maiorum arbitrantur, quod  
dantes clam venena, ita insidias temperant, ut pe-  
rit



itissimum quēque decipiant. Siquidem venena  
sua amaritudine, permixtus dulcibus, spoliant, &  
grauē odoris virus mixtura odoramentorum exi-  
mūt: aut medicamenta immiscēt, quæ tuēdæ sani-  
tatis gratia dari putantur: & præsertim in vale-  
tudine, ut absinthium, tragoriganum, satureiam,  
aut hyssipum, quinetiam thymū, irim, origanum,  
abrotonum, castorium, aut si quid medicamentis  
purgatorijs cognatam habere qualitatem videat-  
tur. Aut potionibus inserunt: ut vinis asperis, in-  
ribus, passis, melle aquæ, melle succis, ut in crea-  
more lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs  
quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Qua-  
re qui in ea suspicione sunt, conditos cibos vitare  
debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salso-  
rum, aut acidorum, abstinere: nec sitibundi affa-  
tim bibere, aut esurientes voraciter comesse, sem-  
perq; ad sapientem horum diligenter attēdere, præ-  
sertimq; potu frigidam aquam præsumere. Satia-  
to enim appetitu, qualitates ægerrimè postea  
concoquuntur. In ægris quidem faciliè cauemus  
potiones auxiliij prætextu dari solitas, quas offe-  
runt improbi veneficiorum artifices: itaque ob id  
laborantes morbo non perinde audentium iniurijs  
patent. Et hæc quidem ne faciliè incauti seductiq;  
homines capiātur dolis veneficorum, ratio est, &  
facultas. Sed alia superest expeditior, ut suspi-  
ciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires he-  
betent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi

car



caricæ sunt cum iuglandium nucibus manduca-  
ta, & quæ cedromela vocant, id est citria, semi-  
nuq; napi drachma cum vino. Item folia calamin-  
tha, aut creta quæ Lemnia sphragis appellatur, pō-  
dere pari cum vino: aut rutæ folia & nucis iu-  
glandis nucleum: aut caricæ duas, & salis cal-  
lum ieiuni sumant, & nullo veneni genere leden-  
tur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum  
præbent: inter quæ intelligitur magnum Mithri-  
daticum, & quod scinco, & quod sanguine tem-  
peratur. Quin & sæpe venenis obsistunt peculia-  
res quidam corporum affectus certo quodam mo-  
do constitutorum cum quadam cibi potusque qua-  
litate, tum vini copia ita temperatorum, ut cum  
venenis dissentiant: siquidem ingesti veneni vires  
frangunt, atque iam priore alimento factus præ-  
clusisq; meatibus, obstant ne membratim per di-  
gestionem insinuetur. Verum enimvero quoniam  
fortune necessitas interdum similia discrimina  
peregrè agentibus affert, absque ullis insidijs ho-  
minum, nonnihil differendum mihi de hac re ne-  
cessarium dico. Iam primum igitur culinam ap-  
parare loco subdiali convenit, cibosq; & potus in  
huiusmodi loco struere. Si id fieri commodè ne-  
quit, secunda erit conditio hac, apparandi appre-  
hendique sub tecto. Sed iam diligenter liquearia  
animadvertenda: frequenter enim à superioribus  
contabulamentis animalia decidunt, exigua que-  
dem, sed quæ non modicam perniciem implantur,

ut



phalangia, stelliones, & alia quadam reptilia.  
Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet:  
namque reptilia odore vini illicitur, quæ inter-  
lum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum  
erò delapsa immersaq; expirarunt, & exitu cau-  
is haurientibus attulerunt. Sed hæc hætenus di-  
ta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateant. Quod  
i qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sum-  
serunt, auxiliari primo quoque tempore oportet  
uit: siquidem dum comites singulorum venenorum  
notæ expectantur, immedicabile sit venenum, &  
caulis per neglectum, medicamentis agrè cedit.  
Quare si qui pro comperto se virus sumpsisse in-  
telligant, & fateantur, aut eorum, qui adierant,  
testimonio constet, protinus ad idonea remedia  
transseuntes, facile peculiari nativæq; constitu-  
tioni restituemus. Neque enim is assentimur, qui  
propterea auxilia in huiusmodi frustra adhiberi  
contendunt. Quo enim modo morbi, quorum cau-  
sæ cæcæ latentæque corporibus insident, medici-  
nam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt ve-  
nera, medendi rationem aspernantur? Aequè ve-  
rò omnes morbi pro causarum ingruentium ma-  
gnitudine, proque antecedentibus affectionibus  
qualitatibusque, quibus sit opportunum corpus,  
vel medicabiles sunt, vel nullus cedunt medicamen-  
tis. Quod si qui forsitan obmutescunt, aut tenui-  
ent, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, mel-  
am volis eius cognitionem prabeant, tum pro-  
tinus



tinus accedendum ad ea, quæ communiter epi  
 quibuscunque venenis opitulari consueverunt. At  
 qui nullum magis in omnia valens auxilium da  
 ri potest, qui in vi proximo loco virus foras exha  
 riatur, priusquam inuale scat. Quare sine mora, co  
 lidum oleum ex aqua, aut seorsum, vi vomitare co  
 gantur, dari conuenit. Aut si oleum natura lo  
 negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, au  
 lini semine, aut trago, vrtica, fœnogreco, aut hu  
 lica decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim no  
 modò vomitionibus exigent vi illa sua laxatrice  
 aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducen  
 & corporum inanitione ita aduersabuntur, &  
 acrimonias venenorum hebetent. Id quod euident  
 huiusmodi argumento deprehendere licet: Est  
 ut quisquam viua calce vel fece, aut cantharid  
 bus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare stat  
 rit, ut si ipsum oleo leniter illinat, exulceratione  
 non accipiet. Atqui neque vehementer adstring  
 corpus, neque refrigerari poterit, si antea perui  
 gatur. Quinetiam vomitus non ob id modò quò  
 vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamen  
 tum adfert; sed quòd assumptum virus nunquam  
 odore, coagulatis grumis aut colore, prodatur: qui  
 pe cum odore & amaritudine, meconium: colo  
 re, cerussam, gypsūm re: gramis, lac aut sangu  
 nem animalis recens ingulati ostendat. Na  
 grauis odor regestorum, leporis marini, aut ri  
 betæ veneficia deprehendit, ita ut nonnulla ab i

re



remedia peti possunt, ad idonea singulorum auxi-  
lia transeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum  
admisceatur, aut glaucium, aut adeps anserinus,  
aut pinguium carnum iura, aut lixiuum li-  
gnorum cinere factum. Vbi verò vomitus dili-  
genter citatus fuerit, ne quid in ventre coe-  
rit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere  
acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum  
hydromelite sumptum, & vina vetera libera-  
tus & pota, gallinacea iura, præpingues pisces,  
vetustæ carnes pinguesque, & quæ adipe aut re-  
centi butyro parantur. Aluum nanque subdu-  
cunt, uti diximus: & stomachum resoluentia pro-  
uocant, ipsum ad vomitionem reddunt: & vene-  
rorum acrimonias hebetant, atque meatus obstru-  
entia, celerem virium penetrationem inibent.  
Quinetiam medicamenta dantur, quæ communi  
dote prosunt: ut Lemnia terra, agaricum, abroto-  
pum, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & cala-  
minthæ, nardum gallicum, castorium, ferula vi-  
rentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij,  
laser aut laserpitium, sagapenum, peucedani suc-  
cus, aut pinacis, & radix, quam magударим ap-  
pellant, aristolochia longa, syluestris rutæ semen,  
& betonica, quam cestron nominant, folia: singu-  
la cum vino drachmæ pōdo sumi debent. Effectum  
præbet polij decoctum, & seseli, & liquida pix  
linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in  
calce operis scripta reliquimus. Communis ratio



præstandi auxilij ita se habet. Cæterum ab ijs quæ  
consueuerunt euenire, communia remedia sumpti-  
tari possunt. Ferè enim vires venenorum quàm  
plurimorum, in affectus consimiles corpus tan-  
dem redigunt. Quam ob causam plerisque com-  
munia conducunt auxilia: varia etenim sunt vene-  
norum genera, communes tamen nec multi iisdem  
affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes con-  
currentesque casus, quæ symptomata vocant,  
unum venenum sequantur. Alioquin superuacanea  
fuiſſet venenorum singulorum traditio cum suis  
remedijs ab authoribus descripta. Neque verò in  
vno eodémque promptum est inuenire, ut quis sto-  
machi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesi-  
cæ dolore vehementer crucietur, ut singuliat, ero-  
datur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, con-  
uellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat,  
veterino prematur, vertigo obuersetur, caligent  
sensus, stranguletur, siliat, sanguis erumpat, febre  
conflictetur, ægrè lotium reddat, torminibus vexetur,  
crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat,  
linore sugilletur, pullescat, desipiat, stertat, viribus  
deficiatur, & pleraque alia faciat, patiaturq: sin-  
gula enim in generales affectus deducta, pauca  
numero, & communia ea demonstrant, quæ exco-  
nare consueverunt. Quare in singulis, quæ supra  
diximus, non facile fuerit de notatum virus cogno-  
scere. Nam oris & lingue erosio, stomachi, ven-  
tris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vri-



e difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus,  
 incinatio, & in plurimis partibus quidam adu-  
 tionis sensus, non in cantharidibus modò potius re-  
 eruntur, sed in erucis quoque pinorum, & hu-  
 resle, & salamandra. Porro non modò eos, qui  
 reonum hauserunt, veterno aut sopore premi,  
 ertere, linore sugillari, torpere, refrigerari, stupe-  
 ere, toto corpore fruritum sentire, sensu priuari  
 onstat, sed eos etiam qui mandragorani aut cicu-  
 am deuorarunt. Delirium non hyoscyamus tan-  
 um infert, verum etiam quæ toxica appellantur:  
 idem aconitum, & mel quod in Heraclea Ponti-  
 a gignitur. Strangulatio non minus in fungis,  
 uim in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa,  
 ypso conspicitur. In summa, difficile vnum vni  
 veneno proprium inuenire signum, quod hau-  
 tum, gustatumque virus prodere possit: maxie-  
 nè, quòd hæc cæterorum etiam vitiorum, quæ in  
 corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæ-  
 erim in his quæ celeriter enecant, noxam signis  
 orsitane indicare possit, si ad ea respexeris, quæ  
 imus dicturi. Sed in iis, qui ad longas ægritudi-  
 nes spectant, nihil ad medendi rationem difficile,  
 luntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, vi pote-  
 um venena statim atque presentaneam vim il-  
 am perdiderunt, transmutata in longos affe-  
 tus, communia reliquorum vitiorum remedia,  
 compositionesq; flagitent, cum venefica proprie-  
 tas non amplius insit. Si verò longa sit affectio.



in aliquod diuturniorum morborum genus reci-  
det, à quibus facile fuerit medendi rationem as-  
sumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, ha-  
betenus. Consequenter quæ priuatim singulis pro-  
sunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim  
exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitia-  
lem aut maleficam vim sortiuntur, ut medicin-  
studiosi ea cauè obseruent, quæ ad rationem salu-  
tis scripta inueniuntur: quòd nonnulla eorum, qui-  
bus vtuntur, venenis sint commista. Incuria enim  
magnus adfert noxas, & sæpe continuo vsu eo-  
rum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia  
quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: cantharide  
buprestis, salamandra, pinorum erucæ, lepus ma-  
rinus, rubeta, & rana palustris mula, deورات  
hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriandrum  
cicuta, gith, psyllion. Liquamenta: meconium, opo-  
carpason, thapsiæ succus, elaterium, mandrago-  
ras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum  
thapsia, veratrum, ixia, agaricum nigrum, ephed-  
merum, quod aliqui Colchicum vocant, quòd i  
Colchide nascitur. Herbae oleræque: smilax, quam  
aliqui tithymalum appellant, Romanitaxum, so-  
lanum manicum, quod & dorycnium dicitur: sar-  
dinia herba, quæ ranunculi genus est, cornicula-  
tum papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestri-  
fungi. Ab animalibus: taurinus sanguis recens  
coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum.  
Metalla: gypsum, cerussa, calx, auripigmentum  
du



uosandarachæ genera, spuma argenti, adarce, lumbum, & quod argentum viuum dicitur. liquoribus domesticis: vinum abundè post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

## Cantharides.

## CAP. I.

**Q**uius data sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam usque cuncta erodi sentiuntur, picem aut simile quiddam cedriæ respiciunt, dextra præcordia inflammantur: urinam agrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmen- a non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fistidia urgent: animo inquantur, oboriæque ver- igine concidunt: postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nomulhil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur: mox ubi vomitione plurima reiecerunt, halicæ aut ory- æ, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum mal- uæ, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicum alihæ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, cly- stere infundatur. Præterea nitrum eisdem dan- dum, ex hydromelite, vt quæ stomacho adhuc aut intestinis adhærent, eluendo excernantur, ac des- cendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. De- tur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nu- clei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passoli-



quefactus. Inflammata autem partes, hordei farina cum mulsâ decoctâ perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsus virus ita remoratur, ut in principes se partes insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, ut pote quæ dolores & permulceant & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solium descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhaeserunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus insigatur, & stabilitatem capeffat. Gallinaceis carnibus & hœdinus, aut suillis catulis, maximè pinguibus & tenerimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem aliuum cient, atque venenorum acrimonias hebeant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto, recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè, antidota auxiliantur, cum aqua mulsâ, drachmis quatuor pota.

## Pinorum eruca.

## CAP. II.

**I**s, qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur: vehemens alui, lingue ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire videantur:

tur:



ur: corpus totum exaestuatur: fastidium urget. Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simpli oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis.

CAP. III.

**Q**ui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt, stomachi ventrisq; vehemens dolor insequitur: tam venter, quam stomachus mirum in modum, vt in aqua inter custem diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur: vrina supprimitur. Quibus eadem quæ potius cantharidibus auxiliatur. Priuatim post vomitus & vacuationes, quas clysteribus molimur, aride siccus profunt: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra.

CAP. IIII.

**S**i salamandram hauserunt, lingue inflammatio consequitur, mens & sermo præpeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque sugillantur: sepèque, diutius immorante veneno putrescentes, defluunt. Quibus præstabimus cuncta, quæ potius cantharidibus. Peculiariora verò remedia, resina pinus, aut galbanum



ex melle linctum, & aliq̃a decoctum, in quo nuclei  
pinei conterantur: vriticæ quoque folia, cum lilijs  
& oleo decocta. Pro sunt etiam oua testudinis ma-  
rinæ aut terrestres, cocta: item ranarum ius, cum  
quibus eryngij radix incocta sit.

## Ephemerum.

CAP. V.

**S**vmpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut  
syluestrem bulbum appellant, pruritus in to-  
to corpore excitatur, non secus atque ijs qui vr-  
tica aut scilla lacesuntur: interna rosi nem sen-  
tiunt: stomachus cum ingenti grauitate exæstuat.  
Ceterum inualeſcente morbo, cruor strigmenis  
admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut ijs  
qui sulamandram hauserunt, vomitione aut cly-  
steribus auxiliari conueniet: sed antea quàm ve-  
nenum inualeſcat, dandum est decoctum fron-  
dium quercus, aut glandium, aut malicorij: lac  
bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum: item  
succum sanguinalis herbæ, aut ramorum vitis,  
aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ, aut myr-  
ti cum vino. Bacca autem myrti tusæ tritaq̃;  
& aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem  
ferunt. Media castanearum tunica, similem  
effectum præbet, si cruda in aliquo supradicto-  
rum succo sumptitetur: origanum quoque cum li-  
xiuo epotum: eximiè iuuantur asinum lactis aut  
bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita  
ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desi-  
deretur.

Dor



## Dorycnium.

## CAP. VI.

**D**orycnion, quod aliqui manicon solanum  
appellauit, epotum, lactis saporem in gu-  
tu refert: continentes singultus ciet, humor lin-  
guam vexat: sanguis confertim reicitur: muco-  
sa quaedam perinde quasi dysentericus, aluo ege-  
runtur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat,  
auxilio sunt amedicta, vomitus, clyster, & quae-  
cumque potum venenū expellere possunt. Priuatim  
ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asi-  
ninum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bi-  
batur, amygdala amara, gallinacea pectora deco-  
cta. Quinetiam conchylia omnia, ita cruda quam  
tosta esse, salutare est. Conueniunt & locustae ma-  
rinae, & gammari, & pota eorundem iuscula.

## Aconitum.

## CAP. VII.

**A**conitum statim in lingua inter bibendum,  
cum adstrictione quadam dulcescit: & sub-  
inde, potissimum cum exurgere conatur, vertigines  
offundit: lacrymas ciet: grauitate pectori, & pra-  
cordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur.  
Quare venenum vomitione abigi, aut clystere per  
aliū egeri opus est. Utimur inter propinandum,  
origano, ruta, marrubio, vel absynthii decocto,  
cum vino absynthite, vel semperuino, vel abroto-  
no, vel chamaelea, aut aiuga. Prodest etiam muni  
opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum  
castorio, pipere, & ruta, equis ponderibus ex vi-  
no. Coagulum hœdi, leporis, aut hinnuli cū aceto.



ferri quoque stercus, item vinum, in quo aurum  
ferrū, argentiūve candens restinguatur, potum  
lexiviaque cum gallina & vino decocta, aut ca-  
nium bubularum præpingulum iura, cū vino sum-  
pta. Fertur & ainga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heraclia.

CAP. VIII.

**M**el in Heraclia Ponti, vbi aconitum gigni  
solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntque  
non secus affliguntur, quā qui aconitum ebibe-  
runt. Iis eadem, quæ poto aconito conueniunt: ac-  
iuantur in primis continuo vini mulsi potu, cu-  
rta folia sint adiecta.

Coriandrum.

CAP. IX.

**C**oriandrum ob odorem latere non potest  
epotum autem vocem exasperat, insaniam  
adfert, à temulentis non abhorrentem. Qui sum-  
pserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corpo-  
ris odore, venenum fatentur. Quibus post vomiti-  
onem irino oleo concitatam, vti retulimus, me-  
rum & per sese, & ex absinthio potum auxilia-  
tur. Item oleum, nec secus oua in eodem exinan-  
ta, si liquefacta in muria sorbeantur: & epotum  
muria, & ius salsum ex gallina & anseris passum  
quoque cum lexivia sumptum.

Psyllium.

CAP. X.

**P**syllion epotum, corpori toti frigus & torpo-  
rem cum exolutione & macore quodam ad-  
fert: ita ut animus despondeant. Cui omnia quæ  
exhausto coriano auxiliantur.

Cic



## Cicuta. CAP. XI.

**C**icuta pota vertiginem excitat, oculusq; caliginem offundit, ita vt minimum cernatur: singultus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteria spiritu, strangulantur. Quare inter initia, vt in reliquis, cicutam vomitu excutiemus: postmodum deiectione moliemur, vt quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in inercam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendum per interualla, in quibus proderit lac asininum, aut bubulum potui datū, aut absynthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amoni, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potum proficit.

## Taxus. CAP. XII.

**S**milax, à quibusdam luthymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus vniuerso corpori, stragulat, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicutæ conueniunt.

## Carpaci succus. CAP. XIII.

**E**potus carpaci succus soporem, citâque stragulationem adducit. Adiuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

## Sardonian herba. CAP. XIII.

**S**ardonian ranunculi herbæ generi assignatur, quæ rescentibus mentem adimit, & quædam



dam nervorum distentione labia in rictum contrahunt, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardanio risu adagium in vulgus infuso omne manavit. Post vomitum peculiariter convenit aqua mulsa & lac, liberalius epria; irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus exalficientibus: in calidam aquam oleumq; descendant, sed tum multum perfricare & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quæ convulsioni nervorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus.

CAP. XV.

**H**YOSCYAMUM potum aut comestum, similem ebrijs ab alienatione movet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asinum: si id desideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passio sumptum, & vinum falsum cum adipe suilla rectum, passioq; itidem vriticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum vino sumantur. Post ea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt, ut excoquant.

Mandragora.

CAP. XVI.

**M**ANDRAGORA si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, vomitus & aqua mulsa  
prod



proderit: postea nitrum & absynthiū ex vino dulci aut passō sumatur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatoriū, & piperis, sinapis, castorū, & rutæ tritorum in aceto: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quod si agrè reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

Meconium.

CAP. XVII.

**E** Poto papaueris succo, quem meconion vocāt, consequitur veternus cum perfrictione & pruritu vehemente, ita ut sepe inualefcente veneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo vomitionē, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosacco calido: merum cum absynthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passō, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, vel cum saturietæ aut origani decocto, cum vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrū prodest iurium pinguium vsus, cum vino aut passō: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. CAP. XVIII.

**Q**uod corniculatū papauer appellant, & potus, & cibo eadem inferre cōsuevit, quæ papaueris



pauere succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum. CAP. XIX.

**Q**uod pharicon vocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem nervorum partum affert, cum cōuulsione & delirio. Oportet autem post vacationes vinum absynthii temperari dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen aliqui vocauerunt: aut spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: de rasumque caput illinire hordeacea farina cum acetato, & trita ruta.

Toxicum. CAP. XX.

**T**oxicum ex eo nominari videtur, quod barbarorum sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflammatione torquentur: incoercitus furor varias ijs imagines obuersat: quare vix medicinae locus est: raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim ijs conuenit, quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, figi, aut ilicis cortex cum lacte tritus, malique colonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet, amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum vitæ tempus degunt.

Ixiā.



## Ixia. CAP. XXI.

**I**Xia, quæ vlepthonon appellatur, inter potandū  
aliquid oryimo simile gustu & odore redolet;  
vehementem lingue inflammationē excitat: men-  
tem mouet: omnes excrementorum exitus suppri-  
mit: strepitum cum animi deliquio ciēt, iſq; in-  
estina latrant, nec egeritur quicquam. Post ro-  
nitionem aluumq; resolutam, auxilium præstat  
aqua, in qua absynthium maduerit, ex vino lar-  
giore, aut aceto mulso pota: rutaq; syluestris semē,  
aut laseris radix: item tragorigani decoctum, cum  
aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina tere-  
binthina, aut nardo, aut castorio, aut laſerpitio,  
quorum singuli oboli cōueniunt. Quin & nuces in  
glandes ex vino, cum resina, castorio, & ruta tri-  
ta, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Itidem  
chamæleæ aut thapsiæ aut absynthij succi sicilicet  
cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

## Cerulea. CAP. XXII.

**C**erulea suo colore proditur: sumpta enim,  
mox palatum, gingiue, lingua, & commis-  
suræ dentium, candore quodam inficiuntur: sin-  
gultus, tussis, ac lingue ariditatem excitat: q̄s  
extrema frigescent, mens labat, membra torpe-  
scent. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut  
ficuum aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut  
sesamam ex vino tritam, vel lixiuā ex sarmentis  
factam, amaricinum oleum aut irinum, persico-  
rum ossa cum hordei decocto: columbina oia cum  
thure



thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi  
quod ulmus plorat, aut humor, quem ulmea f-  
lia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoq  
vomant. Conuenit etiam thapsie succus, aut sca-  
monia, cum aqua mulsa potus.

Fungi.

CAP. XXIII.

**F**ungorum alij genere, alij copia ledunt:  
mnestamen strangulatus suspendio simili  
concitant. Quibus confestim succurrendum: com-  
muniter ex oleo vomere cogendi: mirificè iuu-  
lixinia ex sarmentis aut pyrastris surculis, epa-  
cum sale, posca & nitro. Fructus, aut folia py-  
rastris cum fungis decocta, strangulantem illa-  
rim auferunt, esiatatque eisdem auxiliantur. A-  
uersus fungos gallinacea oua cum posca prop-  
ciunt, adiecta aristolochiae drachma: item abs-  
thium cum vino melleq; sumptum, & ex aqua p-  
tum: apiastrum ex nitro, panacis radix & sem-  
in vino, sex vini cremata cum aqua, aitramentu-  
sutorium ex aceto, radix, vel sinapis, aut nastu-  
rium esu prosunt.

Gypsum.

CAP. XXIIII.

**L**apidescens gypsum strangulationem cre-  
quare eadem proferenda sunt, quae man-  
fungis, auxilia, & ad haec maluae decoctum, qu-  
etiam olei vicem pensat: vipote cum pingue sit, e-  
mendo lubricas vias & faciles reddit, de radiq  
corpora non sinit. Quod ubi duratur in lapide  
gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua  
n



malsa, aut sicorum decocto: & lixiuia è ficulneo  
 cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore  
 pota: & origanum aut thymum cum lixiuia, aut  
 aceto, aut passo: hique decocto malua proluendi.

## Sanguis taurinus. CAP. XXV.

**T**auri recens iugulati sanguis epotus, spi-  
 randi difficultatem strangulatamque conci-  
 at: faucium tonsillarumque meatus cum nervorū  
 distentione praecludit, lingua rubescit: dentes in-  
 sufficiuntur, & quaedam concreti sanguinis vesti-  
 gia, inter eorum commissuras restant. Quare vo-  
 mitum vitabimus: sanguinis enim globi attracti  
 illo in sublime relati, magis gula inculcantur. Da-  
 ri ergo opus est quae concretum sanguinem discu-  
 tiunt & aluum subducunt. Grossi lacteo succo tur-  
 gentes ex posca, & mirum per sese, auxiliantur:  
 nec secus coagulum onine cum aceto & laserpitij  
 radice, aut lasere: itidem & brassica semen, & è  
 cinere ficulneo lixiuia: conyzæ folia cum pipere,  
 & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Iis qui  
 seruantur, stercorosa & fluida per sedem egeri  
 consueuerunt. Stomachum aluumque hordeacea fa-  
 rina ex aqua mulsu perungere oportet.

## Laccoagulatum. CAP. XXVI.

**E**os, qui coagulatum lac hauserunt, frequens  
 illico strangulatio inuadit, quod in globulos  
 quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro an-  
 tidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæ-  
 pius cogimus. Damus & calamithæ folia ari-

K



da, item succum, aut laserpiti radicem, aut laser cum posca: thymumque ex vino, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla falsilago obiciatur, quoniam magis lac coiret, & in casum densaretur. Neque illos vomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gula angustius insinuans, strangulat.

## Argenti spuma. CAP. XXVII.

**S**puma argenti pota, stomacho, ventri, & intestinis grauitatem cum magnis torminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina viderat, vrinamque suppressit: corpus intumet, plumbumque deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum vomitionem, potum syluestris homini semen, myrrhae drachma octo, absynthium, hyssopum, apy semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum palumbis finum, cum nardo & vino.

## Argentum viuum. CAP. XXVIII.

**A**rgentum viuum potum, eadem quae spuma argenti infert, eisdemque utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

## Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

## CAP. XXIX.

**C**alx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota aluum & intestina cum vehementi erosionem excruciant. Praebenda cuncta quae suo adinstuillorum acrimoniam hebetant, ac soluiunt, & facilem lubricamque aluum reddunt, cuiusmodi ibisci & maluae succus est: natura enim utriusque perlubric



frica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen  
ragi herbae, vel oryzae lacq; cum aqua mulsa co-  
niosum, iura pinguis, & boni succi.

Lepus marinus. CAP. XXX.

**Q**ui leporem marinum biberunt, piscium vi-  
rus olent: procedente tempore, alius dolo-  
re afficitur, & vrina sistitur: & si  
quando eam reddere contingat, purpureum colo-  
rem referet. Omne piscis genus auersantur, &  
radio habent: foetido ac graui sudore manant: bi-  
liosus vomitus, interdum sanguini promiscuus,  
subsequitur. Huius dandum lac asinum, vel pas-  
sum continuè, aut radicis maluae foliorumq; deco-  
ctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut ve-  
ratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum  
aqua mulsa, puniciq; mali acinus. Cedria cum vi-  
no efficax est: auferitur sanguis, vi tepet, po-  
tus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernemurq;  
solis fluminalibus cancris vesci possunt, bibuntq;  
eos admisto vino, adiutisque ab his percoquant.  
Cumq; appetere & comesse pisce coeperint, suae sa-  
lutis indicium habent.

Rubeta & palustris rana.

CAP. XXXI.

**R**ubeta aut rana palustris assumpta tumo-  
res ciet: pallor corpus vehementer decolo-  
rat, vi planè buxeū spectetur: spirandi difficultas  
torquet, & grauis halitus oris, singuliisque & in-  
uita interdum genitura profusio consequitur. Ad-



inuuantur secundum vomitionem multo meri potu.  
 & arūdinis radice binis drachmis, aut cyperi tot-  
 idem. Breuiter, cogendi sunt, ut vehementi ambu-  
 lationi & cursui se credant, ob torporem quo cor-  
 ripiuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo.

CAP. XXXII.

**D**Euorat & cum aqua hirudines, si ori ventri-  
 culi adherent, tractione partium, nonnul-  
 lam suctionis imaginem præbent: eo enim argu-  
 mento hausta hirudo deprehenditur. Has muria  
 sorbitione excutit, & cyrenaicus succus, aut laser-  
 pitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis gle-  
 bula, cum posca. Nitrum ex aqua gargarizatur,  
 aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si fau-  
 cibus hæreant, iniecta lupinorum farina, a qua fri-  
 gida ore contineatur, & ad eam hirudines exi-  
 lient. Prouidendum etiam ijs, quæ et si ferendi auxi-  
 lij gratia tradantur, non minora tamen cæteris ve-  
 nenis pericula sæpius adferunt. Qualia sunt album  
 veratrum, thapsia, elaterium, agaricum nigrum:  
 siquidem ea stre-  
 gulatius concitant, aut immodi-  
 cas deiectione-  
 ouent. Quibus ea medentur, quæ  
 in fungorum mentione & similibus retulimus.  
 Nimios autem deiectionum impetus, medicamen-  
 tis, quæ excrementa supprimunt, coercerimus. Ne-  
 que negligenda quæ parū quidem nocere vidētur:  
 interim verò vitā in discrimina agunt. Quo in nu-  
 mero sunt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, pappi  
 recentes: flores autē sunt eius spinæ, quæ cactos di-  
 citur.



titur. Eos, qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. CAP. XXXIII.

**A**qua frigida abundè pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus & dolores insert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminenti solvunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclarè auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatum est, præsertim & quod sanguine, & quod scinco temperatur. Verùm quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione supersedemus.

Venenata. CAP. XXXIII.

**D**E bestijs, quæ virus eiaculantur, & exitibus venenis, ideò scribere aggredimur, ut tota curationis remediumque ratio ad umbilicū perducatur: siquidem pars hæc non minus quàm ceteræ aliæ, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum, quæ imbi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisque alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris virus insipientibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficijs, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ



sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum  
quæ nonnihil auxiliij ferunt. Omnia autẽ in prom-  
ptu, & ad manum habere artificem oportet, pro-  
pter urgẽtem sepe numero necessitatem: siquidem  
pauci è venenis & virulentis animantibus, tarda  
& grassantia sensim pericula cient, ita vt dilatio-  
nem admittant: pleraque verò præsentaneam per-  
niciem afferunt. Hominum autem partim male  
alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficium ita  
temperant, vt spatium curanti liberum non relin-  
quant: partim sceleris admissi conscientia, aut  
tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ve-  
neno, mortem sibi consciscere conantur. Qui post-  
ea deprehensi, aut resipientes, & vitæ cupidi,  
præsentaneam opem poscunt. Non desunt, qui ho-  
stiles sagittas illinentes, aut fontes aquasque pu-  
teanas hac labe polluentes, certam & inuitabi-  
lem aduersarijs perniciem moliuntur. In quibus  
ipsis etsi maleficium non subito, sed aliquantò  
post grassari natura sua comparatum est, tamen  
nisi primo quaq; tempore coerceatur, & remedijs  
subinde excipiat, frustra tandem succurritur,  
occupatus iam corporibus exitiali vi veneni. Pro-  
inde non vulgari industria diligentiaque in ea re  
utendum est, vt quod in alijs incommodis ars con-  
suevit, in his quoque salutem mortalibus præbeat.  
Quin & apud priscos genus hoc vnum existima-  
batur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat:  
sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes  
præ



præcautionem, & modum præcauentem, salubrem  
 sanantisque medium statuentes, parua & leui su-  
 pra modum persuasione decepti. Siquidem tres in  
 humanis corporibus constitutiones esse contem-  
 dunt: unam, qua sani degimus: alteram, qua sin-  
 istra valetudine corpora laborant: tertiam, que  
 medium inter utrasque locū sibi vendicat. In que  
 positi, sanitatem specie sentiuntur, facileq; in mor-  
 bos & pericula concidunt, ob vim corruptricem,  
 que corporibus nostris incumbit: quemadmo-  
 dum in ijs videre licet, quos excandescens rabie  
 canis momorderit, necdum tamen aquam hor-  
 rent. In ijs quoque qui cantharidas hauserunt, sed  
 nondum vrinae tormento cruciantur. Tripartitō  
 igitur artem digerere, triplicique corporis consti-  
 tutioni merito respondere trahunt. Salubrem par-  
 tem esse volunt, que sanitatem tuetur: præca-  
 uentem, eandemque prohibentem, que obstat quō-  
 minus in morbos incidant: & sanantem, qua vi-  
 tia discutiuntur. Quibus ita responderi potest,  
 quod primum ex ista ratiocinatione nō tres cor-  
 poris tantum, sed quatuor haberi constitutiones  
 fatendum esset: quippe ut aliqui sunt, qui necdum  
 morbo laborant, morbo tamen maxime ob impen-  
 dentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam  
 priore morbo defuncti, nondum tamen secundæ va-  
 letudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à mor-  
 bo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui vi-  
 riū recreationē & robur desiderant. Sed quem-



admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subiicere par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus utimur auxilijs, altiore scarificatu, vstionibus, amputatione, derodētibus epithematu, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enimvero sunt usque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellēt, quæ morbos arceāt. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tu agendi modus, omnino auxiliare remediariamque vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur, qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis confluentur. Neque id silentio prætereundum, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à vitul



culentis animalibus venenisq; contrahuntur, vocantur cacos, id est, quorum ratio minime iniri potest. Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ: quapropter questionibus observatoris artis, & eius, quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus verum deprehenditur, affectus huiusmodi cacos esse. Nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarijs usum exhibet, hand facili coniectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cacos eos affectus concedimus, qui ab exitiis venenis, & ammantibus, quæ viru lento morsu sæviunt, contrahuntur. Nam quod ad opus nonnullum usum præbet, datque medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cæcum, nullius causæ obnoxium reputatur: se magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm ut sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario quem Plustarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nosse quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis, & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans, ut quamvis exiguo sint corpore, vixq; conspectui subiiciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quandam corporis exiguitatem,



vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpj ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morsu conficiunt, attingitur: quorum aliqua vehementes cruciatus excitant: alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ præsentaneam perniciem moliantur. Aut quantum est quod à phalangj morsu ingeritur, & uniuersum corpus excruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole constent. Ergo quòd hæc affectus referantur, consiliuit inter omnes. Verum quòd exactè deprehensum sit, vim quandam ipsi inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus molestiarum, quæ exoriuntur, nobis causâ sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum. Nec quicquam inuenietur usque adeò contentions studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quàm à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat, quod inter vilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quenam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos lædat, incomprehensa communis causæ, quæ proprius inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit cum deprehensa est. Ideò Erasistratus empiricorum pertinaciam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, insciatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo, quem de causis  
scrip



scripsit commentario apertissime prodidit, candido  
 signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit,  
 qui se dicant in quibusdam, ut in venenis, serpen-  
 tium icibus, & ceteris id genus trita medendi  
 ratione contentos esse. Neque satisfacturam sibi  
 obseruationem eam, quæ à causarum comprehen-  
 sione separata est. Primum enim genere compre-  
 hendi facile possunt. Quod autem sit letifera vis,  
 corporaq; permixta, ita ut perimat, ex his, quæ  
 per genus, non per speciem vagantur, curatio-  
 nem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expu-  
 gnare liceat. Cum verò subiungit: Ad aquam dule-  
 cem, & potui idoneam venit quis, & ante obser-  
 uationem ad vomitum, ad vulneris dilatationem,  
 ad demorsæ parvis suclum, cucurbitulas adfixit,  
 partem incidit, vrentia medicamenta, aut ea quæ  
 vim eadem adipiscuntur admouit, postremò par-  
 tem amputauit: secū reputauit medicamina, quæ  
 per summam cutim ferre, & applicari solita, im-  
 missa ad intima pernicipi repugnarent. Hæc ita-  
 que, quæ disseruit Erasistratus, veritati consen-  
 tanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos  
 demirari licet, qui mortiferam vim corporibus  
 illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse cau-  
 sam diffiteantur, verum rudiusculè nomini atten-  
 dunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθορο-  
 ποιοῦς, id est mortifera, nominatur: φθороποιοῦς  
 autem nullius officij alius esse potest, quàm cau-  
 sa. Aliunt hæc nomina, μαρσιππῶ, & αἰα-  
 καλίη



καλύπτειν, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro virtute, sed nuda enuntiatione comprehenduntur. Enimvero quemadmodum in his vocibus μαρμαριπ & ἀνὰ καλύπτειν, partes neque certos, neque principes retinent significatus: sic in hoc verbo φθοροποιεῖν partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque causarum aliquas evidentes esse, quæ dum aduersam valetudinem creantur, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quædam continentes, quæ permanent postquam morbum excitarunt, hoc est, quibus presentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, effectus augentur: decrementibus, minuantur: & cum desinunt, eadem finiuntur: quibus solus ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropæon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit: quemadmodum accidit is, qui à rabioso cane sunt demorfi. Quod si neque evidens causa, neque continens fuerit, neque per se, neque alterius confortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropæon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod aut



item asserunt, vocabula quædam in se non ha-  
 bere partes rerum significatrices, sed nuda, &  
 implici pronuntiatione ficta esse, sateri neces-  
 se est. Verum non omnia, sed per pauca talem nati-  
 uis conditionem existimandum est: neque enim  
 τοις in hoc nomine φθοροποιον perinde atque  
 assumptitia profertur, sed longè principem obti-  
 net significationem. Quemadmodum enim φθο-  
 ρα, id est corruptionis nomen mutationem in pe-  
 ius significat, sic hoc verbum τοις sumi debet,  
 ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem φθo-  
 ρα secum habeat, declaret: neq; prorsus id signi-  
 ficat, quod omnes palim audiunt, & huic simile  
 redditur, τω αὐτῷ ἐχθρῷ δ' ἰψῷ. Si dant à corru-  
 ptione sanus fieri morbum, concedunt utique vim  
 in huiusmodi verbo τοις subesse, siquidem  
 aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne au-  
 tem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas  
 causas, quæ corporibus subiciuntur, idq; tam in  
 lethalibus venenis, quàm in ijs, quæ corporibus  
 ingeruntur. Verùm nonnihil subiacere causarum  
 differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt, non  
 exactam diuisionem assumentes. Qui verò se do-  
 gmaticos profitentur, causam esse partim præpa-  
 rantem, partim continentem asserant: ut inguinis  
 ulcus, & inguinariâ febrim, & quæ affectui tum  
 assistat, tum etiam separetur, ut à fractu præci-  
 pitatio. In summa, quoties quidpiam suapte natu-  
 ra causa fuerit, nec vlla diuisione comprehenditur,  
 vit



vitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ  
idem genus sortiuntur. Sed quid phthoropæ  
causa sit, nomen ipsum argumento est, & in  
quæ contingunt aperius ostenditur. Quid aliæ  
causæ arbitrantur esse post impressum à serpen-  
tibus ictum, quàm ex animante vim, & illapsu  
in corpora virum? Neque enim frigus, neque æstus  
neque sectionem corporis, neque crudelitatem, ne  
aliud quicquam simile causari possunt. Verum  
quoniam causarum differentiis gaudent, & al-  
quis continentes, aliis evidentes appellant: ip-  
sæ dicendum, utroque istorum modorum evidente  
quidem causam esse, quod effectum præcedit, &  
quod corporis substantiam præoccupat continen-  
tem verò, quod morbis præsentibus adest, quasi  
parata recedunt, quæ cum ipsa evenerant. Sed  
his hætenus. Statuendum itaque mortiferam vi-  
intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsam  
principem facere scopum oportet. Et antequam  
ad ima decumbant morbi, variis modis est ce-  
tandum, donec vis tota corporibus excutiat. Mo-  
dò enim revocari debet ea parte, qua pestis in-  
traverit: modò aliqua alia, præsertim principa-  
tum non obtinente, antè coërceatur, quam altius  
irrepens viscera tangat: aut eius pernicies elua-  
tur, retundaturque, cum iam membratim perua-  
tura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris re-  
mitionibus: si morsu impressa, scarificatione, &  
fixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscrip-  
tione

n



ne, nonnunquam amputatione extremae partis,  
vocantur. Retinentur verò infusione, & impa-  
sione medicamentorū acrium cohibentur. Haec simul  
etque arcere virus, & eluere possunt. Restin-  
guuntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo  
nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quae acri-  
toma sint praedita. Postremò deiectione alui, evo-  
catus sudor, & alia quaedam in commune, quae  
membratim demonstrabimus, auxiliantur. Ve-  
rumenimvero nō leuissimam modò materiam, sed  
& magnitudinē, & tempus, pro scopo considera-  
re oportet. Etenim ab ijs remedia quā plurimum  
discrimen capeffunt. A magnitudine quidem,  
cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus  
pericula minantur: alia putredines altas aut ex-  
teriores excitant alia vehemētissimos dolores aut  
caecos cient: alia vix medicamentis cedunt, & ma-  
gis minūse molestias excitant. Oportet autem  
ea, quae pericula ferunt - perniciosis auxilijs  
expugnari & minus infesta, mitioribus. Quippe  
absurdum fuerit in grauioribus, segrioribus me-  
dicamentis homines in discrimen adducere in mi-  
noribus verò, vehemētium auxiliorū iniuria cor-  
pus lacescere. Finitio à temporibus in promptu  
est. hoc enim subito in pericula, & praesentes mo-  
lestias adducit: illud verò sensim, & dilatas in  
diem longam aut breuiorem producit. Itaque in  
acutis quidem confestim multa simul auxilia re-  
praesentari oportet: reliquis, paulatim. Hae qua-  
dam



dam artis formula breuiter descripta sint. Iam mem-  
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorsorum  
ab eo. CAP. XXXV.

**D**E rabiosi canis morsu sermonem alijs pra-  
psumimus, quod id animal domesticum a  
frequens esse consuevit, & in rabiem saepius agi-  
tur, ac perit, ab eoque cauere difficile: inde peri-  
culum inuitabile hominem manet, nisi multi-  
utatur auxilijs. Canis plerumque flagrantissimis  
aestibus in rabiem effertur: interdum quoti-  
dianis frigoribus inceserunt. Rabiosus autem potum, &  
escam auersatur largam spumantemque pituita-  
naribus, & ore proicit: toruere & solito tristitia  
intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, &  
aque ferus hominesque, tam familiares, quam igno-  
tos mordet: nec protinus infestum quicquam in-  
fligit, nisi, ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille  
qui ab aquae metu hydrophobicus Graeca est voce  
appellatus, contrahitur. Euenit autem cum disten-  
sione nervorum, totiusque corporis rubore, praeser-  
tim faciei, cum sudore, & languore quodam.  
Aliqui aurae splendorem fugiunt: alij sine ulla  
doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam, qui  
canum more latratibus edant, & obuiam facti  
morsu adoriuntur, ac mordendo simili vitio labo-  
rificant. Proinde ex ijs, qui hoc vitium senserint  
neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex his-  
toria vnum aut alterum euasisse audiamus: siquidem  
de



em Eudemus superasse quendam affirmat. The-  
 nisonem aliqui demorsum in hunc furorem inci-  
 sse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico  
 quam expauescenti morem gereret, & officium  
 exhiberet, quidam naturarum concordia similem  
 miraxisse affectum: sed post multos tandem cru-  
 atus seruatum extitisse. Molestissimum itaque  
 genus morbi, à quo multos, antequam ipsam expe-  
 rentur, vindicauimus: & complures ab alijs me-  
 dicis seruatos nouimus.

### Remedia demorsorum à cane rabioso.

#### CAP. XXXVI.

**R**atio medendi duplex: vna communis, qua  
 vtendum in omnes morsus, quos virulenta  
 animantes impresserunt: alia peculiaris priuataq;  
 orum duntaxat, quos rabiosi canes momorderint:  
 ne nonnullis quidem summam opem ferre consue-  
 rit: alijs verò inutilis, maximè qui ex multo iam  
 tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc perti-  
 ent, primum exponemus, deinde cursim perstrin-  
 emus, quæ ad communem medendi rationem per-  
 tinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarnientis al-  
 e vitis cremare oportet, & cinerem eorum quàm  
 minutissimè tritum habere reconditum: itidem  
 gentianæ radicem tussam cribratamque reponere.  
 Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in  
 uaternos cyathos meraci vini, bina cineris can-  
 rorum cochlearia, vnumq; gentianæ cōijciantur:  
 nec in polentæ dilutioris modum subacta, quatri-

L.



duo bibantur. Inter principia medicamentum h  
modo detur. Atqui si ab illato morfu biu terni  
dies fluxerint, curationem auspicabimur à trip  
cato pondere, supra id quod ab initio reuulim  
Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus aux  
lium, quod & plerisque vnum satisfecit, eoque cu  
fiducia vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxil  
contra inenitabile periculum muniamur, ni  
ceteris vti prohibet. Satius autem multo fuer  
etiamsi in vanum recidat, medicamentorum i  
humanos tolerare cruciatus, quàm per inertia  
ac desidium in discrimen adduci. Nec ita in dem  
sis à rabioso animali maiora vulnera vereri opo  
tet, vti minora, & vlcusculus cutis similia: quip  
maiori vulnere confertim copiosus sanguis em  
ians, potest non nihil virulenti liquoris exhauri  
quod in minoribus non accidit: quin à maiorib  
abscedentes carnes hinc auferre, & labia acies  
pelli circumscribere, & prehensam hamulo aut  
fella carnem amputare oportet. In vtrisque cir  
stantia loca altioribus vlusculis scarificanda  
copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne veneni  
membratum insinuetur. Cucurbitula cum mu  
flamma agglutinata id iuuamenti præstant, vt  
neni vis extrahatur. Contra virulentos id  
vltio expeditissimum est auxilium, vi pote  
ignis cetera viribus præstet, simul quod virus  
met, & ferri penitus non patiatur: simul qu  
pars ignem experta, postea non vulgare fume  
n



mentum curationi futurae præbeat, manente diu-  
tius exulceratione. Animaduertendum ex eo tem-  
pore cum crusta decident, ne vlceris ora coale-  
cant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest ad-  
multum, idq; præstitutum tempus, vlcerationes  
& sordidas adhuc & inflammationem minantes,  
prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamen-  
tum optimè præstabit, & syluestre allium detri-  
tum: item caepe, succusq; præsertim Cyrenaicus,  
aut qui Medicus, aut Paribicus appellatur. Tritici  
straw tam mansa, quam non mansa imponantur:  
si quidem subacta p:stare à persusione vulnera di-  
atant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid  
isciscere arbitrentur, quod suapte natura resi-  
tat: verum id certum non est. Cæterum tempe-  
tius eorum vsus minimè est contemnendus. Si  
verò, quod per sepe accidit, ante dies præfinitos ci-  
catrices coirent, committerenturque, manum po-  
tulabunt: nanque eas diducere, carnemque scal-  
pello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi  
verò propositum tempus præterit, vlceris ad cicatri-  
cem ducendum, & emplastro, quod è salibus confi-  
gitur, locus comprehendendus: nec multò post sina-  
pismo vtendum.

Ratio victus in morfu rabiosi canis.

CAP. XXXVII.

**Q**ua ad partem istam pertinent præsidia,  
ita se habent. Cæterum victus rationem  
ex ijs quæ veneno aduersantur, come

L 2



Elura quadam colligere oportet, simul ut veneni  
 vires hebetet resinguatque, simul ut arceat, quò  
 minus ad intima pernicies illabatur. Etenim as-  
 sumpta, perniciosarum virium penetrationi resi-  
 stunt. Quorum utrumque præstare potest vini mera-  
 cioris, passi, & lactis potus: quippe qui hæc omnia  
 capiunt ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quod  
 omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo  
 alliorum, porrorum, ceparumque cibus: quòd ea  
 difficulter conficiantur, vixque aboleantur. Nam  
 multos dies huius cibi qualitates remanent, quo  
 tempore nec euincuntur, nec permulantur à morti-  
 feris, sed contrariis illa vis expugnatur. Cui rei  
 antidotorum usus accommodatur, & theriacis  
 Mithridatij, & eius, quod eupatorio temperatur.  
 Denique omnium, quæ magnam aromatum par-  
 tem sibi vendicant: quippe aromata omnia viri-  
 bus & substantijs agrè permulantur: quare in cor-  
 poribus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet.  
 Nosse conuenit, paucorem aquæ non statò definitoque  
 tempore exoriri: plurimum tamen ad quadrage-  
 simum usque diem neglectis differri consuevit. Pos-  
 semestre etiam nonnullos inuadit: quendam pos-  
 annum aquam horruisse constat. Quæ nobis visi-  
 comperta fuere. Narrant & aliquos post septen-  
 nium aquæ metu fuisse têtatos. Inter principia de-  
 morforum à cane rabiosa curandi ratio talis est. Vi-  
 rum enim uero si ea, quæ retulimus auxilia, primi  
 diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnem  
 ci



circinare, nec vñtionem experiri operæpretium est. Non enim quod iam pertransiit, salus euocare possent. Nulla vtique istius rei occasio aut vilitas, sed in cassum corpora doloribus sternentur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectione magnum præbet iuuamentum, vt pote cum mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ colocynthisdem recipit hiera. Item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Caterum sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi sinapisinique alternatim per corpus totum adiiciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quocum fiducia non semel atque iterum, sed frequenter ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus vti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, vt quidam, qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam vitio tentatos nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus: iam ad alia, quæ venenatis morsibus sentire consuevit, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxi-



lū pręstare possunt. Postremò subneclentur etiam  
venenata, quę nullis cedunt remedijs.

Notę eorum, qui à venenatis demorsī  
sunt. CAP. XXXVIII.

**D**Emorsis à phalangijs locus quidem ipse,  
quasi ab impacto aculeo rubet, non intume-  
scens, nec per ambitum calidus est, sed mediocri-  
ter humescit: ubi verò contrariorum occursum re-  
fixit, consequitur corpore toto tremor, distentio-  
nes poplitum & inguinum, convulsionibus non dis-  
similes. In lumbis collectio exoritur, & perpetua  
urinę libido laceffit, multaque reddendis excre-  
mentis colluctatio. Uniuersa cute frigidus sudor  
emanat, collacrymant oculi, offusisq; nebulis cas-  
ligant. Si scolopendra aut dicta ophioclene, mor-  
sum intulit, locus per ambitum luore sugilla-  
tur, & computrescit: interdumque, licet rarò,  
saculentus atque ruber cernitur. A morsu ipso  
exulcerari locus incipit, vlcusque id negotium ex-  
hibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto cor-  
pore prurigo sentitur. Scorpionis morsu inflam-  
mari statim incipit locus, & indurefcit, ac in-  
tensus rubet, vicissimq; dolore premitur. Modò  
siquidem exæstuat, modò frigore occupatur. La-  
bor repentè fatigat, & aliquando meliusculè ha-  
bet, aliquando verò recrudesceit. Consequitur su-  
dor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corpo-  
ris partes refrigescunt, inguina extolluntur; per  
sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor mem-  
bra



ra decolorat & dolor, tanquam ex pungente  
cu, per vniuersam cutem sentitur. Si marina  
astinaca percussit, protinus accidunt molesti  
dolores, assidue conuulsiones, lassitudo, & im=  
becillitas. Mens percussus labat, postea obmute=  
sunt: oculi caligant. Percussus autem locus in  
ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita  
bæstufescit, vt tangentem non sentiat. Hunc si  
quis premat, atra sanies, crassa & malè olens ex=  
eruntur. A mure araneo percussis, circa mor=  
im in orbem inflammatio exoritur, nigraque pu=  
tula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ par=  
es liuent. Rupta pustula, depiscens vlcus, non  
i dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum  
quoque tormina, difficultas vrinæ, & frigida asper=  
inis offusio consequuntur. Si vipera momora=  
lit, corpus intumet, vehementer arescit, subal=  
idumque colorem concipit. Sanies à vulnere pro=  
induitur, primum suppinguis, mox cruenta: pu=  
tulae adustis similes erumpunt: & antea depa=  
rens vlcus, quod in proxima repens, non summa  
nodò corporis, sed intima quoque corripit: gingi=  
uæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa  
ecur erumpit: tormina & biliosi vomitus sequun=  
tur. Sopor, tremor, & vrinæ difficultas accedit,  
& frigidus sudor offunditur. Consimilia cue=  
iunt ijs, qui à cæcilia nomine, aut amphibiaena  
lemor si sunt, eademq; ferè auxiliantur: quare hoc  
venenū priuatam descriptionem sortitum non est,



neque visum est dignum quod alio genere comprehendatur. A dryino morsis pustula molestique dolores incidunt, praesertim qua diluta et saeva emissarium subest: quinetiam erosio, torminaque consequuntur. Ab haemorrhoidibus icterus vehementes cruciatus accidunt, qui angusta contractaque corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit: & quacunque parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta exciuntur, profluensque sanguis in globos coit. A pulmone sanguinem extusunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriuntur. Quos dysipsa percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisque usque eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine vlla intercapidine excruciet: etsi potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt iis, qui antea potus nihil hauserint. Quare propter continuam sitim, & pester, & causon, aut dysipsa appellatur. Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & lividum ac ingenuadit. Sanies ex eo multa, & atra, & maulens, non secus atque iis, quae serpunt ulceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui viperni icterui similis est, putridum vlcus sequitur. Canes antea, ut in aqua inter cutem, praeumid defluunt. Leihargo corripuntur, & veterano pressisomnos captant. Erasistratus eos iocinere, in iustino ieiunio, coloque conflictari auctor est. Quip



dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. A cerasse percussus locus attollitur, cum duritia pustulosus. E plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale intenditur: mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore nervorum distenti commoriuntur. Ab aspidæ ictus vulnus exiguum prorsus, quasi ab adaucta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino levis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit: At vir perit absque labore, virès atque discolor. Mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellitur: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent. Hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro, quem de medicaminibus & venenis condidit, de vocato basilisco scitè ita refert, Cùm basiliscus morderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus ei aculantur, comites notæ ita se habent. Transeuntes utique ad mendendi rationem, primùm, ut fieri poterit, de comitibus disseremus.

Communis curatio in omnes ictus virulentos. CAP. XXXIX.

**A**Duersus quidem omnem animalis ictum. Quod venenum vibrat, oris succio conuenit. Sugentem verò oportet ieiunum nō esse, sed & ei

L 5



bum sumpſiſſe, & vino os abluiſſe: poſtea exiguum olei in ore continens plagam exugat. Locuſ ipſe ſpongia fouendus, deinde ſcarificandus: ſed vlcuſcula altius imprimere expedit, quo viroſa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & ſectio, ſcarificatione longè potentius opitulantur: nanque ab iſ duo peculiaria præſidia ſunt. Vnum, quod virus è loco tollitur. Alterum, quod eius venem pars, quæ ad interiora graſſatur, cum multo copioſo que ſanguine excernitur. Quòd ſi locus ſectionem non admittat, cucurbitulæ cum largiori flamma adſigendæ ſunt. Sed iam de ſtione ſuprà in rabioſorum morſu diſſerimus. Si verò iſta pars, ut pote extrema, eam ſectionem commodè non reſpuat, præſertim in omnibus ſerpentium iſtibus, ut aſpidis, ceraſtæ, ſimiliumq; proculdubio amputanda eſt. Conuenientiora ſuprà dictis auxilia ſunt, quæ epulhemata vocant. Imponatur ſarmentitius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio ſt. illatio ſubactus, garo, & acris ſaſamento: pirri, capæ, & allia modò minutiffimè cōtrita illinuntur, modò cremata vulneribus inijciuntur. Quinetiam diſſecti gallinarum pulli, cum maximè tepent, percuffo loco applicentur. Nec deſunt qui hiſce tanquam diſcordia quadam naturali pugnantibus viantur: verum huius rationem inire facillimū fuerit. Gallinæ enim calida natura prædita ſunt, argumento, quod deuoratum inſigne virus conſciant, & aridiſſima quæq; ſemina conſumunt.



sumant, item nonnunquam arenas lapillosq; inglu-  
tie sua deuoratos, dissoluunt. Itaque animantis ad-  
moti calore aditus spiritus, ab icta parte impe-  
tum capeffens exiliensq; secum venenum exigit.  
Nec me fugit quid in Aegypto fieri soleat. Cum  
spicias Aegypti metunt, ollam picis paratam ha-  
bent, & appensam fasciam: tunc enim maximè ser-  
pentium iniurijs expauescunt, tum propter spici-  
legi tempus, tum quòd opacis simul abdite spelun-  
cis & cauernis, densoque aruorum caespite deli-  
tescunt. Molestissima enim animalia & virus  
eruclantia, Aegyptus in campis ferre consuevit.  
Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, mor-  
sum intulerunt, qui adsunt, fasciam in ollam picis  
conijciunt, & semel aut iterum brachium aut  
crus paulum supra vulnus obligant, & artissi-  
mè duo è presentibus dstringunt, locumq; secun-  
tes, qua circumactus est laqueus, picem instil-  
lant. Cumque satis vulnus excepisse videtur, la-  
queum resoluunt, & capis alijsq; suprà memora-  
tis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito  
& feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugi-  
ter innoletur. Conuenit & cedria, & sinum ca-  
prarum ex vino decoctum. Locum aceto calido,  
salamintha in lotio, maris aqua, aut acida miria  
decocta, foueri salutare est. Quinetiam non desunt  
emplastra vehementissima, & calidissima, quæ  
venenum elicere, expugnare, & discutere possunt.  
Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, &  
cachu



cachrye componuntur : de quibus consequente  
erit tractandum. Erasistratus autē non iniuste  
reprehensione eos incesit , qui incognitas ad hū  
vsum facultates conscripserunt , ut elephanti fel  
crocodilive sanguinem , ouāque testudinis , & con  
similia. Nare cum iuuantia quadam literis tradi  
disse videntur , planē in hęc sola incidentibu  
imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt , cū  
difficilē , nisi regia facultate , perueſtigari pos  
ſint : neque , quō noſtra fides iſ obſtringatur , fre  
quenti obſervatione , ſufficiens experimentū prę  
ſtiterint. Quę autem ad communem omniū vſum  
pertinent , quęq; facile ſuppeditari , & omnibus  
ſerpente percuffus auxilium ferre queunt , ſubiu  
genda videntur. Intubus itaq; & erica , & aſtr  
galus , cum aceto pota , contra omnes ſerpentiū  
morſus auxiliantur. Item bitumen , & virētes pl  
tani pilula in vino diluto coctę , & paliuri deco  
ctum : radix ariſtolochię , & eryngy : decoct  
etiam lauri bacca & deuorata , pipēque largiū  
eſitatum , ruta , anethum , & cyclaminus : com  
porrorum priuatim ex pane , aut allium , aut cę  
pe , ſalſamentaq; quā acerrima : origani deco  
ctum cum vino potum , fœniculi , pulegi , cala  
minthę , porrorūq; ſuccus cum melle deſorptus.  
Hęc quidem à plantis conquiruntur. Ab animan  
tibus verò quadam vtiliter peti ſolent , gallina  
ceorum cerebella in cibo , leporinum coagulum  
cum vino , itidem caſtorij ſextans : teſtes mari



et testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxilia medicamenta est. Commendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur: ex qua bis drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent, hætenus. Percussus i serpente prodest alui deiection, diffluens sudor, urina copiose reddita. Sunt & compositæ quæ ad potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum vino. Itidem sylvestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ, & cum cruce succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent: dantur ex his terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

#### Peculiaria remedia virulentorum

ictuum.

CAP. XL.

**I**Nter ferientium venenatorum notus nihil de ipsis & apibus articulatum digestimus, quod conspicua omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus virarumque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-

neum



neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua solus. Phalangiorum ictibus siculneum cinerem, adiecto sale trito, & vino, imponere oportet, aut radicem sylvestris punice quam tenuissimam tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaq; eiusdem illinenda. La uacris perpetim utendum, & propinandum ab-  
 rotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritus, plantani corticem, & trifoliae herbae semen: priuatum autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina conuenit. Item myrica fructus & chamaepitys, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt qui fluuiatilis cancri expressi succum, cum lacte, assumpto apij semine, confestim molestus liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sal quam leuissimè tritus ex aceto vulneri inspargendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida muria fouendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpyllum, aut calaminta, aut ruta sylvestris. Percussis à scorpione, praesenti est auxilio siculneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse, qui ictum vibravit, tritus, & percusso loco impositus, suae plagae remedium est, ob caecam quandam naturarum (ut constat) discordiam, quae antipathia appellatur. Praeterea tritus & impositus cum sale, lini semine, & alibea, scorpium conuenit. Sulphur ignem



ignem non expertum, resina terebinthina exce-  
ptum, & emplastri modo adiectum auxiliatur.  
Itidem galbanum ad splenij formam ductum, &  
calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei  
in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ  
herbæ tritum, & vulnere inieclū opitulatur. Hæc  
ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm effi-  
cacissimis potionibus vtendū, cuiusmodi sunt ari-  
stolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum  
vino, tusa gentiana, & pulegium decoctū, & bac-  
ca lauri pauco numero trita, & calamintha cum  
posca, in qua magnopere discoqui debet: cupres-  
sus cum vino & ruta, nec secus ficulneum lac, la-  
serpitium, si ad sit: sin desideretur, peucedani succo  
vtendum. Efficax est potus trifoliij, & ocymij  
semen. Horum autem omnium vicem pensat iu-  
gis lauacri vsus, euocatus sudor, & diluta vini po-  
tiones. Ei, qui marina pastinaca iicitur, omnia  
quæ de viperarum morsu paulò post referemus, si-  
mili modo conueniunt. Peculiariter autem iclus  
à marino scorpione, & dracone inferuntur, quibz  
molestos cruciatus cient: interdum autem, sed ra-  
rò, nomas excitant. Quibus absynthij, saluæ, aut  
sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca  
diuisa & vulnere imposita, sui iclus medela est.  
Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galba-  
no spleniū, per se vulnere exterius imp situm, vt  
medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea fa-  
rina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse  
qui



qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus  
sui beneficia luit: resistunt quoque acini dulcis pue-  
nici decocti, & illiti. Item porri, & alia contri-  
ta, nec non aquæ calidæ frotus: sed hæc ad locum  
pertinent. Prodest pitum abrotoni decoctum, ma-  
ximè si in vino detur. Præterea serpyllum, & ga-  
banum, & eruca vino madefacta, recētes cupres-  
si pilulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mul-  
so, & pyrethrum cum vino, & chamaeleonis herba  
radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tra-  
diderunt, tritum murem araneum contra suo-  
ictus commodè bibi. Quam historiam apud alio  
inuentam, dignam dumtaxat censuimus, quæ an-  
notaretur. Alij asseuerant demorsum non aliâ  
exulcerari, nisi prægnās mus araneus fuerit: tum  
sanè auxiliari ferunt. Si vipera morsum im-  
presbit, finum caprinum cum vino, studiose im-  
positum opitulatur. Item laurus, & abrotonum  
& galbanum splenij loco superiectum, & origa-  
num viride inditum. Pulli gallinarum discerpti  
& confestim admoti: erui farina vino subacta  
radicis cortex usque eò tusus, ut in puluerem so-  
lutus abeat, & scilla tostata: detritum chamæme-  
lum hordeaceæ farine cataplasma in aceto mulso  
preparatum: sed locus antè eo calido foveatur  
Hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus ru-  
bus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui fo-  
lio constantem auxiliari produnt. Leporini coag-  
li in vino terni oboli bibuntur, & porracei succ  
hen



hemina in mero, & foliorum apiaſtri ſuccus, &  
ſylueſtris ruta: hæc in vino potari debent. Vinum  
frequenter bibendum, allia mādenda, & cepæ, &  
porri recentes, ſaſſamenta acerrima, & opipara.  
Simplicia hæc ſunt. Percuſſus à vipera præclare  
auxiliatur medicamentum, quod myrrha, piperis,  
caſtorei, floris portulacæ ſeminiſque, dimidio aceta  
bulo conſtat: hæc omnia in Creſtico paſſo teruntur,  
aut in alio probato. Eraſiſtratus in eo libro, qui  
τοπι δυνάμειον, id eſt de viribus, inſcribitur, ple  
raque alia tradidit, quæ iſtus ab vipera auxilium  
ferre poſſunt: inter quæ talia maximè laudantur,  
Gallinacea cerebella cum vino pota, ſemen ſatiuæ  
braſſicæ tritum, & acetabuli menſura cum vino  
potum. Quinetiam bonū eſt digitum in liquidam  
picem intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit  
elutus, bibere. Hæc ſunt, quæ contra vipera iſtus  
auxiliantur. De amphibæna mentionem hoc loco  
fecimus, quoniam ferè remedijs ad viperas ſcriptis,  
percuſſi ab ea adiuuari ſoleant. A dryino iſtus con  
uenit ariſtolochia cum vino pota, trifolium herba,  
radix haſtulæ regiæ ſimiliter aſſumpta, & fru  
ctus ex omni quercus genere, & iuſe ilicis radi  
ces, & illiæ parti iſtæ auxiliantur. Hæmorrhoi  
di pſadiſque morſus velut immedicabiles à pleriſq;  
maiorum deplorati relinquebantur: quare ſi pecu  
liaribus contra diſſadem remedijs egeamus, com  
munia experiri opera pretium erit. Protinus au  
tem ſcarificatione vi, vſtionem facere, & ſilocus

M



patiatur, extremorum amputatione opus erit: con-  
 sequenter quàm acerrima cataplasmata admove-  
 re, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit,  
 acres cibos, maxime à salsamentis, vitiles esse. Me-  
 racæ potiones & lauacra prosunt, quæ subinde in-  
 teriecto breui spatio assumenda sunt, priusquam  
 morbi genus emergerit: quo semel erumpente, opè  
 ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæmor-  
 rhoi eadem prosunt. Insuper quæ in commune opi-  
 tulantur, ut scarificationes, vstiones, acres cibi,  
 meraci potus, & quæ nunc in dipsade definiui-  
 mus. Quinetiam decocta vitis folia, & cum melle  
 trita. Si morsum natrix adegit, prodest origanum  
 tritum & aqua subactum, lixiua cum oleo indita,  
 aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minu-  
 tim contrita, & hordei farina cum aqua & melle  
 colliquata. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ dra-  
 chmæ in potione poscæ cyathis duobus, deinceps  
 marrubij succus, vel decoctum alterius cum vi-  
 no. Fauus recens datur in aceto. Morsis à cenchri-  
 dio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine il-  
 litus, & satireia trita, & syluestris ruta, & ser-  
 pyllum cum duabus hastulæ regiæ drachmis, &  
 tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Item  
 cardimomum & gentiana. Si cerasites percusse-  
 rit, cita partis amputatio suffragatur: quare sine  
 mora ictam partem amputare, aut scalpro confe-  
 stim circuncidere, & ijs similia prosequi oportet.  
 Vrentia insuper reliquis admoenda, siquidem  
 virns



virus hoc veneno basilisci simile est. In, qui ab  
aspide feriuntur, quæ de ceraSTE scripta sunt auxi-  
lia dari debent. Nam venenum hoc, quemadmo-  
dum basilisci, aut sanguis bubulus, celerrimè in  
arterijs sanguinem cogit. Ad basilisci mor-  
sum, ut Erasistratus author est, auxi-  
liatur castorij drachma in vino  
pota: item papaveris suc-  
cus. Ictuum remedia  
ita se habent.

SEXTI ET VLTIMI  
LIBRI FINIS.



NOTHA ET DIOSCORIDI FALS  
adscripta, quæ ut facile, si quis ita uel  
suis singula locis applicentur, numeri  
notantur: quorum primus Dioscori  
paginam, secundus uersum signat.

6.12. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs the  
de, ab alijs vrania, à nonnullis catharon aut the  
mastros, à Romanis marica radix, à quibusdam  
diola, ab alijs opertritos, ab alijs consecratrix  
Aegyptijs nar appellatur.

8.2. Aliqui choron aphrodisias, Romani  
neream, aut radicem nauticam, Galli piper ap  
vocant.

9.6. Romani iunci radicem aut iuncum.

13.23. Magi sanguinem Martis, Latini per  
sam, alij bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij  
rea, alij nardum rusticum, Galli bacchar, Het  
sci succinum: odorata herba est, qua in coronan  
tis utuntur.

15.8. Quibus odor inest cinnamomo proxim  
asperum siccu[m]que solum amat. Eius radix,  
pituitis, conuulsis, in tussi vetere, & spirandi diffic  
tate, & si vrina agrè redditur, opifera est: men  
ciet, contra serpentium ictus, eam in vino bib  
salutare est. Folia, ut quæ adstringant, illita ca  
tis doloribus, oculorum inflammationibus, incip



ribus ag ylopys, mammis tumentibus à partu, igni-  
bus sacris auxiliantur. Odor somnū gignit. Crate-  
nas herbarius de eo ita scriptum reliquit: Asariū.

24.17. Alij sphagnon, alij phasganon, Syri dia-  
xylon vocant.

27.5. Ab aliquibus castor, ab alijs cynomorphos,  
à Magis Herculis sanguis appellatur.

28.23. Symphyton aliqui vocant, alij persicam,  
alij medicā, alij orestiū, alij nectariō, alij cleoniā:  
alij idæabaton, aut phlomū idæum, Latini termi-  
narium, aut enulam campanam, Aegyptij lenen.

68.29. Iuniperum paruum Græci arceuthi-  
da, aliqui mnesitheum, alij acatalidem, Aphri  
Zuorinsipet, Aegyptij libyū, Galli iupicellum,  
Romani iuniperum vocant.

69.15. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus ma-  
gna, quam aliqui syluestrem cupressum appel-  
lant, alij mnesitheum, alij acateram, Romani iu-  
niperum, vulgò cognita est, cupresso assimilis: aspe-  
ris maritimisque locis plerumque nascitur, easdem  
quas supradicta vires habens.

69.17. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Ro-  
manis herba Sabina appellatur.

76.7. Rhamnum alij persephonion vocant, alij  
leucacantham, Romani spinam albam, aut ceruas-  
lem spinam, Aphri atadim.

76.21. Halimum alij damafonium vocant, alij  
erymon, alij britanicā, alij rhabdion, alij basilion,  
Magi Mercurij basim, aut Osiridis diadema, alij



# DIOSCORIDIS

elystephanon, aut sacrum caule, Pythagoras anth-  
noros, Aegyptij asontiri, alij asphen, alij ascalur  
alij asariphen, Latini albucium aut ampelucian

85.6. Agnon alij agymon, alij lygon vocan-  
alij amictamienon, alij tridaetylon, Magi semno-  
alij hamaideos, Aegyptij sum, Romani salicem n-  
rinam, alij piper agreste, alij lecristicum.

122.20. Eorum venter sale conditus, & in vn-  
bra siccatus, contra eximias vasautiones medic-  
mentorum, trium drachmarum pondere, praefer-  
est auxilio: quandoquidem protinus deiectiones c-  
hibet. Teri autem debet in farinam, & aqua su-  
actus dari.

138.18. Telin, alij carpon, alij buceron, alij eg-  
ceron, alij ceraitiden, Latini fenum graecum app-  
lant, Aegyptij itasin.

159.5. Aliqui linocalamin vocant, alij anno-  
alij linon agrion, Romani linum, Pœni xeraphon

164.15. Thermon, Romani lupinum, Aegypt-  
brechon vocant.

165.10. Gongylen sativam, alij gongylida, a-  
golgosium, Romani rapum vocant.

166.10. Alj polyides eryngiū, Aphri thorph-

167.5. Sylvestris raphanus, quam Roma-  
armoraciam vocant, alij montanum raphanum  
alij apium, alij ischada, alij chamaebalanum. R-  
mani etiam radicem sylvestrem: ramulos tenu-  
iunceaos, duos siue tres spargit, rubentes: folijs ru-  
sylvestris, oblongioribus, & angustioribus: semi-



N O T A.

paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, py-  
ri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet.  
Pars radice superior vomitione bilem pituitamq;  
extrahit, inferior per aluum, tota susque deq; pur-  
gationes mouet. Quod si tibi in animo est succum  
extrahere, radix in fictili mergitur, & qui  
supernatat succus pinna eximitur. Is se squi obolo  
potus, utraque parte purgat.

168.12. Romani napium dicunt.

168.14. Aegyptij echlotripam appellant, alij  
riplam, Romani blitum, Daci bles.

168.21. Pythagoras anthema vocauit, Zoroas-  
tres diadema, Aegyptij chocortem, Magi lienem  
caprae, aut muris urinam.

169.12. Atraphaxin, Romani atriplicem, Aeg-  
gyptij ochi vocant.

169.19. Cramben Romani brassicam vocant.

170.22. Romani rusticam appellant.

172.13. Portulaca syluestris. Cap. Syluestris  
portulaca, quam aliqui aiZon syluestre vocant,  
alij telephion, Romani illecebram, alij portula-  
cam, Aphri mæmoen, Daci lax, Aegyptij mo-  
chmutim, folijs pusillis, ad satiuam accedentibus,  
hirsutis, latioribus: nascitur in petrosis, non-  
numquam in hortis, folia oleæ habet, minora mul-  
tò, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex vna ra-  
dice multos, in terra sessiles, qui manducati bo-  
num succum pariunt, viscosi, & aliquantùm sal-  
si. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: discuit



# DIOSCORIDIS

*strum.us, cum axungia illita.*

173.3. Aliqui petraeon, alij myacanhan, alij myon vocant.

173.27. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probation, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij polyneuro, Magi eurechnemona, Aegyptij aphonh, Romani plantaginem, Hispani thesaricam, Poeni atyrcon.

175.10. Syri ius plantaginis, & calamintha cum melle produnt ijs mederi, quos vires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

175.12. Aliqui aquatilem anagallida, alij darenion, alij lauer, alij schinon aromaticum vocant.

175.21. Alij Veneris coronam, Romani veneaream, aut eusteralem.

176.24. Aliquibus ammonos, alijs astrion, Poeni atirsite, Romanis caciatrix, alijs stilago, alijs sanguinaria dicitur.

177.2. Söchon asperum alij cichorium vocant, Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

177.26. Alij picrida appellant, Aegyptij agon, Romani intubum.

180.9. Thridaca hemeron, Romani lactucam sativam, Aegyptij embrosi dicunt.

180.21. Magi sanguinem Titani, Zoroastres pherumbrum, Romani lactucam sylvestrem appellant.

181.8. Romani bisacutum, Aegyptij dorisatrium, Syri



N O T H A.

Syri adonium, Aphri tiriēta appellant.

181.16. Romani herbam scanariam, aut acnalam nominant.

181.21. Alij caucum, alij myitin, Democritus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedem puli, Aegyptij seselin vocant.

181.28. Eucomon Romani Erucam vocant, Aegyptij ethrericem, Pæni asuric.

182.27. Alij cynomorion appellant, à similitudine canini genitalis, alij leonem, Cyprij thyrsinē, communiter lycon.

185.27. Crommyon aliqui polyidos vocant, Magi calabotim, Romani cepam.

186.26. Græci scorodon, alij geboscon, alij elaphoscon vocant.

188.9. Romani sinape vocant.

186.9. Cardamon alijs cynocardamon, alijs iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Romanis nasturtium dicitur.

189.25. Aliqui thlaspidion, alij sinapi Persicū, alij myiten, alij sylvestre synapi, alij dasinophon, alij myopteron, alij bitron, Aegyptij suitepsum, Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedē galinaceum vocant.

190.20. Aliqui chamæplion, Magi Hercules alphita, Aegyptij erethmon.

194.4. Ab aliquibus cerdon, ab alijs catharsis, ab alijs struthocamelus, à quibusdam chamærrhyton, à Magis callirrhhyton, ab Aegyptijs æno, à



# DIOSCORIDIS

Pænis syris, à Latinis lanaria herba, aut radice  
la appellatur.

124.18. A quibusdam cissamhemon, ab alijs  
cissophyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyothe  
ron, ab alijs silene, à Zoroastre triumphalites, ab  
Osthane aspho, à Magis miaspho, Aegyptijs thesce,  
à Romanis rapum terræ, aut terræ umbilicus, ab  
alijs arcar vocatur.

160.14. Dracunculus. Cap. Dragunculum ma-  
gnum aliqui aron, alijs isaron, alijs iaron, alijs hiera  
cium, alijs biaron, alijs armiagrion, alijs ciperida vo-  
cant: in umbrosis sepibus gignitur. Caulem habet  
rectum, lævè, duum cubitorum, baculi crassitudine,  
versicoloribus draconum maculis, purpureis tamè  
euvinctibus: folia rumicis, inflexa: fructum sum-  
mo caule facit, racemosum, coloris primum cine-  
racei, mox per maturitatem incrocum & purpu-  
ram vergentis: radicem prægrandem, rotundam,  
candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, &  
dum maturescit, succus exprimitur, siccaturq; in  
umbra. Radix quoque messibus effoditur, elotaq;  
particulatim conciditur, & funiculo transfixa  
siccatur in umbra. Cum diluta potione, crudam  
coctamve, cum melle delingi prodest, contra ore  
thopnæas, rupta, convulsa, tussim, & destillatio-  
nes: pota cum vino venerem stimulat: ulcera quæ  
cacoethe vocantur atque phagedenica, expurgat,  
præsertim cum vite alba. ex ea & melle collyria  
ad fistulas & partus evocandos componuntur: ad  
vi



# NOTHA.

vitiliginēs cum melle, efficaciter illinitur: polypōs  
& carcinomata absumit. Succus ad oculorū me-  
licamenta, item contra nubeculas, caliginem, al-  
buginesq; effectum prabet: herbae radicisq; odor,  
tenueros conceptus abortu vitiat: item si triginta  
grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-  
cum cum oleo aurium doloribus insudere: quin-  
etiam folia, utpote quae adstringant, vulneribus re-  
centibus imposuere, & cocta in vino permionibus.  
Qui folia manibus affricuerit, aut radicem ex-  
merit, posse à vipera feriri insciantur.

197.23. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracon-  
tiam, Cyprij colocasion dicunt.

198.13. Graeci asphodelon, alij narthecion, Roma-  
ni albucum vocant.

199.11. Floret mēsisibus albucū. Quare equi-  
noctio verno, antequam semen adolenerit, deme-  
rendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupidita-  
tem inhibere, quod herbarius Crataeus asseuerat:  
addiditq; sanare podagra dolores, si drachmae pon-  
dere bibatur.

200.7. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe im-  
positi, tumores ac tubercula velocissimè ad suppu-  
rationem perducunt, & rumpunt.

202.4. Aliqui cynosbaton, alij capriam, alij  
corui malum, alij ophioscorodon, alij phyllostae-  
phylon, quidam thalliam, aut petream, alij olo-  
phyton, alij ionitē, nonnulli oligochloron, aut acon-  
tion, aut hippomanes, alij trichomanes, Magi po-  
tera:



# DIOSCORIDIS

tera, alij pētheron, aut cor lupi, alij alofchorodon,  
alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum synapi  
aut inturim, Aphri herbiæathon.

203.16. Ranunculum aliqui syluestre apium vo-  
cant.

204.8. Anemonen, alij ugriam, aut nigram vo-  
cant, alij anemonen phœnicam, alij enemion, nō-  
nulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinen,  
aut barbylam, Osthānes berilion, item ornios cera-  
nion, Pythagoras atractilida, Magi cnicū agriam,  
Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

205.16. Aliquibus ænone vocatur, alijs an-  
themis, alijs homonœa, aliquibus flos campestris,  
Romanis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia,  
Gallis corona.

205.22. Ea, vt herbarius Cratenus author est,  
contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata  
eius farina cum nitro, & sulphure ignem non ex-  
perto contra vitiligines efficax est: easq; sicco lin-  
teo antea confictas in balneis sanat: facit & ad  
scabiem.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone,  
quam artemonem aliqui, alij arselam, aut sarco-  
collam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syl-  
uestri papaueri similis est. Recens trita interci-  
siones impositus sanat: oculorum inflammationes  
mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur:  
vulnera conglutinat: convulsis, & vellicatibus im-  
posita medetur, inflammationibus vtilis, contra  
ser



NOTIA.

serpentium morsus cum vino bibitur.

205.24. Anagallis purpurea, quibusdam aëritis aut ægitis vocatur, alijs sauritis, Magis oculi sanguis, aut chelidonium: Romanis macia, Hetrusceis masytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphron. Anagallis communis, quibusdam corchoron, alijs halicacabon, alijs Zeliaurus, Magis nyctleritis, Aegyptijs mecij, Romanis aneciaton, Aphris asfirisæ.

206.12. Aliquibus citharon, alijs cissaron, alijs chrysocarpos, alijs poetica, alijs corymbethra, alijs cyston, alijs dionysia, alijs ihytherion, alijs persis, alijs cemos, alijs asplenos, Romanis sylua mater, alijs hedera, Gallis suibites.

207.17. Chelidonium magnam nonnulli pæoniam vocant, alijs crataam, alijs aybium, alijs glauciam, alijs pandios radix, quidam philomedion, alijs othonion, Romani fabium, Galli ithonan, Aegyptij mohoth, Daci crustana.

209.13. Auricula muris. Cap. Myosota alijs myoton, alijs anhyllion, alijs alsinen, nonnulli myorhocon, alijs myrthosplenon, Latini muris auriculam vocant, Aphri labatholabat. Nomen ideo accepit, quod muscutorum aures folijs imitetur. Lucos & sabulosa loca amat, ideo alsine dicta est. Ea helxine similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflammationibus conuenienter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur: in totum eadem



# DIOSCORIDIS

dem potest, quæ helxine.

209.24. Isatis sativa aliquibus augion, alijs egne, Magis arufion, Romanis gluta aut glastum dicitur.

210.8. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, sativum glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosque ramulos proferre; in cacumine autem folliculos linguae speciem representantes, in quibus semen continetur melanthio simile, caulēque supra binum cubitorum altitudinem attolli: sylvestre verò nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiores: florem purpureum, aut caeruleum, fructū cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito divisum.

210.10. Aliqui sylvestre sempernivum, alij portulacam sylvestrem appellant, Romani illecebrā, Aegyptij anoth, Aphri atirtopurin.

213.3. Aliqui rhiam vocant.

213.29. Aliqui centauriam radicem, alij aloem Gallicam, alij narcē, alij chironion, Dardani aloetin, Romani gentianam aut cicendiam, alij ciminalē vocant.

214.29. Alijs melocarpos, alijs teuxinon, Latine aristolochia.

216.4. Appellatur à quibusdam erarisa, & melecaprum, ephestios, lestitu, pyxionyx, Dardanon, ionitus, Gallis theximion, Aegyptijs sphoeoph, Siculis chamamelon, Italus malum

ter



# NOTHA.

terra, Dacus absinthium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus, & petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si indore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur: vulnera imposita sanat: carcinomatibus marium, cum cypero, & dracunculi semine, & nelle prodest: rigoribus medetur, cocta in oleo aut idipe suillo, illitaq; Crateus herbarius, & Galenus, eadem de hac tradiderunt, & praeterea podagricis eam auxiliari.

216.6. Glycyrrhizam aliqui ponticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticam, alij glycyphyton, alique scythion, alij adipson, alij sylithram, alij libyestason, alij homœnomœon, alij peemithaomœon, Latini dulcem radicem appellare.

216.24. Aliqui narcem vocant, alij limnesion, alij maronem, alij plectroniam, alij chironiam, alij imnestim, Magi Hercules sanguinem, Romani thieri, & vneferam, & fel terra.

217.17. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quae inflammationem minantur, pluraque scateat remedijs: pulsationes vulnerum, urinae stillicidia, calculosorum cruciatus, clyster e immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad orientem spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

217.19. Aliqui limnesion, alij helleboriten, alij maranton, Magi Hercules sanguinem, Latini febrif



# DIOSCORIDIS

brisugam, alij auram, multi radicem, Daci tuberculam appellant.

218.27. Quibusdā chrysisceptron, alijs ixia, Romanis carduus varinus, Aegyptijs epher dicitur, alijs ephibosechin.

219.18. Pancarpon aliqui, alij vlophonon, alij ixiam, alij cynomaxon, alij ocimoides, alij cnidion coccon, alij cynoxylon, Latini carduum nigrum aut vernilaginem, Aegyptij sobel vocant.

220.22. Aliqui crocodilion vocāt, alij chamaeleonem, alij onocardion, alij Veneris lauacrū, Romani labrum Veneris, alij carduum Veneris, Aegyptij seseneor, alij chir, alij meleta, Daci sciaram.

221.11. Aliqui agriocinnarā, alij donacitin, alij erysisceptrum vocant, Romani spinam albam aut regiam, alij carduum ramptarium.

221.26. Quae acanthis aliquibus dicitur.

222.3. Alias ptherusa, alias pyracantha nominatur, in Aegypto cnius.

222.12. Aliqui phrynion, aliqui acidoton.

222.25. Acantham aut herpacantham, quidam melamphyllon, aliqui topiariam, alij mamolariā, quidam crepulam vocant.

224.7. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij ischiada vocant, Romani spinam albam.

225.2. Aliqui eryngen, alij eryneren, alij caryon, alij gorginion, alij hermion, alij origanum, chlounion, alij myracanthon, alij moly, Aegyptij crobysen, Magi syferton, Romani capitulum



N O T H A.

m Martis, Daci sicupnoëx, Hispani centumca-  
ta, Aphri cherdam, aly oriam chloëm, aly chida  
pellant.

228.22. Aloë aliquibus amphibion, aly hermi-  
on, aly eryngion, aly tragoceros, Romanis aloa,  
arbaris aloë dicitur.

227.16. Aegyptij somi, Romani absynthium.

228.24. Latini Sandonicum vocant.

229.13. aly abutonon, aly absynthium, aly her-  
ion, aly cholopæon, aly absynthiomenon, aly the-  
phthorion, aly procampylon, Magi aëuraphæ-  
cos, aly cynanchiten, Romani absynthium ponti-  
um, nonnulli thelythamnum, aly glycin ancona vo-  
cant.

230.7. aliqui later vocant, aly cassialam, Aegy-  
ptij pesalem.

230.26. aliqui syncliopa, aly alcibiadem, aly  
incration, nonnulli styphoniam, Aegyptij suphlo,  
Magi pythons oculum, Romani sciolebinam vocant.

232.37. vers. vlt. Glichona aly blechron, aly ar-  
ncanthon, Latini pulegium vocant, Galli aluo-  
m, Aphri apoleium, quidam galisopsim.

233.16. aly embactron, aly belonacos, aly ar-  
medeion, aly cretica, quibusdam ephemeron,  
nonnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidion,  
et helbunon, Romanus vstilago rustica.

234.19. aly elaphoboscon, aliqui phacon, aly  
osmun, aly phagnon, Aegyptij becion, Roma-



# DIOSCORIDIS

ni saluam vocant.

235.4. Hedysmon satium alij miniham, alij calaminiham, Latini mentham vocant, alij nepetam, Aegyptiis, alij pherithrumerthumonthu, alij perxo, alij maceto.

235.24. quidam cephaloton, alij epithymid. alij thyrson, Latini thymum, Aegyptiis stephane. Daci mosulam.

237.23. aliqui xygin syluestrem, alij polion vocant, Aegyptiis meruopyum, Latini serpyllum.

238.14. aliqui nominant amaracum, alij triphyllon, alij agathides, alij cnecon, alij acapnon. Pythagoras thramben, Aegyptiis sopho, Armeniis myuron, Magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidori Latini maioranam.

239.20. aliqui origanida, aut hysobriū vocant.

229.28. alij syluestre basilicum, Latinis ocimum strum.

240.25. ruta montana, quam aliqui rhyt montanam vocant: & hortensis, quam Aegyptiis epnubū, Syri harmala, alij besafa, Aphri churma.

242.25. Syluestris ruta Cap. Rutam syluestre aliqui appellant hypericon, alij androsomon, alij coron, alij chamapityn, Romani hederalem, alij centonalem, Aphri churma semmaced. odor seminis resinofus est, ideo chamapitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens, folia rufigura: flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant, unde androsomon vocitarunt. Ram



hirsuti, siliqua teretes, hordei effigie, in quibus  
men nigrum resnam olens, gignitur incultus &  
peris. Urinam ciet, menses appositum trahit, pota-  
m vino quartana liberat. Folia cum semine am-  
istis illitu medentur, & diebus quadraginta ep-  
ischiadicos sanant.

243.13. aliqui sylvestre leucoion appellant.

247.2. aliqui cerascomen vocant, Latini rusti-  
um pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij babi-  
ron, Aphri sicham.

247.19. nonnulli sphagnon vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida  
vocant, alij anicetum, Magi cyncephali genitu-  
um, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini ane-  
um, Aphri sicciriam, Aegyptij arachu, Daci  
ulpum.

250.18. siue cuminum syluaticum.

251.11. Animi, Latini ammiu Alex. andrinum,  
quidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri gæd.

252.6. alysonchites, Romanis lampuca, Pœnis  
thileas.

252.17. aliqui sonchiten, alij entimon agrion,  
Romani inzybum sylvestrem vocant.

253.18. à quibusdam pedion, ab alijs hydroseli-  
on agrion, Romanis apium rusticum appellatur.

253.19. aliqui petroselinon sylvestre appellant,  
Aegyptij anonum.



# DIOSCORIDIS

254.6. aliqui grielon, alijs agrioselinum.

255.22. aliqui elaphicon, alijs nephron, alijs ophi-  
genion, nonnulli ophioclonon, aliqui herpyæen, ali-  
lymen vocant, Romani cerui ocellum, Aegyptij ch-  
min, Aphri ascaucau.

256.25. hippomarathrum, aliqui marathm, ali-  
marathrum agrion, Aegyptij sampsoih, Magi ihy-  
marnolion, Latini fœniculum erraticum, aliq-  
mion, Galli fistrameor.

257.29. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs par-  
lysis, alijs camarus, alijs hyacinthus, alijs delphi-  
nias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosan-  
dron, aut cronion, Romanus bucinus minor voc-  
tatur.

258.14. aliqui dorycnion, alijs pyrinon, alijs pyr-  
ton, aut pyrothron, alijs arnon pyriten, Magi pyri-  
ten, Romani saluarem vocant.

258.25. aliquibus xea aut campsanema appel-  
latur.

260.19. aliqui arangem vocant, alijs phalan-  
gion, alijs asterion, nonnulli nesyrin aut sphondy-  
lin, quidam chorodanion, aut cenanthem, Roman-  
herbã rutinalem, Aegyptij apsapher, Magi osirin

261.21. aliqui agrion vocant, alijs agriophyllon  
Magi bonum demonem, Romani satariam.

263.8. aliqui melanthium, alijs mecona agrio-  
melana, Romani papauer nigrum appellant.

269. 2. herba est, ex qua ammoniacum fit sus-  
samen, quod thymama vocant, aliqui agaxyllon  
ali



N O T H A.

li cristheum, alij heliustrum, Romani guttam.

271.18. aliqui ampelocarpon, alij omphalocarpon, nonnulli philanthropon vocant.

271.29. aliqui aspidion, alij haplophyllon, alij ccyseton, alij adyseton nuncupant.

272.12. aliqui cission, alij cissophyllon.

272.20. aliqui armyron vocant, alij cnicon sylvestre, alij aspidion, Magi aphedron, Aegypti chezon, Romani praesepium, aliqui fusum agrestem, ly colum rusticam.

273.2. quidam clinopedion, alij polygonaton, alij cymus colum, alij echeonymon vocant.

273.8. Edocuit experientia contritos in vino aliorum ramulos, iis qui affectibus laborant, quæ violentie vocantur, magno esse praesidio.

273.10. aliqui cleonicon, alij ocimoides, alij xonyron vocant.

273.21. aliquibus leontopodion, alijs leuceoron, alijs leontion, alijs doris, aut doricteris, alijs lychnis, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rhaeion, alijs cornutum papaver, alijs anemone, Romanus patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

275.4. aliqui athanaton vocant, alij acylonton, alij ballarion, alij geranopodion, quidam corymbion, aliqui taurion, alij sceptron, aut maloion, Aegypti semeon, Magi sanguinem apocathemenes, Romani gemcularem aut ballariam.

275.7. aliàs tragonaton, aliàs atocion, aliàs hieracopodion, aut lampas vocatur, Aegyptiys



# DIOSCORIDIS

semura, Magis apocathemenes taurus, Romanis a-  
grete intubum.

275.13. Crinon basilicon alij crinanthemom vo-  
cant, alij gallirion, Magi Mariis sanguinem, Oslh-  
nes aurem crocodili, Aegyptij symphaphon, qui-  
dam tialon, Latini lilium, aliqui rosam iconis, Sy-  
ri sasa, Aphri abiblabon.

276.5. Alij magnū vocant, aliqui naphi han, al-  
notianoscemin, alij nosprasson, alij nothera, alij no-  
chelin aut nostellin, alij nophryn, alij gnotorim, al-  
gnotera, Romani apnium, aut medatam, aut vlce-  
rariam, aut marrubium nigrū, alij canthurinum.  
Aegyptij asphon, magi Isionis sanguinem.

276.18. Alij melitæon, alij meliphryllon, alij er-  
thran, alij temeie, Latini apiastrum aut citragi-  
nem, Galli merisimorion vocant.

277.5. Prasion, alij eupatorion, alij phyllopha-  
res, alij tripedilon, alij camelopodion, Aegyptij as-  
rophen, Magi tauri sanguinem, aliqui aphedron, al-  
Horigenturam, Latini marrubium, aliqui labeo-  
niam, Aphri atierberxiam.

278.6. Aliqui phyllin, alij acaulon, alij sylue-  
stre lapathum vocitant.

278.16. Alijs leucacantha dicitur.

278.26. Alij cucion vocant, Romani trifolium  
acutum, aut odoratum.

279.24. Polium montanum, aliqui teuthrion  
alij pheux aspidion, alij achamenin, alij ebenitin  
alij melosinon, nonnulli belion, quidam leontocha-

ror



on vocant.

280.22. Aliqui scorbion, alij pleuritin, alij dy-  
osmon, alij syluestrem calaminum, quidam cha-  
nadrin, alij mithridanion, Magi Podotis sangui-  
nem, Aegyptij apho, Romani trissagine palustrem  
appellant.

281.13. Bechion quidam rhichion, alij petri-  
sam vocant, alij peganon, alij puthion, alij pagona-  
on, alij chamæleucen, alij procheton, alij arcophy-  
on, alij chamægeron, Aegyptij saarihan, Latini  
ussilaginem, quidam pharphariam aut pustulagi-  
nem, Bessi asa.

281.28. Quibusdam polyclonos, alijs monoclo-  
nos, alijs toxitesia, alijs ephesia, alijs anactorios,  
alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, Magis homi-  
is sanguis, alijs chrysanthemon, Romanus valen-  
ia, aut serpyllum, aut herba regia, aut artemisia,  
alijs rapium, aut tertana, Gallis pona, Dacus quosle  
licitur.

282.16. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuio-  
ribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum du-  
tus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sam-  
suchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans,  
herbam cum amygdalino oleo bene contundat in  
malagmatu lentorem, & stomacho imponat, sani-  
ati restituetur: qui neruorum dolore cruciantur,  
in succum ex rosaceo illinant, sanantur.

282.18. Romani caprum syluaticum vocant,  
quidam botryn, alij apium rusticum, Aegyptij



merfeon.

283. 6. Aliqui Pelonitin, aliȳ tricam, aliȳ gera  
nogeronta, Romani vchinaſtrum, Aphri ieſcen a,  
pellant.

283. 9. Aliqui mertryga, aliȳ myrrhin, aliȳ ox  
phyllon, aliȳ cardamomon, aliȳ organum vocant  
Magi hierobryncas, Latini gruinam, aut pulmo  
niam, aut cicotriam.

282. 15. Gnaphalion, aliȳ hires, aliȳ ampetocon  
aliȳ anaxiton, aliȳ anaphalin, Aegyptiȳ ſemeon, Ga  
uſ gelafonen, Latini centumculum vocant, quida  
tuculare, aliȳ albinum.

284. 8. Aliqui ceraſcomion, aliȳ leucanthion vo  
citant.

284. 15. Conyza magna. Cap. Conyza magna  
aliquibus cynoxematitis, aliȳſ danau, aliȳſ tana  
chion, aliquibus phycos, aliȳſ iſchys, aliȳſ dy  
noſmos, Magi brephoctonos, quibuſdam anubias  
nonnullis hedemias, Aegyptiȳſ ceti, Romanis inuȳ  
bum, aut militaris, aut deliarium, aut febrifuga  
aliȳſ phragmoſa, aliȳſ muſteros, aliȳſ piſſa nuncu  
patur.

285. 2. Aliqui conyzam paruam, aliȳ panion, aliȳ  
libanotidem, Magi cronon vocant.

285. 10. Aliȳ hemerocatalacton, aliȳ crinon a  
grion, aliȳ crinanthemon, aliȳ porphyranter, aliȳ  
bulbum hematicon, aliȳ anticantharon, Aegyptiȳſ  
iocri, Romani bulbum, aut lilium ſylueſtre, aut m  
rinum, Aphri abiblabon vocant.



NOTHA.

285.28. Aliqui basilicon vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

288.11. Alij melion aqueum, alij ematicon, alij priapicon, aut satyricon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

288.21. a Latini geminalis, à Dacus hormia dicitur.

289.14. Aliqui osmada, aliqui ononin, alij phlostin appellant.

290.13. Hanc nymphona alij vocant.

290.20. Sunt qui picrada appellent, alij leucen, alij thalassiam.

290.28. Alij pteryx, alij lonchitim, alij aturion, alij phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodoten, Magi mustela sanguinem.

291.26. Quidam anthyllon, alij anthemida vocant, alij eranthemin, alij leucathemon, alij foranthin, alij campestrum florem, Romani solastrum.

292.11. Anthemida aliqui leucanthemon, alij eranthemon, quoniam vere floreat: alij chamamelon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melanthemon, alij chrysocomam, alij calliam, Romani malium, Aphri asteriphen appellant.

293.11. Alij anthemida, alij leucanthemon, alij chamamelon, alij chrysoalin, alij melabathron, nonnulli campestrum florem, Romani solis seculum, aliqui millefolium, Hetrusci cautam, Aphri thamath.



# DIOSCORIDIS

294.5. Alij balsamenā, Magi hamorrhan, alij Mercurij geniturā, alij aphilitus semen, aut mnesitheum, Romani Cappacorianam, Aphri narat.

294.14. Alijs orobelon, quibusdam orobax, alijs hamaggon, alijs paseden, alijs monogenion, alijs menion, alijs pæonion, alijs panthiceratos, alijs idæi dactyli, alijs aglaophotis, alijs theodonion, alijs selenion, Magis selenogomon, alijs phthisis, Romanis castra.

295.12. Alij ægonychon vocant, alij leontion, alij leoninum lapidem, alij gorgonion, alij tantalis tin, alij diosporon, Romani columbam, Daci gonioletam, alij heraciam.

296.3. Aliqui teuthrion, alij dracanion, alij cinabarim, Latini rubiam, Helrusci lappam minorem, Aegyptij sophobi vocant.

296.25. Alias cestron aut medusa dicitur, Latine venerea aut lanceola.

297.5. Latini longinā, aut calabrinam dicunt.

297.12. Alij althiocon vocant.

298.21. Aliqui cannabion, alij schinostrophon, alij asterion appellarunt.

298.26. Aliqui hydrastinam, Romani terminalem dicunt.

299.26. Aliqui acopon, alij anagyron, alij agnacopon vocant.

299.27. Alij alceam, alij acyron, alij lyron.

300.13. Aliqui onobrochilon, alij eschasmenē, alij hypericon, alij corion, alij chamapytin, Romanis



N O T H A.

mani opacem, alij brichilatam, alij loptam, alij iocinalem, Daci aniaffexe appellant.

301.24. Alij ascyron, aut dionysiadem.

302.21. Alys pitysorysis, alijs ori Zelon, is qui Pontum incolunt olocyron, alijs bryonia sylvestris, Athenis ionia, Eborcis sideritis, Magis Minerue sanguis, Latini ainga aut cypripum, Dacus doche la appellatur.

306.6. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pratis & montibus, locis mundis, & opacu, circa frutices: animas hominum & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta: grauius somnus resistit: ad omnem medendi vsum commendata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum punceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis vulneribus capitis indita, dolorem finit: vulnera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quotidie imponi debet, dum persanescant: dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

306.21. Aliqui polygonatum appellant, alij cynochalam, alij herachiam, alij asphalton, alij chiliophyllon, alij clemat, alij polycarpon, alij carcinechthon, alij tenuhalida, alij myriopetalon, alij cnopodion, alij Zarithheam, alij pedalion, Aegypti thephim, alij stemphin, Magi genituram heron, alij qui unguem muris, Latini sanguinariam aut seminalem, Aphrichulum,



# DIOSCORIDIS

307.27. Alijs philetæron, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

308.7 Aliqui epigetin, Aegyptij philacuon, Romanum ambuxum vocitant.

309.23. Romani soldaginem vocant.

310.1. Rutaceis similes.

310.29. Alij tobion, Romani stipam vocant.

310.26. Alij calycanthemon, alijs periclymenon, alijs heliophyes, nonnulli hepatitum, alijs milacem, alijs anatolicon, alijs diticon, alijs merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptij oxyani, alijs clymenon, alijs clymenion, quod & agonon nuncupant.

311.8. Aliqui Aeginam, alijs clymenon, alijs carpathon, alijs splenion, alijs epetitum, alijs axinā maiorem, nonnulli clematitum, alijs myrsinen, alijs calycanthemon, Magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

311.26. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauruceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

312.18 Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon aliqui sarxiphragon, alijs empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguria prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit, & urinam ciet.

312.19. Aliquibus potamogiton appellatur, alijs



N O T H A.

alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Mys-  
sij mendruta, Syrus neuda, alijs lycosemphyllon:  
alijs helleborosemata, alijs scyllion, Magis lupicor,  
Romanis viarium nigrum, quibusdam tintinabu-  
lum terra, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

312.27. Aliqui leporis cuminum appellant.

313.2. Aliqui medicam appellat, alijs triphyllon,  
alijs clemation, nonnulli osmon, quidam trigonon,  
alijs cypellion, alijs polyphyllon, Romani trifolium  
odoratum, Aegyptij epaphon.

313.11. Ab alijs erineos, ab alijs thryas, à non-  
nullis pollyrrhiō, à Romanis vindicta nominatur.

313.21. Aliqui anaclorion, alijs phasganon, alijs  
machæronion, alijs arion vocant, Romani gladio-  
lum, quidam genitalem.

314.10. Alijs bolon vocant.

314.16. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos,  
à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis a-  
prus dicitur.

315.2. Anchusam aliqui catanchusam vocant,  
alijs libycam, alijs archibellion, alijs alcibiadion, alijs  
onophyllon, alijs porphyrida, alijs mydusam, alijs sa-  
lyca, alijs noneam, Aphri buinesath.

316.12. Aliqui aridam, alijs alcibiadion, Roma-  
ni alcibiaccum nominant.

316.25. Aliqui & hanc echion vocant, alijs scor-  
piuron, alijs sparganon, alijs altheam, alijs amarati-  
da, alijs probatæam, alijs elaphion, alijs antimonon,  
alijs porphyrida, alijs angion, alijs nemesion, alijs phi-  
leter



# DIOSCORIDIS

leterion, alij hyenopsolon, alij thyrstitim, alij therā  
mutin, alij misopathos.

317.8. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

317.14. Agrostin aliqui egicon, alij amaxitin,  
Aegyptij amphu vocant, Latini gramen, aliqui  
asyphyllion, alij sanguinalem, alij vniolam, Hispani  
apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

318.9. Magi genitiram, aut sanguinem Titani,  
alij scorpionis vrinam, Pythagoras parmiron,  
Andreas xanthophanea, Osthane boephthalmō,  
Aegyptij sendronor, Romani vertemnum, alij so-  
leastron, Aphri vdedonin.

319.5. Aliqui myriomorphon nominant, alij  
chiliophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, La-  
tini supercilium Veneris, alij acron syluaticum,  
alij militare, alij millefolium.

319.19. Batos, ab alijs cynosbatos, ab alijs seli-  
norition, ab alijs asyntrophos, à Magis Titani san-  
guis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus,  
ab alijs sentes, à quibusdam mora baticana, à  
Dacis mantia, Aegyptijs hamoos, alijs ametros  
appellatur.

321.2. Alij hepatorium, aut hepatitis, Romani  
volucrum maius.

321.17. Pentaphyllon aliqui peniapedes, alij pen-  
tatomon, alij pentadactylon, alij pseudoselinū, alij  
callipetalon, alij xyloleton, nonnulli xylopetalon,  
alij asphalton, alij pentacœnon, alij thymiatitin,  
Aegyptij orphitebeocen, alij enotron, Magi ibidis  
vng



N O T H A.

inguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon.  
Romani quinq̄uesolium, Galli pempedulam, Daci  
propedulam appellant.

322.27. Aliqui rhon, alij anchinopa, alij phæ-  
nicopteron, alij rhon stachyos, alij osthaleu, Aegyp-  
tiij athnon nominant.

323.14. Alij rhodida nominant.

323.20. Hippurin, alij trimachion, alij anabao-  
sin, alij cheredranon, alij phædran, alij uiandens-  
dron, alij gu, alij schæniostrophon vocant, Aegyo-  
ptij pherphram, Magi Saturni cibum, Romani  
equinalem, alij equi salicem, aut anabasion, alij  
sphydron.

324.4. Aliqui equition, & alij chedran, alij gy-  
non, Romani salicem equinam appellant.

325.1. alij scorpion, alij garganon, Romani cor-  
nulacam, alij biuensa, Daci saliam, Aegyptij so-  
ber, Aphri achæosim.

325.20. Oxyschænos aliquibus schænos leuis,  
alijs oxypternos, alijs Solis supercilium, Romanis  
iuncus marinus, aut manualis, Aphris chudua di-  
citur.

326.13. Alijs adocetos, alijs neuræ, alijs phry-  
nion, Romanis bouinalis.

326.17. Alijs chrysitis, alijs chrysanthemon,  
nonnullis amaranton, alijs diospogon, Aphris duo-  
bath, vel barchumath, Romanis Iouis barba ap-  
pellatur.

326.26. Aliqui chrysoespermon vocant, alij da-  
spin.



# DIOSCORIDIS

spin, alij origanon, alij arcophthalmon, Romani  
arulariam.

327.19. Aliqui chalchitin vocant, alij chalcant-  
thon, alij chalcantemon, Romani acantham,  
Hetrusci garuleum, Aphri churfeten.

328.8. Alij trigonion, alij bunon, alij hierobota-  
nen, alij philrodoten, Aegyptij pemsempe, Magi  
Iunonis lacrymam, nonnulli mustela sanguinem,  
alij sanguinem Mercurij, Romani cristam gallina-  
ceam, alij pheriam, alij trixalidem, alij exuperā,  
aliqui herbam sanguinalem.

328.20. Alij erigenion, alij chamælycon, alij si-  
deritin, quidam curitin, alij persephomon, alij Iouis  
colum, alij dichromon, alij callesin, alij hipparison,  
nonnulli demetriada, Aegyptij pemphthen-  
phiham, Pythagoras eryscisceptron, Romani cin-  
cinnalem.

329.11. Aliqui chamæfycen, alij gatalen, alij ony-  
cha vocant, Romani p'nium triuiam, aut ficum ter-  
ra, alij glandulam, alij tium, alij nonariam.

329.22. Aliqui heloniam, alij porphyranes,  
Romani vaccinium, alij vlcinum vocant.

330.4. Nonnulli oxytonon, Romani papavera-  
lem, Aegyptij nanti.

330.22. Papaver sativum aliqui chamæfycen,  
alij papaver rhoada, alij oxytonon appellant, Ro-  
mani papaver, Aegyptij nanti.

333.13. Aliqui paralion, alij syluestre papaver,  
alij thalasion, Romani fabulum marinum, Aphri  
fifim



N O T H A.

*lissimacam* vocant.

334.2. Qui hoc papauer hauserit, non alia accidit, quàm qui opium eb.berit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radicis bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

334.17. Alij pythionion, aliqui dioscyamon vocant, alij adamanta, alij adamenõ, alij hypnoticõ, alij emmanes, alij atomon, nonnulli dihiambriõ, Magi, Pythagoras & Osthane, xeleo, Zoroastres, iphionion, Magi rhapsodicã, Romani inananoenariam aut apollinarem, Aegyptij saphilo, Hetrusci fabulum, Galli biluntiam, Daci dieliam.

336.9. Aliqui cataphysin, alij cynocephalion, alij chrystalion, alij cynomyam, alij psyllerin, alij sicelioticon, Sicuti comidyn, Romani herbam pulicarem aut silbacium, Aphri vargugum appellat.

336.27. Romani strumum vocant, alij cacubulum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismum vocant.

338.2. Aliqui dircion appellant, alij strychnonmanicon, alij dorycnio, alij calliada, Romani apollinarem minorem, alij vlticanam herbam, aut opsaginem, Daci cycolidem, Pœni cacabum.

338.19. Strychnonmanicon, alij anydron, alij pentadryon, alij enoron, quidã orthogyon vocant.

339.22. Alij exeranthes, aliqui antimnion aut antimion, alij bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij apemum, Pythagoras anthropomor-



# DIDSCORIDIS

phon, alij alaten, alij thridaciam, alij cammaron,  
Zoroastres diamonon, aut archinen, Magi hemio-  
nos, aliqui gonogeonis, Romani caninum málum,  
alij terrestre málum.

342.18. Alij cyanion leucon, Rom. colomestru.

343.4. Conion, aliquibus aginos, alijs ethusa,  
alijs apolegusa, alijs dolia, alijs amaurosis, alijs pa-  
ralysis, nonnullus aphron, quibusdam creidion, alijs  
cæten, alijs catechomenio, alijs abioton, alijs apseu-  
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanody-  
nos, alijs dardanis, alijs catapsyxus, Osthani baba-  
thy, Aegyptijs apemphi, Romanus cicuta appel-  
latur.

344.8. Aliqui cynanchon appellant, alij para-  
dalianches, alij cynomoron, alij cynoctonon, alij  
phaleon, alij cynanchen, alij oligoron, alij hippo-  
manes, alij onistin, alij ophioscorodon, alij cynari-  
cam, alij elaphoscorodon, Magi paralysin, Romani  
brassicam rusticam aut caninam.

344.20. Alij spongon, alij hæmostarin, Romani  
rhododendron, Lucani icmanen, Aegyptij schim-  
phen, Pœni rhododaphnen dicunt.

346.23. Aliqui elitim vocant, alij canocerseam,  
alij amelxinen, alij eusinem, alij amorginen, alij  
sucotachos, alij psychuacos, alij melampelon, alij  
cittampelon, alij cissamethon, alij anetetamenon,  
Romani volutum laparon, Aegyptij apap, alij par-  
thenion, alij sideritin, alij heracleam, nonnulli a-  
griam, quidam clibodion, alij polyonymon.

347.



N O T A.

347.9. Alij myortochon dicunt, alij myorto-  
lenon, Romani muris auriculam: Pœni labas-  
solabat.

347.20. Agriam phacon aliqui, alij epipteron,  
romani viperalem, alij iceosnigdonon vocant.

347.27. Aixoon maius, aliqui aithales, alij  
mbrosion, alij chryssispermon, alij Zoophthal-  
on, alij bubophilhalmon, alij stergethron, alij æ-  
on, alij aichryson, alij holochryson, nonnulli chry-  
nibemon, alij protogenon, alij boron, alij notion:  
agi paronychiam, alij chrysitin, Romani ceriam  
spiam, iui Iouis caulem nominant, alij leapedes,  
ij sedum maius, Aegyptij pamphanes.

348.17. Aixoon paruum, alij petrophyes appel-  
at, alij brotion, alij thesbrotton, crobrysson, alij  
imerinen, alij ceramiam, Romani vitalem, alij  
nperuium, Aegyptij et i celiam.

348.24. Semperuium quod tenui constat fo-  
liis, aliqui aixoon paruum, alij petrophyes, alij ai-  
on syluestre, Romani semperuium minus op-  
ellant.

349.2. Aliquibus cymbalion, alijs scytalion,  
ijs hortus Veneris, alijs terræ umbilicus, alijs  
ecchis, alijs stergethron, Latinus umbilicus Ve-  
ris dicitur.

349.19. Acalyphen aliqui cnidem, alij adicen,  
itin urticam, Aegyptij selepsion, Dacidyne ap-  
ellant. Acalyphen etiam alteram aliqui cniphen,  
romani urticam mollem vocant.



# D I O S C O R I D I S

350.12. Alijs galeobdolon, vel galephos, Aegyptijs atopi, Latinis urtica labeo dicitur.

350.23. Alijs galation, aut gallerion.

351.4. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio vocatur, alias erechihites.

351.25. Marinum bryon, aliqui ballarin, alijs iranen, Latini gnomeusilon vocant.

352.14. Alias stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

352.20. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nuncupatur, Aegyptijs tibus, Magis eluri sanguis.

353.11. Phlomon, alijs pblonon, Latini verbascum, alijs pheminalem vocant.

355.8. Arcion alijs profopida, alijs profopion, alijs aparinen, Latini personatam, aut lappam appellant.

355.24. Alijs borion appellatur.

355.28. Capnon, aliqui corydalion, aut corion vocant, alijs syluestre corydalion, alijs capnon in hordeis, alijs capniten, alijs marmariten, alijs capnogorgion, alijs chelidonium micron, alijs peristerion, alijs caniharida, alijs chalcocri, Romani apium aut fumariam, Aegyptij enyx, alijs tucin.

356.7. Alijs tripodion, alijs tribolion.

356.12. Aliqui libyon, alijs triphyllon.

356.22. Aliqui telinen, alijs lotum magnum, alijs triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

357.18. Alijs melophyllon, alijs stratioticem, alijs achillion, Latini millesfolium vocant, aliqui super-

ci



N O T H A.

ilium veneris, Galli beliocandas.

357.27. Alij myrrham, alij conilen vocant.

358.23. Aliqui buglossum magnum vocant, Romanani spinam mollem.

359.6. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alijs asterion, quibusdam hyothihalmion, Romanus inguinalis, Dacis rathibus.

359.19. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter qui ignari antea non viderunt, esse inaeque simulacrum arbitrantur. Medys saxi & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateus Rhicotomus hac de ea refert: Si viridis cum axungia vetere tundatur, contra rabioforum morsus, turgentia guttura, proderit, suffitu quoque serpentes fugat.

359.27. Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij on syluestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut nurariam, aut violam purpuream vocant.

360.5. Aiunt quod purpureum est in flore, animis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

360.16. Aliqui aton, alij actinen, alij anemobhoron vocant magi paradacry, Aegyptij erxoen, Romani scopam regiam, Aphri xigar, nonnulli hepsa.

361.2. Alio nomine chameleuce, alio cissos carpos, aut terrae corona, aut selinitus, Latine heera pluuiatica dicitur.

361.17. Magi eluri gonon, Osthane txamibi, Aegyptij antuenrinbesor, Romani linguam



# DIOSCORIDIS

bubulam, alij libanum, Poeni asanaph vocant.

362.2. Alij phyton, alij caballation, alij spli  
neion, alij scolymon, Romani linguam canis, an  
caninam appellant.

362.14. Aliqui xoonychon vocant, alij aëtony  
chon, alij cemos, alij dānamenem, alij idiophyton  
nonnulli phytobasilam, alij crosion, alij crosso  
plithoon, Magi sanguinem crocodili, alij crocome  
rion, Aegyptij daphnænen, Romani numercium  
alij palladium, alij neuniatum, alij flammulam.

362.23. Aliqui & id antirrhion, alij anarrhi  
non, nonnulli lychnida agriam vocant.

362.29. Nonnulli lychnida agriam appellant.

363.8. Catanance aliquibus damnamete, alij  
dionysias, alijs thyrion, alijs demos, alijs cemos  
alijs crotion, magis archaras, alijs arcopus, Ro  
manus herba filicula, alijs datisca, Dacis caro  
pithla dicitur.

363.21. Aliqui psychen, alij merida, alij pota  
mogiton, alij stachyiten, Romani caliummaren  
nominant.

364.11. Alij callitrichon, alij trichomanes, alij  
ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron, Ae  
gyptij epier, Romani cincinnalem, alij terræ ca  
pillum, alij supercilium terræ, Daci phithophi  
thela vocant.

365.4. Aliqui pterion, alij opteron, Roman  
capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnull  
& eam adianton appellant.



355.11. aliqui phasgamon, alij antiheffon, alij chascanon, alij charadolebron, alij & hanc epa-  
rinam nominant, Latini lappam.

355.24. aliquibus sitospelos, alijs siphon, alijs bromos, Romanis auena dicitur.

361.29. aliqui siphonion, alij acrospelon vocant.

366.28. alijs epapitis, alijs lycanhemon, alijs cy-  
nosbaton, alijs anicetō, alijs heliophiton, alijs anato-  
licon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lyisthe,  
Romanis mergina, Etruscis radia appellatur.

367.23. alijs hieromyrion, alijs myacūtha, alijs  
agonon, alijs scincos, alijs mintha, alijs catangelos,  
alijs anangelos, alijs acaron, alijs ocneron, alijs ci-  
nen, alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamemyr-  
te, Bæotis gyrenia, Magis Herculis genitura ap-  
pellatur.

368.10 aliqui idæan, alij danaën, alij hippoglot-  
ton, alij zaliam, alij steplianen, alij daphnon, alij  
samo:hracicon, alij melhriion, alij hypoglossion  
vocant.

368.19. Daphnoïdes alypo simile, flos ut nym-  
phææ, cuius medullæ nuci cypressi non d. simile, in  
quo semen: aliqui chamædaphnen, alij peplion, alij  
eupetalon vocant.

369.2. aliqui & hanc alexandrinam appella-  
runt, alij daphmiten, alij hydragogen, Romani lan-  
reolam, alij lactaginem, Galli vsubim.

369.11. aliqui ascida vocant, alij atomon, alij pi-  
gatoxarin, Magi sanguinem Herculis, alij polyn-



# DIOSCORIDIS

dos, alij anaphyſton, Aegyptij ſomphia, alij vnre,  
Gallilaginum, aliqui anepſa.

370.22. aliqui melanpodion vocant, alij ecſto-  
mon, alij polyrhizon, alij protion, alij melanorrhiz-  
on, alij cyiranton, Magi xomarition, Aegyptij  
iſeam, alij elaphine, alij cemeleg. Latini veratrum  
nigrum, alij ſaraca, Daci prodiorna.

372.10. aliqui ſeſamiten, alij ſeſamin, alij lyco-  
cytalion, alij helleborum album appellant.

372.17. aliqui coronum, alij ſeſamon ſylueſtre.

372.27. aliqui elaterion vocāt, alij grynon, alij  
balin, alij ſyncriſin, alij bubalion, alij ſcopion, alij  
pherombron, alij peucedanon, alij notion, Romani  
ancetum, alij agreſtem, Pæni cuſimexar.

375.15. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucumeris  
trita radix, & drachmæ vnius pondere pta in hy-  
dromelite, vomitus ciet. Si quis facilè ſecundum cœ-  
nam vomere velit, binus obolis ſit contentus.

375.16. alij triphyllon, alij ſteſion, alij aſtaphi-  
da, alij phthirottonon, alij phthirion, alij apanthro-  
pon, alij polyides, alij pſeudopathes, alij arſenoten,  
Aegyptij ibeſæden, Romani herbam pediculariã  
vocant.

376.4. aliqui hypopyon vocāt, alij pancranen,  
alij ſcammonion, alij thelyterim, Romani ferulagi-  
nem, alij ferulam ſylueſtrem, Pæni bueden.

378.17. aliqui lygon, alij lobon appellant.

379.16. aliqui narcifſon anydrō, alij autoge-  
nes, alij bulbon emeticon, alij lirion, Romani bulbū  
morb



NOTHA.

morbitarium dicunt.

380.16. alij hippophyes, alij hippophanes, alij hippion, alij echinon, alij pelecimon, Romani lappiginem vocant.

381.17. aliqui sesamon sylvestre vocant, alij selsi cyprian, alij crotona, Aegyptij systhanna, alij qui trixin, magi sanguinem febræ, Latini ricinū, alij lupam.

382.5. aliquibus cometes, alijs gobios.

385.8. aliqui clema, alij crambion, alij paralion, alij canapicon vocant.

386.13. aliqui sycen, alij mecona aphroden.

387.5. alij spumosum papauer vocitant.

387.20. aliquibus scambonia radix, alijs colophonia, alijs dactylion, Romanis colophonium, Magis apopleumonos, Aegyptijs famulum dicitur.

389.5. alij chamaelea nigra, alij pyros achmen, alij heraction, alij bdelyram, alij coccon gnidion, Romani citocacium, nonnulli oleaginē, quidam oleastellum vocant.

389.16. alij chamaeleam, alij pyros achmen, alij cestron, aut cneoron vocant.

390.15. Acten aliqui dendron arcti, alij hemon, Latini sambucum, Galli scobiem, Daci sebam vocant.

390.23. alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Euboica, Gallis ducone, Daci olma.

392.2. nonnulli ischiada, alij chamæbalanum agriam, alij linoχoſtin, Latini radicem sylvestrē.



D I O S C O R I D I S

Pani thorphathsadce appellant.

392.16. aliquibus colocyntha egos, alijs sicca pterica, alijs alexandrina colocyntha, Zoroāstri thymbra, Osthani autogenes, Romanis cucurbita syluatica, Dacis tutrastra dicitur.

393.8. alijs cedces, Romani inuolucrum vocant.

394.15. alijs ophiostaphylon, alijs chelidonium, aut melothron, aut psyllothron, aut archezostin, aut agrostin, aut cedrostin appellant.

395.22. alijs chironion ampelon, alijs becranion, Romani oblameniam, alijs batanutam, alijs betisalcam, Daci priadelā, alijs pegrinā, Aphri lauothen.

396.8. Pterin alijs pterion, alijs pterineon, alijs dasyclonon, alijs anasphoron, alijs blechnon, alijs polyrhizon vocant, Magi hermuham, Romani filicem, alijs laculam, alijs filisfanariam, Aegyptij asini sanguinem.

396.23. Thelypterin aliqui nymphæam pterin nominant, Romani linguam ceruinam.

397.9. Polypodion aliqui scolopendrion, alijs pterin, alijs polyrhizon, Latini siliculam vocant.

398.2. aliqui pterion, alijs nymphæam pterin nominant.

398.21. alijs argyron, alijs aritrillin, alijs chrysitin, Aegyptij aphlopho, Latini mercurialem masculā, alijs tessiculatam, Aphri asumes.

399.6. aliquibus linzostus, Aphris armas, alijs asumes labon dicitur.

399.14. aliqui scorpiuron vocant, alijs heliotropon



# NOTHA.

pon, alij dialion, alij heliapon, alij scorpioctonon, alij sesamon agrion, alij scorpij vram.

400.4. alij qui scorpiuron vocant.

405.3. Idem adstringit: prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item iis qui ilei dolore confluctantur: conuenit in grauidarum malacia: sorptum auxiliari constat, cum populatim grassatur pestifera laes. Huiusce modi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

429.17. quam alij Medicinam, alij symphyton, alij idaeum phlomon, alij orestion, alij nectarion vocant.

448.6. alij larbason, alij gynæcion, alij Chalcedonion.

458.20. alij pecton, hephion, aracton, lonchoton.

505.7. Athenis ionia, in Eubæa sideritis dicitur.

## De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat silente luna, & secum ferat, contra venena & improbos homines proderit: pecoribus iuuandis appenditur: nauigys circumponi solet: valet contra capitis dolores & larnas.

## De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter facit, lassitudinē discutiet: & si in pedibus ferat, bestias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa-  
luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruesfacito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est:  
strangul



## DIOSCORIDIS

strangulatu vulue mirum in modum auxiliatur:  
vrine stillicidia & opisthotonum leuat.

### De Pentadactylo.

Pentadactylū si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tonsillarū tumores, ruam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, psoram pernicali fame cōtractam iuuat remoratos à partu menses eijcit: infusa manibus ex aqua tepida cōtra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam cū luna crescit, oriente sole.

### De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa doloribus oculorū auxiliatur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinē reficit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solūm ex aduerso stans ramulos tenuerit.

### De Dictamno.

Dictamnū siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta vini stilla, corpus tangito: siquidem contra omnes serpentium iniurias auxiliatur: vlcera & putrescentes nomas præpurgans explet: adactis corpori aculeis oblinitur, ut præsentis sit auxilio: ad lienem & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, redactum in farinam illinito. Herbam vere, magnis aestibus, autumnōq; eruito.

De



NOTHA.

De Salvia.

Salvia singulum tussimq; discutit: omnibus malis ulceribus cum cera & rosaceo sumpta auxiliatur: lienis dolorem dysenteriamq; pota cum vino albo pari modo sanat: sanguinem excreantibus, potum medetur: ad extrahenda vulvae onera efficacis est: pessime mulieres pessum ex ea subiciunt, ut partus excutiant.

De Cupresso.

Cupressus herba contra raucedines auriculasq; prodest: induratos tonsillarum tumores, aquam inter cutem, & coxendicum cruciatus persanat.

De Centauro.

Centaureum contra inflammata vitia & pulsantes ictus valet foeminis vulvae malo laborantibus auxiliatur: stillicidij urinae, calculorumq; tormenta leuat. Herbam vere oriente sole legito.

De Buphthamo.

Buphthalmum crescente luna legere oportet. Facit autem contra pavores, larvas, & mala medicamenta, fascinationes, utpote cum eas auertat. Radicem si quis mandat, dentem expuet, fluxionemq; confestim sistens auxiliatur: quin & ventrem resoluit.

De Paeonia.

Paeonia herba per aestus Canculae ante Solis ortum vellitur: appensaq; contra venena, fascinum, pavores & larvas prodest: item contra febrem cum horrore venientem, diurnam nocturnamve, & ad  
uer



## DIOSCORIDIS

uerfus tertiam. Proditur lemures à monte, in  
quo nascebatur, fugasse.

### De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, veneficiorū  
& fascinationis amuletum est.

### De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce-  
to, & faciem illinito cum ad negotia te cōferes: ve-  
getiores reddit pueros, imo ventri appensa & ad  
arcendos pavores nocturnos manu teneto. Contra  
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-  
tur: cum enim fascinantes recedunt, arescentem ra-  
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit.

### De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortū eruatur,  
& collo appendatur, veneficis mulieres omnesq;  
fascinantes amolitur.

### De Erylimo.

Erysimon cum vino tritum, aduersus ventris  
dolorem bibitur: si quis grana septem domum inie-  
cerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

### De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs hoion di-  
citur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans.  
Bibitur contra omne venenum, & iocineris vitia.

FINIS.

INDEX



INDEX OMNIUM  
quæ in Dioscoride  
continentur.

A			
Abrotonum	229	Adeps omnis	335
Abfynthium	227	Adianton	364
Abfynthium marinū	228	Aegilops	365
Abfynthiū Santonicū	229	Aeris squamma	442
Acacalis	76	Aeris flos	440
Acacia	83	Aerugo rafa	442
Acacia altera	84	Aerugo scolccia	444
Acantha, us	223	Aes vltum	439
Acanthium	222	Aethiopis	354
Acanthus fylueftris	223	Aetites lapis	482
Acetum	413	Agallochon	25
Acetum è betonica	427	Agaricum	211
Acetum mulsum	414	Ageraton	327
Acetum fcillinum	416	Agnus	85
Acetum è ftorchade	427	Aiuga	302
Chillea	319	Alabaftrites	480
Chras	99	Alcea	298
Cida muria	415	Alcibiadion	315
Cinos	239	Alcyonium	473
Corum	8	Alifma	299
Conitum	342	Allium	186
Darces	474	Aloc	225
		Alfinc	347
		Alc	



# INDEX.

Althæa	297	Anisum	249
Alumen	464	Anonis	223
Alumen scissile	ibidem	Anthemis	292
Alus	309	Anthericum	198
Alysson	271	Antyllis	291
Alypon	393	Antipathes	475
Amaracum	238	Antirrhinon	362
Amaranton	327	Antispoda	439
Ambrosia	282	Aparine	271
Amiantus lapis	481	Aphaca	184
Ammi	251	Apiastrum	276
Ammoniacon	269	Apios	392
Amomis	20	Apium	253
Amomum	19	Apocynon	344
Ampelitis terra	486	Apollinaris	334
Ampeloprason	186	Apri iecur	121
Amphisbænæ ictus notæ		Apum ictus curatio	537
531. eius curatio	541	Aqua	412
Amurca	88	Aqua frigida	515
Amygdalæ amara	101	Aqua marina	412
Amylum	157	Aqua mulsa	411
Anagallis	205	Arabicus lapis	480
Anagyris	299	Araneus	126
Anchusa	315	Arbutus	101
Androsaces	290	Arcion	355
Androsamon	301	Arction	354
Anemone	204	Arcturon	ibidem
Anethum	249	Arena	483
Anguium senectus	115	Argemone	205
		Arg	



# INDEX.

Argentirecremētum	449	Atramentum librariū	487
Argentiscoria	ibidem	Atramentum sutoriū	458
Argenti spuma	ibi. & 510	Atriplex	169
Argentum viuū	456. & 510	Auellana nux	103
Arisarum	198	Auena	156
Aristolochia	214	Auricula muris	209
Armeniaca mala	98	Auri pigmentum, sine ar-	
Armenius lapis	454	senicon	463. & 510
Armoracia	167	B	
Aron	197	Bacca lauri	71
Arrhenogonon	286	Baccharis	240
Artemisia	281	Balaustium	94
Arundo: vide Harundo		Ballote	276
Asarum	13	Balsamum	22
Asclepias	272	Barbula hirci	183
Ascyron	301	Basilisci iētus notæ 533. eius	
Asininum iecur	121	curatio	543
Asini vngula	120	Bdellium	55
Asius lapis	476	Beta	171
Aspalathus	24	Betonica	304
Asparagus	173	Bitumen	66. & 67
Asplenon	290	Blata pistrinaria	120
Aspidis iētus notæ 533. eius		Bliton	168
curatio	543	Botrys	282
Aster Atticus	359	Brassica	169
Astragalus	329	Brassica marina	171
Athamanticum	8	Brassica syluestris	170
Athera	155	Britanica	305
Atractylis	272	Bromus	365

P



# INDEX.

Bryon	25	curatio morsus eius	52
Bryonia	394	ab eo morsorum victu	
Buccina	110	ratio	52
Buglossum	361	Cannabis	25
Bulbus esculentus	199	Cantharides	12
Bulbus vomitorius	200	Capnos	35
Bunion	360	Capparis	20
Buprestis	125. & 499	Capra vngula	12
Buphthalmos	294	Caprinum iecur	ibidem
Butyrum	131	Cardamomum	1
Butyri fuligo	ibidem	Cardamina	17
C		Carduus	22
Acacia	360	Carpasi succus	50
Canchrys	260	Cariota	9
Cadmia	433	Carum	245
Cecilia ictus nota	531. cu-	Caseus	130
ratio eadem qua vipera		Casia	16
morsus.		Castanea	90
Calamus odoratus	21	Castorium	117
Calamintha	235	Catanance	363
Calcifraga	393	Caucalis	181
Caltha	327	Cedria	70
Calx	510	Cedrides	71
Calx viua	471	Cedromela	98
Cancamum	26	Cedrus	69
Cancri	113	Celticum nardum	12
Canis rubus	77	Cechri ictus nota	532. eius
Canis rabidi iecur	121	remedia	542
Canis rabiosi signa	524.	Centaurium magnum	216
		Cent	



# INDEX.

Centaureum minus	217	327	
Cepa	185	Chrysocolia	454
Cepæa	299	Chrysocome	326
Cera	151	Chrysogonon	ibidem
Cerasia	56	Cicada	123
Cerastæ ictus notæ 533. eius		Cicer sativum	159
curatio	542	Cicer arietinum	ibidem
Cervi genitale	120	Cicer sylvestre	160
Cervinum cornu	124	Cichorion	178
Cerussa	452. & 507	Cici	381
Cestron	304	Cicuta	343. & 503
Chalcitis	459	Cimices	119
Chama	111	Cimolia	485
Chamaacte	390	Cinis sarmentitius	472
Chamaecissos	361	Cinnabaris	455
Chamaedaphne	369	Cinnamomum	17
Chamaedrys	274	Cionia	110
Chamaeleo albus	118	Circaea	283
Chamaeleo niger	219	Cirsium	358
Chamaeleuce	361	Cistus	78
Chamaepitys	302	Citria mala	28
Chamaesyce	387	Clematis	307
Chamaelea	389	Clinopodium	273
Characias tithymalus	382	Clymenon	310
Chelidonium	207	Cnicus	328
Chelidonium minus	208	Coagulum	134
Chia terra	485	Cocum gnidion	390
Chondrylla	178	Cocum infectorium	324
Chrysanthemon	292. &	Cochlea	112



# I N D E X.

<b>Cæruleus</b>	455	<b>Croton</b>	381
<b>Colchicon</b>	345	<b>Cucurbita</b>	175
<b>Colligendorum ratio</b>	4	<b>Cucumis sativus</b>	175
<b>Colocasia</b>	161	<b>Cucumis sylvestris</b>	371
<b>Colocynthis</b>	392	<b>Cuminum sativum</b>	250
<b>Colymbades</b>	87	<b>Cuminum sylvestre</b>	ibidem
<b>Communis curatio in omnes ictus virulentos</b>	533	<b>Cunila</b>	231
<b>Conyza</b>	284	<b>Cupressus</b>	68
<b>Corallium</b>	475	<b>Curmi</b>	154
<b>Coriandrum</b>	251. & 502	<b>Cyclaminus</b>	194
<b>Coria veteramentaria</b>	121	<b>Cyclaminus altera</b>	196
<b>Coriarius frutex</b>	91	<b>Cydonomeli</b>	419
<b>Coris</b>	302	<b>Cynia</b>	399
<b>Coronopus</b>	176	<b>Cynocrambe</b>	ibidem
<b>Cornu cerui</b>	124	<b>Cynoglosson</b>	362
<b>Cornus</b>	100	<b>Cynosorchis</b>	287
<b>Corruda</b>	173	<b>Cyparissias tithymalus</b>	384
<b>Cos Naxia</b>	483	<b>Cyphi</b>	26
<b>Costus</b>	20	<b>Cypirus</b>	9
<b>Cotonea mâla</b>	97	<b>Cytinus</b>	94
<b>Cotyledon</b>	349	<b>Cytisus</b>	356
<b>Cratægogonon</b>	286	<b>D</b>	
<b>Crimmon</b>	155	<b>D</b> Amascena pruna	100
<b>Crithmum seu crithamon</b>	176	<b>D</b> amasonion	299
<b>Crocodilion</b>	220	<b>Daphnoides</b>	368
<b>Crocomagma</b>	27	<b>Daucus</b>	257
<b>Crocum</b>	ibidem	<b>Delphinium</b>	ibidem
		<b>Dendroides</b>	tithymalus
			384



# I N D E X.

384		Elæomell	32
Deuteria	409	Eleoselinum	253
Dictamnium	233	Elichryson	327
Dictamnium Cretenſe	234	Empetron	393
Diphryges	462	Ephemeron	346. & 500
Dipsacum	220	Epimedion	313
Dipsadis morſus notæ	532.	Epimelis	99
eius curatio	541	Epipactis	355
Dorycnion	339. & 501	Epirotica mâla	98
Draba	190	Epithymum	393
Draco marinus	113	Equisetum	323
Draconis marini iſtus re-		Equorum lichenes	121
media	539	Eretria terra	483
Dracunculus	196	Erica	75
Dryini iſtus notæ	532. eius	Erinaceus	109
curatio	541	Erinei	107
Dryopteris	397	Erinus	317
Dulcis radix	216	Eruca	181
E		Erucæ olerum	125
E Benus	80	Erucæ pinorum	125. &
Ebulum	390	498	
Ebur	124	Eruum	163
Echinus	109	Eryngium	225
Echion	316	Eryſimon	190
Elaphoboſcon	255	Erythrodanon	296
Elaterion	373	Eupatorium	321
Elatine	320	Euphorbium	266
Electrum	73	F	
Eleſphacos	234	F Aba	160

P ;



# INDEX.

Faba Aegyptia	161	G	
Fax	471	Agates lapis	479
Fagus	90	Galaetites lapis	480
Farina crassior	155	Galaxias	ibidem
Fel	143	Galbanum	267
Ferri rubigo	445	Galerita	123
Ferula	261	Galion	356
Festuca	365	Galiopsis	ibidem
Fibrini testes	116	Galla	90
Ficus	105	Gallina	122
Filicula	397	Gallinae cerebellum	ibid.
Filix	396	Garum	119
Filix foemina	ibidem	Genitale cerui	120
Fimum	145	Gentiana	213
Flos aris	440	Geranion	283
Flos salis	469	Geodes lapis	483
Flos punice	94	Gingiberis	192
Flos sylvestris punici	ibid.	Gingidion	181
Foeniculum	256	Gith	273
Foeniculum erraticum	ibi.	Gladiolus	313
Foenum graecum	158	Glans	89
Fraxinus	72	Glans Iouis	90
Fuligo e myrrha, resina,		Glans Sardiana	ibidem
styrace	59	Glans vnguentaria	379
Fuligo liquidae picis	65	Glastum sativum	209
Fuligo pictoria	486	Glastum sylvestre	210
Fuligo thuris	59	Glaucium	270
Fumaria	355	Glaux	366
Fungi	345. & 508	Gluten piscium	270
		Glut	



I N D E X.

Glutinum	ibidem	Heliotropium magnum	
Glycyfide	294		399
Gnaphalion	283	Heliotropium parvū	400
Gnidium granum	389	Helleborum album	369
Gobius	118	Helleborum nigrum	370
Gramen	317	Helxine	320. & 346
Gramen arundinaceū	ibi.	Hemerocallis	285
Gramen Parnasi	ibidem	Hemionitis	291
Grossi	107	Herba Sabina	69
Gummi amygdalæ	102	Hieracium magnum	252
Gummi cerasi	96	Hieracium paruum	ibid.
Gypsum	472. & 508	Hippace	131
H		Hippocampus	110
<b>H</b> Aematites	477	Hippoglosson	362
<b>H</b> Hemorrhoi ictus no		Hippolapathon	168
ta 532. eius curatio	542	Hippomarathon	256
Halica	156	Hippophaës	380
Halicacabon solanum	338	Hippophæsson	381
Halimus	76	Hippopotami testes	116
Harundo	74	Hipposelinon	254
Harundo Cypria	ibidem	Hirci barbula	183
Harundo vallatoria	ibid.	Hirculus	12
Hastula regia	198	Hirundines	124
Hedera	206	Hirudo	512
Hedysaron	289	Holostium	310
Helcysma	449	Hordeum	153
Helenium	28	Horminum	288
Helenium alterum	29	Hyacinthus	329
Helioscopius	384	Hydromeli	412



I N D E X.

Hydromelon	419	Iuncus	325
Hydropiper	193	Iuncus odoratus	21
Hyoscyamus	334. & 504	Iuniperus	68
Hypecoon	334	Ius piscium	119
Hypericon	300	Ixia	218
Hypocistis	78	L	
Hysopum	230	L Abram Veneris	220
I		L Labrusca	402
I Aspis	481	Lac	128
I Iberis	108	Lac coagulatum	509
Ibiscum	297	Lac humanum	130
Ichthyocolla	270	Lac schiston	129
Idæa radix	323	Lactis serum	ibid.
Iecur apri	121	Lacerta	127
Iecur asininum	ibid.	Lactuca sativa	180
Iecur canis rabidi	ibid.	Lactuca sylvestris	ibid.
Iecur caprinum	ibid.	Ladanum	79
Iecur mergi	ibidem	Lagopus	312
Illecebra	348	Lampsana	168
Ilex	90	Lana	132
Indicum	455	Lana cremata	ibidem
Inguinalis	359	Lanaria herba	194
Intybus	177	Lappa	365
Iouis glans	90	Lapathum	167
Irio	190	Lasfer	264
Iris	6	Lasferpitium	ibidem
Isopyron	359	Lathyrus	385
Iudaicus lapis	481	Lauer	175
Iuglandes nuce	102	Laurus	71
		Laurus	



## INDEX.

Laurus Alexandrina	363	Lithospermon	295
Lauri baccæ	71	Locustæ	123
Lemnia terra	457	Lolium	157
Lens	162	Lonchitis	296
Lens palustris	347	Lora	409
Lentiscus	61	Lotus arbor	99
Lentiscina resina	64	Lotus Aegyptia	357
Leontopetalon	272	Lotus sylvestris	356
Leontopodion	363	Lotus vrbana	ibid.
Lepidium	203	Lupinus	164
Leptocarya	103	Lychnis coronaria	275
Lepus marinus	115 & 511	Lychnis sylvestris	ibid.
Lepus terrestris	115	Lycium	82
Leucacantha	224	Lycopsis	316
Leucanthemon	292	Lygos	86
Leucas	274	Lyfimachia	306
Leucoion	285		M
Lichenes equorum	121	M Acer	73
Lichen	326	M Mæna	118
Lignorum marcor	73	Magnes	479
Ligusticum	246	Magudaris	365
Ligustrum	77	Malabathrum	15
Lilium	275	Malicorium	94
Lilium sylvestre	285	Malua	168
Limonion	212	Malum	97
Lingua bubula	361	Malum Armeniacum	98
Linozostis	398	Malum cotoneum	97
Linum	159	Malum dulce	98
Lithocolla	482	Malum Epiroticum	ibid.

P 5



# INDEX.

Malum Medicum	ibid.	Memphites	481
Malum orbiculatum	ibid.	Mentha	235
Malum Persicum	ibid.	Menthastrium	ibidem
Malum præcox	ibid.	Meon	8
Malum punicum	93	Mercurialis	398
Malum sylvestre	ibid.	Mergi iecur	121
Mandragoras	339. & 504	Mespilus	29
Manna thuris	58	Metopion vnguentū	49
Martor lignorum	73	Milium	156
Maron	239	Millefolium	357
Marrubium	277	Millepedæ	120
Marrubium nigrum	276	Misy	460
Mastiche	61	Mituli	111
Meconium	504	Moly	243
Medica	184	Molybdæna	443
Medica mala	98	Molybdoides lapis	448
Medion	313	Morochthus	480
Medulla	142	Morus	103
Mel	149	Mullus	116
Mel heraction	502	Mulsum	411
Melampsythium	462	Muralis herba	346
Melanteria	460	Muria	469
Melanthium	263	Mures	128
Melia terra	486	Muris auricula	209
Melilotos	239	Mus araneus	127
Melimela	98	Muris aranci ictus notæ	
Melissophyllon	276	531. eius curatio	539
Melitites lapis	480	Muscus	25
Melomeli	419	Muscus marinus	351
		Must	



# INDEX.

Mustela	117	Nymphæa	282
Myagron	358	O	
Myosotis	209	O Chra	455
Myrica	75	O Ocymastrum	316
Myrrha	52	Ocymum	182
Myrrha Bæotica	54	Oenanthe	284. & 403
Myrrhis	357	Oesypum	133
Myrtidanum	96	Olea sylvestris	86
Myrtus fatiua	95	Oleaster	ibidem
Myrtus sylvestris	367	Oleæ ethiopice lacryma	88
N		Olei vires	29
N Aphtha	67	Oleum amygdalinum	33
Napus	166	Oleum balaninum	34
Narcaphthon	25	Oleum cicinum	32
Narcissus	379	Oleum cnicinum	34
Nardi genera	10	Oleū è gnidio grano	ibid.
Nardum Celticum	12	Oleum hyoscyaminum	34
Nardum montanum	13	Oleum laurinum	35
Nardinum vnguentum	51	Oleum lentiscinum	36
Nasturtium	189	Oleum massichinum	ibid.
Natricis ictus notæ	532	Oleum melanthinum	34
eius curatio	542	Oleum melinum	98
Nepeta	235	Oleum myrteum	35
Nerion	344	Oleum oliuæ sylvestris	30
Nitrum	469	& 88	
Nitri spuma	470	Oleum omphacinum	29
Nux auellana	103	Oleum picinum	63
Nux iuglans	102	Oleum raphaninum	34
Nux pinca	60	Oleum Sicyoninum	32
		Oleum	



# INDEX.

Oleum sinapium	34	Othonna	208
Oleum styracium	55	Ouorum natura	122
Oleum terebinthinum	36	Oui candidum	ibid.
Oliuæ colymbades	87	Oxalme	415
Oloschœnos	325	Oxylapathum	167
Olusatrum	254	Oxymyr sine	367
Omphacium	404	P	
Omphacomelites	419	P Aederota	223
Onagra	358	Pæronia	294
Onitis	231	Paliurus	76
Onobrychis	300	Palma	92
Ononis	223	Palma elate	98
Onosma	289	Palma Thebaicæ	92
Onyx	111 & 480	Panaces Asclepii	245
Ophioscorodon	187	Panaces Chironium	ibid.
Ophites lapis	482	Panaces Heracleum	243
Opium	331	Pancration	201
Opobalsamum	22	Panicum	156
Opopanax	243	Papauer corniculatum	
Orbiculata mâla	98	333 & 505	
Oreoselinon	253	Papauer erraticum	330
Origanum	231	Papauer satium	ibid.
Origanum sylvestre	ibid.	Papauer spumeum	334
Ornithogalum	183	Pappi	512
Orobanche	182	Papyrus	74
Oryza	156	Paralios	384
Osisfragus	123	Pardalianches	342
Ostracites	483	Paronychia	326
Osyris	366	Parthenium	293
		Pal	



# INDEX.

Passum	406	Phycus marinus	352
Pastinaca herba	247	Phyllitis	278
Pastinaca marina	115	Phyllon	286
Pastinacæ marinæ ictus		Phyteuma	362
notæ 531. eius curatio		Picea	59
339		Picis liquidæ fuligo	65
Pedicularia	375	Pinex nuces	60
Pelecicon	289	Pinorum erucæ 125 &	498
Peplis	386	Pinus	59
Peplos	ibid.	Piper	191
Pepo	179	Piscium ius	119
Periclymenon	311	Pissasphaltos	67
Peristereon	328	Pisselæon	65
Persea	108	Pistacia	102
Persica mâla	98	Pityusa	385
Personata	355	Pix liquida	64
Petasites	ibid.	Pix sicca	66
Petroselinum	253	Plantago	173
Peucedanon	261	Platanus	72
Phalangium	278	Plumbago	448
Phalâgii morsus notæ 530.		Plumbum elotum	446
eius curatio	538	Plumbum vstum	ibid.
Phalaris	295	Plumbi recrementū	447
Pharicon	506	Pnigitis terra	485
Phasiolus	163	Polemonia	308
Phœnicobalanus	92	Polion	279
Phœnix	322	Polycnemon	273
Phrygius lapis	476	Polygala	366
Phu	14	Polygonaton	307
		Polyg	



# INDEX.

Polygonon	306	Pyrites	477
Polypodion	397	Pyrorum genera	99
Pompholyx	435	Q	
Populus alba	72	Quercus	89
Populus nigra	ibidem	Quinquefolium	321
Porrum capitatum	184	R	
Portulaca	172	Radix	166
Potamogeton	352	Radix dulcis	216
Poterion	222	Radix sylvestris	167
Propolis	152	Rana	117
Prunus, pruna	100	Rana palustris	511
Pseudobunion	360	Ranunculum	203
Pseudocasia	16	Rapum	165
Pseudocinnamomum	19	Recondendorum ratio	5
Pseudodictamnium	234	Recrementum argēti	449
Psoricon	459	Resina variæ	63
Psychotrophon	304	Resina lentiscina	64
Psyllion	336. & 502	Resina liquida è pinu & pi	
Ptarmica	193	cea	63
Pulegium	232	Rha	213
Pulegium sylvestre	233	Rhamnus	78
Pulicaria	336	Rhaphanus	166
Pulicula	155	Rhaphanus sylvestris	167
Pulmones animalium	120	Rhaponticum	213
Pumex	466	Rheon	ibid.
Purpura	110	Rhodia radix	323
Pygnoconon	351	Rhododendron	344
Pyrafter	99	Rhus	91
Pyrethrum	258	Ric	



# INDEX.

Ucinus	381	Salix	86
Rosa	81	Salvia	234
Rosei pastilli	ibidem	Sambucus	390
Rosmarinus	258	Samia terra	484
Rosmarinum coronarium		Samius lapis	ibid.
260		Sampsuchum	238
Rubeta	511	Sandaracha	463. & 510
Rubia	296	Sandyx	453
Rubigo ferri	445	Sanguinaria	306
Rubrica fabrilis	457	Sanguinaria foemina	307
Rubrica Sinopica	ibid.	Sanguis	144
Rubus	319	Sanguis tauri	509
Rubus canis	77	Sapa	406
Rubus Idæus	320	Sapphirus	481
Rutmex	167	Sarcocolla	269
Ruscum	367	Sardianæ glandes	90
Ruta	240	Sardonia	503
Ruta sylvestris	242	Sarmentitius cinis	472
S		Satureia	237
S Abina herba	69	Satyrion	288
Saccharum	150	Satyrion erythroniō	ibid.
Sacra herba	328	Scammonia	387
Sagapenum	266	Scandix	181
Sal	467	Schistum lac	129
Salis flos	469	Schistos lapis	479
Salis spuma	468	Scilla	200
Salamandra	126. & 499	Scincus	127
Saliuaris	258	Scolopendra	114
Saliunca	12	Scolopendræ ictus notæ	530



# INDEX.

530.eius curatio	538	Seseli Creticum	ibid.
Scolymos	222	Seseli Peloponnense	ibid.
Scordion	280	Setanium	99
Scorodoprasum	188	Sicyonium oleum	31
Scoria plumbi	447	Sideritis	318
Scorpioides	400	Sidion	94
Scorpius marinus	113	Siligo	155
Scorpius terrestris	ibid.	Siliquæ	97
Scorpii ictus notæ	530.eius	Silphium	264
curatio	538	Silurus	118
Securidaca	289	Silybum	379
Sedum magnum	347	Sinapi	188
Selenites lapis	481	Sion	175
Selinusia terra	485	Siser	167
Semen	155	Sison	248
Semperuium	347	Sisymbrium utrunque	175
Semperuium minus	348	Sitania	153
Senecta anguium	115	Smarides pisces	118
Senecio	351	Smilax 183.& 343.& 503	
Sepia	115	Smilax aspera	366
Seps	127	Smilax lævis	367
Seris	177	Smyris lapis	483
Serpyllum	237	Smyrnion	254
Sertula campana	239	Solanum hortense	336
Serum lactis	129	Solanum manicum	338
Sesama	157	Solanum somniferū	ibid.
Sesamoides	372	Sonchus	177
Seseli	247	Sorba	100
Seseli Aethiopicum	248	Sory	461
			Spar



# I N D E X.

arganion	314	Struthia cotonea	98
artion	378	Struthion	194
atha	93	Styrax	54
hondylion	260	Succinum	73
hragis ægos	458	Suillus pulmo	120
ina acuta	77	Suillus talus	124
ina alba	221	Sulphur	465
ina Arabica	ibid.	Sycomorus	104
ongia	474	Symphyton	309
ongiarum lapides	482		
uma nitri	470	<b>T</b> Alus suis	124
uma salis	468	Tamarix	75
uma argenti	449. &	Taxus	343. & 503
510		Tauri sanguis	509
uamma æris	441	Telephion	210
uamma exacie decussa	442	Tellinæ	111
		Terebinthus	62
achys	277	Terebinthina	ibidem
acte	50	Terra	483
aphis agria	375	Terra fornacum	486
ercus ferri	445	Testæ	485
abium	448	Testiculus canis	287
ammi	ibidem	Teucrion, Teucris	274
ebe	310	Thalassomeli	413
echas	230	Thaliætron	351
omoma	442	Thapsia	376
ariotes	352	Thelygonon	286
ariotes millefoliū	ibid.	Thlaspi	189
igmenta balnearum	31	Thracias lapis	479

Q



# I N D E X.

Thunnus	119	V	
Thus	56	Venerata	5
Thuris cortex	58	Veneris vmbilicu	
Thuris fuligo	59	349	
Thuris manna	58	Veratrum album	36
Thyites lapis	480	Veratrum nigrum	37
Thymelæa	389	Verbascum	3
Thymoxalme	415	Verbenaca	3
Thymus	236	Vermes terreni	12
Tilia	78	Vesparū ictus curatio	52
Tithymali	382	Vesicaria	33
Tordylion	248	Vetonica	30
Torpedo piscis	114	Victus ratio in morsu ra	
Toxicon	506	biosi canis	52
Tragacantha	224	Vimen	8
Tragium	324	Vina marina	41
Tragoriganum	232	Vina picata	42
Tragos	155. & 325	Vina resinata	4
Tribulus	311	Vini natura	40
Trichomanes	365	Vinum abiegnum	4
Trifolium	278	Vinum abrotonites	42
Trimestria	152	Vinum absynthites	228 &
Triphyllon	278	425	
Tripolion	363	Vinum acorites	43
Trissago	274	Vinum adynamon	41
Triticum	152	Vinum anethinum	43
Tuber	183	Vinum apiites	41
Tusilago	281	Vinum aromatites	42
Typha	283	Vinum asarites	43

Vii



# INDEX.

Vinum bunites	427	Vinum myrsinities	428
Vinum calaminthites	428	Vinum myrtites	420
Vinum catorchites	422	Vinum à nardo sylvestri	430
Vinum cedrinum	423	Vinum nectarites	429
Vinum cedrites	424	Vinum œnanthinum	419
Vinum cestrites	427	Vinum omphacites	409
Vinum chamædryites	426	Vinum palmeum	421
Vinum è chamaelea	431	Vinum organites	428
Vinum chamæpityinū ibi.		Vinum panacites	430
Vinum è coniza	428	Vinum phthorion	431
Vinum cupressinum	423	Vinum è petroselino	ibi.
Vinum cydonites	418	Vinum picatum	424
Vinum daucites	430	Vinum pineum	423
Vinum dictamnites	427	Vinum è pipere	429
Vinum è flore salis	431	Vinum è pulegio	428
Vinum belleborites	432	Vinum resinatum	423
Vinum hyssopites	426	Vinum rhodites	420
Vinum ex iride	429	Vinum rheetes	ibid.
Vinum iuniperinum	423	Vinum saluiatum	430
Vinum laurinum ibidem		Vinum è satireia	428
Vinum lentiscinum	421	Vinum scammonites	433
Vinum mandragorites	432	Vinum scillinum	417
Vinum marathrites	431	Vinum selinites	431
Vinum è marrubio	427	Vinum stœchadites	426
Vinum melites	418	Vinum strobilites	423
Vinum melitites	410	Vinum è sycomoris	422
Vinum melomeli	429	Vinū è Syriaca nardo, cel	
Vinum è myrrha	429	tica, malabathro	429

Q 2



# INDEX.

Vinum terebinthinum		Vng. hedychroon	42
421		Vng. iasminum	5
Vinum thymites	428	Vng. irinum	46
Vinum è thymelæa	431	Vng. lilinum	4
Vinū tragoriganites	427	Vng. malabathrinum	5
Viola alba	285	Vng. megalinum	42
Viola purpurea	359	Vng. melinum	32
Viperæ ictus notæ 331. eius		Vng. mendesium	50
curatio	540	Vng. metopion	42
Viperinæ carnes	114	Vng. narcissinum	44
Viscum	270	Vng. nardinum	5
Vitis alba	324	Vng. ocyminum	4
Vitis nigra	325	Vng. oxnanthinum	32
Vitis sylvestris	327	Vng. onychinum	4
Vitis vinifera	401	Vng. rosaceum	32
Vitex	85	Vng. sampsuchinum	4
Vlmus	73	Vng. styracinum	4
Vmbilicus Veneris	349	Vng. susinum	4
Vnedo	101	Vng. telinum	4
Vnguentorum ratio	36	Vngula asini	120
Vng. abrotoninum	41	Vngula capræ	ibidem
Vng. amaracinum	48	Vnguis odoratus	11
Vng. anethinum	42	Vrina	14
Vng. butyrinum	45	Vrtica	343
Vng. cinnamominum	50	Vstio contra venenato	
Vng. crocinum	44	ictus	521
Vnguentum cyprinum	45	Vua	401
Vng. elatinum	38	Vua passa	401
Vng. gleucinum	48	Vulpinus pulmo	110
			Xai



I N D E X.

<b>X</b>		<b>Xyris</b>		<b>Z</b>	
<b>X</b> Anthion	365				314
<b>X</b> Xyphion	313	<b>Z</b> Ea, seu semen			155
Xylobalsamon	23	<b>Z</b> Zopiffa			66
Xylocinnamomum	18	<b>Z</b> Zythum,			154

F I N I S.

I N D E X N O M E N C L A T I O

*num, quibus officinae Seplasiariorū, & Herbarij  
nostrī temporis utuntur.*

<b>A</b>		<b>Berberis</b>		<b>77</b>	
<b>A</b> Cacia	83	Berula			175
<b>A</b> Agnus castus	85	Bismalua			297
Agrimonia	321	Borago			361
Alcanna	77	Branca vrsina			223
Alkekengi	337	Bruscus			367
Alloe	25	Bryonia			394
Apium	253	Buglossa			358
Apium risus	283	<b>C</b>			
Aphrodilos	198	<b>C</b> Alamentum			235
Arabis	190	Camomilla			292
Artichault	222	Capillus Veneris			364
Aspergula	271	Caprifolium			311
<b>B</b>		Cartamus			398
<b>B</b> Alsamita	175	Cataputia maior			381
Bardana	355	Cataputia minor			385
Basilicon	182	Cauda equina			323

Q 3



# INDEX.

Centinodia	306	Hermodactylus	341
Cerefolium	181	I	
Ceterach	290	I Arus	197
Cheiri	285	I Iringus	221
Coloquintida	392	Iua arthritica	301
Consolida maior	309	Iusquiamus	334
Cornu cerui	176	L	
Crassula maior	210	L Acca	26
Cucumer asininus	372	L Lapatium	167
D		Lappa maior	351
D Ragaganthum	224	Lappa minor	365
E		Laureola	368
E Nula campana	28	Lenticula aquæ	347
E Eupatoriū vulgatum	298	Lilium conuallium	346
F		Linaria	366
F Aba inuersa	210	Lingua hircina	316
F Filipendula	284	Liquiritia	216
Flammula	308	M	
Fumus terræ	355	M Aluauiscus	297
G		M Malum granatū	91
G Allitrichum	288	Mastix	61
G Genista	378	Matricaria	291
H		Matrisylua	311
H Edera terrestris	361	Melissa	276
H Hepatica	326	Mezereon	389
Herba Iudaica	318	Milium solis	295
Herba Simeonis	298	Millefolium	352
Herba tetrahil	318	Morsus gallinæ	347
		N	



# INDEX.

## N

**N** Asturtium aquati -  
cum 175  
Nenuphar 289

## O

**O** Robus 163

## P

**P** Apauer cornutum 333  
Papauer rubrum 330

Parietaria 346

Perforata 300

Perficaria 286

Pes columbinus 283

Petroselinum 153

Piperitis 203

Plantago aquatica 299

Polytrichon 365

Prasinum foetidum 276

Pulicaria 284

## R

**R** Esta bouis 223

Reuponticum 216

Rostium porcinum 177

Rubia tinctorum 296

## S

**S** Aponaria 199

Satyrium 287

Scariola 177

Scrofularia minor 208

Sicla 172

Sigillum Salomonis 307

Siler montanum 247

Solatrum 336

Sparagus 173

Spelta 155

Squilla 200

Squinantum 21

Stichas Arabica 230

Stœchas citrina 327

Sumach 91

## T

**T** Amariscus 75

Tapfus barbatus 353

Terpentina 61

## V

**V** Ermicularis 348

Vicia sylvestris 184

Vincamperuinca 307

Virga pastoris 220

Vngula caballina. 281

FINIS.

Q 4



Sanus libri verus  
est possessor Joan Camina  
Camina



# CVRATIONVM

## MORBORVM IN

### DIOSCORIDE

*contentarum*  
*Index.*

#### ABCESSVM

remedia.

**M**el  
Cucurbita  
Thlaspi  
Viscum  
Mentha  
Bechion siue Tussilago  
Pentaphyllon  
Buglosson

#### ABORTVM

facientia.

Asparagus  
Ampeloleuce  
Hedysaron  
Populus alba  
Oxyacanthos  
Coagulum  
Brassica sativa  
Cyclaminos  
Dracunculus duplex  
Onosma  
Scammonium  
Thelypteris  
Vinum phthorion, siue  
abortium  
Vinum helleborites  
Coniza.

#### ABORTVS

remedia.

Sabina Galbanum

#### ACONITO

contraria.

Falsamum  
Morus  
Lac schiston  
Coagulum  
Chamapitys  
Vinum in comuni  
Scoria, siue recremen-  
tum ferri.  
Diosc. lib. 6. cap. 7.

#### ACVLEOS ex-

trahentia.

Vide, spicula corpori  
infixa extrahentia.

#### ACVLEATORVM

ictus remedia.

Laurus  
Malua  
Sisymbrium  
Anisum  
Althaa  
Oxalme  
Vinum thymite



# INDEX

Adipum medela  
Diosc. lib. 2. cap. 68.

ADVRENTES  
medicina.

Buprestis  
Cantharides  
Pityocampæ  
Salamandra.

ADVSTIONVM  
remedia.

Vide, Ambustorum re-  
media.

AEGYLOPIAE  
remedia.

Asarum Myrtus  
Iuglans Oryza  
Malua Plantago  
Myosota, vel myosotis  
altera

Baccharis Anthemis  
Strychnon satiuū siue  
Solanum hortense

Aegilops  
Vua ænanthe Alica.

ALARVM virus  
extinguentia.

Myrrha Myrtus  
Scolymos, siue Car-  
duus Alumen.

ALGORIS RE-  
media

Laurinum oleum  
Ocyminum vnguētum  
Cinnamomum  
Aristolochia terra  
Abrotonum

Vinum scilliticum  
Elcomel, vel Elcomell.

ALLII acrimoniā  
extinguentia.

Ruta.

ALOPECIAE mor-  
bi remedia.

Harundo Iuglans

Auellanæ

Erinaceus terrestris

Hippocampus

Ranæ Locustæ

Adeps Finum

Rhaphanus Beta

Cepe Milium

Sinapi Cyclaminus

Asphodelus

Batrachion

Myosotis

Nymphaea

Cynoglosson

Adianton Thapsia

Acrugo ferri

Sandaracha

Halcyonium Cotes

Cinis vngularum capri-  
narum

ALVVM con-  
turbantia.

Eruum Orobus

Brassica sativa

Allium Capparis

Peplus Vua recentes

Vinum dulce

Aqua maris Flos salis.

ALVVM soluentia  
atque



# CVRATIVVS.

atque purgantia.		Brassica marina	
Afarum	Crocus	Malua	Elitum
Crocomagma		Asparagos	
Oleum amygdalinum		Porrum	Cepe
Oleum cicinum		Struthion	Zinziber
Oleum balaninum		Cyclaminos	Scilla
Oleum cnidium		Bulbus esculentus	
Olea Aethiopica		Agaricum	Aloë
Fagus	Galla	Absynthium	Scirpium
Faba Thebaica		Hyslopum	
Siliquæ		Ammoniacum	
Mespilus	Cornus	Phyllitis	Cestron
Ficus Aegyptia		Scordion	
Caprificus		Chamaepitys	
Cerasia	Melimela	Androsamon	
Citrea mala	Pruna	Papauer ceratitis	
Amygdalæ amara		Vrtica	Cynoglosson
Morus	Ficus	Spartum	
Tellinæ	Chama	Balanus myrepica, si-	
Iuncus odoratus		ue glans vnguentaria	
Cochleæ terrestres		Hippophaes	
Sepiæ	Silurus	Characias	Linozostis
Pisces saxatiles		Lathyris	Quercus
Lac	Lac schistum	Chamaesyce	Cicid
Butyrum	Medulla	Scammonium	
Fel	Fimum	Ampeloleuce	
Tragus	Linum	Thelypteris	Passum
Lens	Phaselus	Meliceratum	
Rhaphanus		Vinum Albanum	
Lapathum		Vinum Lesbium	
Nasturtium		Coccimela	
Eruum	Eruca	Vinum melitite	
Scandix	Lactuca	Thalassonieli	
Cucumis		Vinum absynthite	
Cucurbita	Atriplex	Vinum helieborite	
Brassica sativa		Vinum scammonite	
		Rub	



# INDEX

Rubrica Gnopsis.		Aloe	Hæmia
ALVVVM iustentia.		Ruta	Anisum
Aspalathus		Orchis serapias	
Mallichinum		paonia	Althæa
Laurinum		polygonon mas	
Populus nigra		Lagopus	
Populus picea		Clematis daphnoides	
palurus		Xyris	Anchusa
Oxyacantha		Gramen Parnasium	
Cynosbaros		Rubus Pentaphyllum	
Cistos	Rosa	Phoenix herba	
Acacia	Palma	Idea radix	
Palma clate		Oxyfcheenus	
Malum puniaum		Rubrica sinopsis	
Malus	Siliquæ	Aizoon	
Cotonæ		Papauer fatium	
Mala epirotica		Adianton	
Pyra	Mespilus	Philomides	Vum
Lorus	Cornus	Vinum phalernum	
Sorbus	Pruna syriaca	Vinum ænanthe	
Lepus terrestris		Vinum passum	
Lac	Cafeus	Vinum rhoite	
Fuligo buryri		Vinum myrtite	
Sanguis	Fimum	Vinum cedri	
Lyncurion	Triticum	Vinum lauri	
Brassica fatiua		ALVINIS villa.	
Hordeum	Plantago	Coagulum	
Crimnon	Seris	Nymphaea	
Bromos	Chondryllæ	Clymenon	
Oryza	Alica	Papauer fatium	
Milium	Faba	Omphacomeli	
Leus	Anethum	AMATORIS ve-	
Apium	Aphaec	nesicis attributa.	
smyrnion		Cyclaminos	
Hippomarathrum		Catanance	
Acantha		Dorycnion	

Cot



# CURATIVVS.

Coryledon		64.	
Mandragoras		ANGINAE re-	
Leontopodion		media.	
Phyteuma		Acetum Absynthium	
AMBVSTORVM		Cyprinum vnguentum	
remedia.		Cedria	Cæpe
Acacia		Crocodilium	
Asphodelos		Elaterium	
Aristolochia		Fel animalium	
Althæa	Ascyron	Fimum	Hirundo
Aizoon maius		Hyssopus	Irinum
Arction	Alumen	Laserpitium	
Atramentū scriptoriū		Mel	Oxymel
Euccinum	Beta	Spertum siue genista	
Cyros	Cistos	Sal	Viola
Coriū vstum, siue vete-		Piper	Pix
rum calceamentorum		Rhaphanus	
Cynoglossum		ANHELITVS dif-	
Cinnabaris		ficulatis re-	
Ebulus	Fimum	media.	
Phlomis, siue verbasco		Asarum	Balsamum
Gallion	Hedera	Naphtha	
Hypericon	Helxine	Centaurium minus	
Lactuca sylvestris		Baccharis	Peucedanū
Lilium	Myrtus	Galbanum	
Morus	Malua	Parthenion	
Narcissus		Adianton	
Oliuæ colymbades		Ampeloleuce	
Ouum	Picca	Et infra in verbo Or-	
Platanus	Plantago	thopnoicis.	
Sesamum	Stimmi	ANIMALIVM feri-	
Sal	Thus	tas mitigatur.	
Vnguentum felinum.		Ocnagra	
AMPHISBAENAE		ANI remedia.	
morsus curatio.		Vide, Sedis remedia.	
Dioscorides lib. 6. cap.		ANIMALIA ven-	
		tris	



# INDEX

Rubrica Cinopis.		Aloe	Hæma
ALVV M sistentia.		Ruta	Anisum
Aspalathus		Orchis serapias	
Maltichinum		Præonia	Althæa
Laurinum		Polygonon mas	
Populus nigra		Lagopus	
Populus picca		Clematis daphnoides	
Paliurus		Xyris	Anchusa
Oxyacantha		Gramen Parnasium	
Cynosbatos		Rubus Pentaphyllon	
Cistos	Rosa	Phoenix herba	
Acacia	Palma	Idea radix	
Palma clate		Oxyschœnus	
Malum puniceum		Rubrica sinopis	
Malus	Siliquæ	Aizoon	
Cotoneæ		Papauer sativum	
Mala epirotica		Adianton	
Pyra	Mespilus	Phlomidis	Vuæ
Lotus	Cornus	Vinum phalernum	
Sorbus	Pruna syriaca	Vinum œnanthe	
Lepus terrestris		Vinum passum	
Lac	Cascus	Vinum rhoite	
Fuligo butyri		Vinum myrtite	
Sanguis	Fimum	Vinum cedri	
Lyncurion	Triticum	Vinum lauri	
Brassica sativa		ALVINIS vtilia.	
Hordeum	Plantago	Coagulum	
Crimmon	Seris	Nymphaea	
Bromos	Chondryllæ	Clymenon	
Oryza	Alica	Papauer sativum	
Milium	Faba	Omphacomeli	
Lens	Anethum	AMATORIS ve-	
Apium	Aphace	nesicii attributa.	
Smyrnion		Cyclaminos	
Hippomarathrum		Catanance	
Acantha		Dorycnion	

Cot



# CVRATIVVS.

Cotyledon	64.	
Mandragoras	ANGINAE re-	
Leontopodion	media.	
Phyteuma	Acetum Absynthium	
AMBVSTORVM	Cyprinum vnguentum	
remedia.	Cedria	Cepe
Acacia	Crocodilium	
Asphodelos	Elaterium	
Aristolochia	Fel animalium	
Althaea	Fimum	Hirundo
Aizoon maius	Hyssopus	Irinum
Arction	Laserpitium	
Alumen	Mel	Oxymel
Atramentū scriptoriū	Spartum siue genista	
Buccinum	Beta	
Cyros	Cistos	Sal
Coriū vstum, siue veterum calceamentorum	Piper	Viola
Cynoglossum	Rhaphanus	Pix
Cinnabaris	ANHELITVS dif-	
Ebulus	ficulatis re-	
Fimum	media.	
Phlomis, siue verbasco	Asarum	Balsamum
Gallion	Naphtha	
Hedera	Centaurium maius	
Hypericon	Baccharis	Peucedanū
Helxine	Galbanum	
Lactuca sylvestris	Parthenion	
Lilium	Adianton	
Myrtus	Anipeloſcuce	
Morus	Et infra in verbo Or-	
Malua	thopnoicis.	
Narcissus	ANIMALIVM feri-	
Oliuæ colymbades	tas mitigatur.	
Picea	Oenagra	
Plantago	ANI remedia.	
Sesamum	Vide, Sedis remedia.	
Stinmi	ANIMALIA ven-	
Thus	tris	
Vnguentum felinum.		
AMPHISBAENAE		
morsus curatio.		
Dioscorides lib. 6. cap.		



# INDEX

tris expellentia.  
Vide, Tineas latas pel-  
lentia.

ANIMALIA quæ  
perimunt.  
Diosco. lib. 6. in præfa-  
tionis fine.

ANIMALIV Mictus  
remedia.

Bdellium  
Panaces heracleon  
Terra lemnia  
Diosco. lib. 6. cap. 55.

ANIMI defectus  
remedia.

Cucumis Pulegium  
Coris

ANIMI volupta-  
tes auget

Buglosson.  
ANIMI deliquia  
generantia.

Diosco. lib. 6. in præfat.  
ANODYNA.

Hyoscyamus  
Aconitū pardaliāches.

ANTIDOTVM in-  
gredientia.

Acorus Phu  
Anomum Costum

Iuncus odoratus  
Cyphi

Scineus, siue scingus  
Sanguis Rapæ satiuæ

Napum, siue bunias  
Brassica sativa

Piper Abrotonum  
Stichas Ruta  
Caros Anethum

Petroselinon  
Hedysaron  
Mandragoras  
Rubrica, siue terra le-  
mnia.

APVM ictus  
remedia.

Laurus Malua  
Sisymbrium  
Althæa

Diosco. lib. 6. cap. 57.  
APOSTEMATVM

remedia.  
Vide, Suppurationum

remedia.  
APPETITVM

generantia.  
Cerasia.

APPETITVM  
incitantia.

Vinum in comuni  
Vinum Selenite.

AQVAE inter cu-  
tem remedia.

Vide Hydropicorum.

ARANEIS con-  
traria.

Morus  
Grossi

Melanthion.  
ARANEI ictus

remedia.  
Mullus piscis

Al



# CVRATIVVS.

Allum	Bulbus esculentus
Melissophyllon	Centaurium minus
Coris Oxyſchœnus	Cinis vitium
Hyacinthus	Helleborus niger
Aizoon maius.	Scammonium
ARGENTI viui	Mandragoras
curatio.	Meon
Dioſc. lib. 6. cap. 28.	Nardus
ARGEMATVM	Cuum
morbi remedia.	Palma elate
Fel animalium	Pentaphyllon
Vrina	Pſyllium
Lactuca ſylueſtris	Ruta
Cera Argemone	Thapſia
Anagallis Ocyminum	Thymoxalme
Papauer ceratitis	Vua paſſa
Lotus ſatiua.	Vinum melitite.
ARQVATORVM	ARTERIAE re-
remedia.	media.
Onos ſiue millepeda	Irinum
Asparagus	Myrrha
Cyclaminos	Thus
Sphondylion	Caryotæ, ſiue caryoti-
Oenanthe	des
Buphthalmos	Ficus
Chryſanthemon	Sinapi
Vinum abſynthite.	Præſon, id eſt porrum
ARSENICI, ſiue	Glycyrrhiza
auripigmenti	Triticum
curatio.	Rhaphanus
Dioſc. lib. 6. cap. 29.	Laſerpitium
ARTICVLORVM	Pentaphyllon
morbis vtilia.	Vua paſſa
Amurca Anethinum	Rhodomeli
Agaricum	Tragacantha.
Arſtion	ASPIDVM morſus
	remedia.
	Cimices lecti
	But



# INDEX

Butyrum	Clematis	Lixiua ex ficu
Daphnoides		Ionia siue Cionia
Aqua maris		Adeps
Diosc. lib. 6. cap. 70.		Adipum medicinae
ASTRICTORIAE		Faba Aegyptia
medicinae.		Lens
Aspalathus		Portulaca
Bryon	Crocus	Seris
Oleum omphacinum		Porrum
Oleum ex oleastro		Hedera
Myrrha		Myosotis
Unguentum melinum		Agaricum
Unguentum cenanthinum		Rhaponticum
Cortex thuris		Gentiana
Picea ac pinus		Absynthium
Pityides	Lentiscus	Absynthium seriphiu
Terebinthus		Mentha
Fuligo picis		Melilorus
Cypressus	Iuniperus	Maron
Vlmus	Paliurus	Ruta
Cyprus	Lilia	Cuminum satium
Cistos	Hypocistis	Hieracium maius
Cydonia	Rosa	Coniza tertium genus
Acacia	Salix	Lysimachium
Vitex		Clymenos
Olea sylvestris		Anchusa
Quercus	Castanea	Idaea radix
Galla	Thus	Granum tinctorum
Palma	Palma elate	Chrysocome
Malicorium	Myrtus	Aizoon maius
Myrtidanum	Malus	Phlomidis
Cotonra	Persica	Lotus sylvestris
Pyra	Pyra sylvestria	Ebulus
Mespilus		Vitis sylvestris
Mespilus alia		Nuclei acinorum
Cornus	Morus	Vua cenanthe
		Omphacium
		Passum
		Vinum omphacite
		Vinum nigrum e la-
		brusca
		Vinum cydonite
		Omp



# CURATIVVS.

Onphacomeli	Bulbus esculentus.
Vinum apiite	AURIVM medi-
Vinum myrtite	cina.
Vinum palmeum	Cannabis sativa
Vinum cedro	Araneus
Vinum pifsite	Adipum medicinae
Vinum absynthite	Asphodelus
Vinum tragoriganite	Absynthium Anisum
Vinum prasire	Aparine Aqua maris
Vinum calaminthite	Acetum
Vinum aromatite	Acetum scilliticum
Opuma argenti	Alumen Aphronitrum
Chryfocola	Elattæ Beta
Cinnabaris	Crocus Cistos
Chalcantion	Cornix Cucurbita
Diphryges	Cepe Capparis
Arsenicum	Cucumis anguinus
Sax vini	Daphnides
Lapis Phrygius	Dracunculus maior
Lapis Afus	Ficus
Lapis scissilis	Fel animalium
Terra cretria	Faba Aegyptia
Lapis Samius	Flos aris Flos salis
Fuligo pictoria.	Hedera Helxine
ASSVLAS fixas cor-	Irinum vnguentum
poribus extra-	Hyssopus Laurinum
hentes.	Lycium Lapation
Tochlea terrestres.	Malum punicum
ATTONITIS vtilia	Myrrus Mel
Ampeloleuce.	Myosotis Mentha
AURVGINEM	Melilotus Myrrha
tollentia.	Oleum amygdalinum
Lycium Agaricum	Oleum balaninum
Libanotis coronaria.	Oleum hyoscyaminum
AURICVLARVM	Olea syluestris
remedia.	Onos Origanum
	R



# INDEX

Omphaculum	Pix	Allium	Argemon
Populus alba		Eryngium	Pulegium
Plantago		Apium	Vinum cedrites
Porrum	Peucedanus	Sal	Terra samia
Prasion		B I L E M adgene-	
Polygonon mas		rantia.	
Papauer fatium		Iuglans.	
Psyllum		B I L E M pur-	
Rhus obsoniorum		gantia.	
Rosa	Salix	Agriorhaphanus	
Senecta serpentis		Androsamos	
Sesamum	Sinapi	Anchusa	Apios
Spondylium	Stoebe	Brassica canina	
Strychnum fatium		Calamintha	
Sulphur		Clematis	Cici
Thus cum pice		Cucumis anguinus	
Terebinthina		Characias	Chamaelea
Vermes	Vrina	Helleborum nigrum	
Vinum myrteum, siue		Elaterium	Ebulus
myrsinite		Epithymu	Empetron
Vinum cedrites.		Helenium	Hippophaes
<b>B</b> D E L L A R V M,		Heliotropium	
siue hirudinum cu		Iris illyrica	
ratio.		Lychnis sylvestris	
Diosc. lib. 6. cap. 32.		Lathyris	Linzoostis
B E S T I A S fu-		Malus	Melanthion
gantia.		Mentha	
Acantha leuce, siue spi-		Mandragoras	
na alba.		Ocymum	Parthenion
B E S T I A R V M ve-		Peplus	Scammonia
nenatarum remedia.		Thlaspi	Thapsia
Balsamum.		Thymelae	
B E S T I A R V M mor-		Vitis fatiua	
sus remedia		Vnguentum	fusiua
Helenium Aegyptium		id est, lilii.	
Sanguis	Porrum	B L A T T A S in se	

cont



# CVRATIVVS.

contrahentia.	Amygdalus amara
Phlomisides.	Osisifragus
BOVM scabiem	Vrina
emendantia.	Struthion
Cedria.	Centaurium maius
BRONCHOCE-	Bdellium Daphnides
las discutientia.	Paliurus Pruna
Vide, gutturis remedia	Fimum Lapathon
BVPRESTIS ve-	Sisymbrium Ononis
neni remedia.	Cuminum sylvestre
ac schiston.	Artemisia
Dioscorides libro 6.	Hippomarathon
cap. 3.	Asplenon Anthemis
CACHEXIAE, id	Parthenion Paonia
est maiore remedia.	Lithosperma
qua maris.	Althæa Tribulum
CACOETHE re-	Saxifragum
media.	Gramen Tragion
unguentum rosaceum	Acanthus
rocinum Thus	Cotyledon prima
landes Ficus	Vitis sativa
icer Plantago	Myrtus sylvestris
racunculus maior	Oxalme
racunculus minor	Lapis Iudaicus Ochra
edera Viscum	Lapides spongiarum.
selepias Psyllium	CALEFACTO-
rtica Petasites	riae medicinae.
admia Diphryges	Adipum medicinae
los salis.	Medullae animalium
CALCIS curatio.	Fel Cera
Diosc. lib. 6. cap. 29.	Propolis Triticum
CALCVLI remedia.	Rhaphanus
yperus	Rhaphanus agria
ardamomum	Sisymbrium
oleum amygdalinum	Sisymbrium aquaticum
erasia	Sinapi Nasturtium



# INDEX

Thlaspi	Erysimon	Myrrha
Piper	Zingiber	Myrrha Bœotica
Dracunculus maior		Styrax
Dracunculus minor		Thus
Asphodelus		Refina
Bulbus esculentus		Tuniperus
Agaricum		Sabina
Gentiana		Cedrides
Anonis, siue Ononis		Daphnides
Eryngion		Cistos alia
Abfynthium		Amygdalæ amara
Abfynthium seriphium		Ficus
Hyssopum	Origanum	Lixiuia ex ficu
Tragoriganum		Cisseris
Pulegium		Cochleæ terrestres
Mentha		Fiber
Serpyllum		Euprestis pityocampa
Sampsuchum		Salamandra
Maron	Aspalathus	Ocypus
Crocomagma		Panaces heraclion, siue
Helenium		herculeum
Oleum vulgare		Ligusticum
Oleum sicyonium		Seseli Mafsiliense
Strigmenta gymnastorum & palæstrarum		Sison
Elæomeli	Laurinum	Caros
Sampsuchinum		Cyminum satium
Ocyminum		Ammi
Anethinum	Sufinum	Orcoselino
Cyprinum, siue ligustrium		Smyrnion
Irinum	Gleucinum	Hippomarathrum
Amaracinum		Daucus
Metopium		Laserpitium
Stacte	Nardinum	Galbanum
Malabathrinum		Ammoniacum
		Stachy
		Scordion
		Artemisi
		Anthemis
		Chryfocom
		Portulaca agrestis

Lo



# CURATIVVS.

Lotus fylueſtris		CALLORVM
Vinum picatum		remedia.
Vinum in comuni		Triticum
Aqua maris		Laſerpitium
Vinum è cedro, arbori-		Chalcitis lapis.
bùsque aliis		CANCRESCEN-
Vinum è cypreſſo		tibus vlceribus
Vinum cedrite		medetur.
Vinum chamædryite		Vrtica.
Aerugo aurificum		CANES occidentia.
Chryſocolla		Aſparagus
Chalcanthon		Apocynon.
Alumen Sulphur		CANIS rabie ſanat.
Floſ ſalis Pyrites		Alyſſum.
Lapis hæmatites.		CANIS rabioſi mor-
CALEFACTO-		ſus remedia.
rum remedia.		Lycium Cancr
Lana ſuccida.		Cinis vitium Garum
CALIGINIS ocu-		Omotarichos
lorum remedia.		ſmaris
Fel animalium		Iecur ardens canis
Laſtuca fylueſtris		Triticum Sanguiſ
Ocymum Cape		Mel Groſſi
Dracunculus maior		Panaces heracleon
Sinapi Naſturtium		Cape Laſerpitium
Eryſimon Piper		Vrina
Zinziber		Aſter atticus
Dracunculus minor		Meliſſophyllon
Anagallis		Vrtica Cynogloſſon
Chelidonium maius		Feniculum
Sagapenon		Ballote Oxalme
Chamædryſ		Aphronitrum, ſiue ſu-
Chamaſyce		ma nitr.
Floſ aris		Dioſc. lib. 6. cap. 37.
Pumex Fax vini		Herm. Coroll. cap. 212.
Lapis thyites.		CANIS non rabidi

R



# INDEX

morsus remedia.	Cupressus	
Amygdalæ amaræ	Fagus	Ile
Iuglans	Ficus	Palma elate
Mituli	Gobius	Myrtus
Cucumis		Heder
Bulbus esculentus		Elelisphacos
Mentha	Ebulus.	Rubu
CANIS impetum	CAPILLVM	
cohibentia.	rufantia.	
Iecur & dens canis.	Cyprus	Lycium
CANES necantia.	Lotus	Fax vina
Chamæleon albus.	CAPILLVM fla-	
CANVM scabiem	uum reddentia.	
emendantia.	Aqua maris.	
Oleum lentiscinum	CAPILLVM	
Cedria.	purgantia.	
CANTHARIDES	Fœnogræcum	
fugantia.	Linum.	
Vnguentum melinum.	CAPILLOS	
CANTHARIDVM	tingentia.	
veneni remedia.	Acacia	
Lac schiston	Myrtus	Moru
Adipum medicinæ	Stratiotes terrestres	
Diosc. lib. 6. cap. 1.	Ebulus	
CAPILLORVM	Terra ampelites.	
defluuium repri-	CAPILLOS	
mentia.	nutrientia.	
Oleum ex oleastro	Iuglans	
Myrrha	CAPITIS vlce-	
Cistos alia, siue ladanū	rum remedia.	
Myrtus	Balsamum	
Brassica sativa	Oleum ex oleastro	
Nasturtium	Oleum amygdalinum	
Aloë	Vnguentum rosaceum	
Adiantum.	Telinum	
CAPILLVM	Narcissinum	
denigrantia.	Myrrha	Thus
		Vrina



# C V R A T I V V S.

Vrina	Fœnogræcum	Oxyſchœnos
Cicer	Linum	Psyllium
Malua	Allium	Papauer rhœas, ſiue cep- raticum
Cyclaminos		
Bulbus eſculentus		Strychnon, ſiue ſolanū
Melilotus	Lilium	ſatium
Bettonica, ſiue Britan- nica		Aizoon maius
Xyris	Rubus	Hippogloſſon
Rubus Idæus	Oxalme	Chamaedaphne
Vinum myrſinite Sal.		Myrtus ſylueſtris
C A P I T I S dolo- ris remedia.		Elaterium
Iris Illyrica	Aſarum	Scammonium
Meon, ſiue meu		Vitis ſatiua
Oleum oleaſtri		Vinum
Oleum amygdalinum		Vua œnanthe
Vnguentum roſaceum		Aqua maris
Narciſſinum	Cyprus	Acetum ſcillite
Rofæ	Vitex	Lapis ophites.
Amygdalæ amaræ		C A P I T I S dolo- rem facientia.
Torpedo		Styrax
Lac humanum		Glandes
Lana ſuccida		Arbutus
Curmi	Sifymbrium	Iuglans
Sefamum	Hedera	Eruum
Portulaca	Aloë	Absynthium
Mentha	Serpyllum	Ferula
Baccharis	Ruta	Meu, ſiue meon
Aniſum		Peucedanus
Sphondylion		Mandragora
Peucedanum		Vinum gypſatum
Melanthion		Vinum phœnicite
Coniza maior		Vinum rhetinite
Anagyris	Bettonica	Vinum meſagite.
Radix hederae		C A P V T purgantia.
		Anemone



# INDEX

Brassica sativa	Characias	Cadmia
Beta	Cape	Aes vltum
Chelidonium minus		Flos aris
Chalcanthum		Laserpitium
Cyclaminos		Lana vsta
Origanum.		Lapis Asius
CARBVNCVLO-		Spuma argenti
rum medicina.		Smaris.
Brassica sativa		CARCINOMA-
Cupressus		tum remedia.
Cinnamomum		Fuligo thuris
Cyprus		Buprestis
Coriandru	Characias	Erysimon
Eruum	Finum	Dracunculus maior
Juglans		Dracunculus minor
Lupinum satium		Aristolochia tertia
Laserpitium		Vrtica
Nasturtium		Galiopsis.
Olea sylvestris		CASEVS ne cariem
Pix	Plantago	sentiat.
Panaces heracleon		Dracunculus minor.
Sabina	Vua passa.	CAVA implentia.
CARDIACO-		Cadmia Pompholyx
rum reme-		Cerussa
dia.		Lapis schistos
Buprestis		Lapis morochthus
Seris	Rubus.	Terra samia
CARNEM tenerio-		Fuligo thuris
rem reddentia.		Aristolochia tertia.
Vrtica siue acalyphe.		CAEPAE acrimonia
CARNEM coalesce		retundit
re facientia.		Ruta.
Lixiua ficus		CAERASTAE ictus
Symphyton.		remedia.
CARNES superua		Cedria, siue cedrinus li
cuas compescentia.		quor.
		Harundo
		Rosa



# CVRATIVVS.

Rosa	Sal	Aeris flos
Dioscor. lib. 6. cap. 55. & 69.		Aerugo aurificum
CERVSSAE	CV-	Fuligo butyri
ratio.		Faba
Dioscor. lib. 6. cap. 22.		Fax vini
CERIONVM VL-		Oleum myrtinum
cerum remedia.		Oleum Balaninum
Grossi	Pepo	Oleum cicinum
Quare, Fauos rum-		Olea Aethiopica
pentia.		Peucedanum
CERVICIS rigo-		Plumbum clotura
ris medicina.		Pumex
Vide, Opisthotonico-		Scoria argenti.
rum remedia.		CICVTAE con-
CHIRONIORVM		traria.
ulcerum remedia.		Passum & vinum
Plantago		Vinum in comuni
Ampeloleuce.		Acorum
CHOLERICIS		Hermo. Cor. cap. 17.
utilia.		CIMICES fugan-
Cotonea mâla.		tia & negantia.
Calamintha		Hermo. Cor. cap. 366.
Ferrum	Mentha	& 806.
Polygonon mas.		CLAVORVM
CICATRICVM		remedia.
remedia.		Smaris
Anemone		Fimum
Aloe	Adeps	Lasertium.
Bulbus esculentus		COELIACORVM
Balanus myrepica		Remedia.
Cistos	Centaurium	Myrrha
Chamae syce		Hypocistis
Calx viua		Lycium
Corallium		Olea syluestris
Aes vstum		Quercus aut robur
		Galla
		Thus
		Myrtus
		Cotonea
		Morus
		Lixiua ex ficu



# INDEX

Ceruinum cornu	numi remedia.
Faba Aegyptia	Amomum
Lapathon	Vnguentum telinum
Plantago Coronopus	Zopissa Naphtha
Rhaponticum	Myrica Paliurum
Acantha leuce, siue spi- na alba	Cyprus
Ferula	Olea syluestris
LasERPitium	Glandes Morum
Tragos herba	Grossi Ouum
Papauer satiuum	Triticum Hordeum
Vinacci	Fœnogræcum
Nuclei vinaceorum	Linum Cicer
Elæomeli	Agriorhaphanus
Vinum phœnicite	Plantago Sonchos
Vinum rhetinite	Nasturtium
Ferrum	Bulbus esculentus
Lapis morochthus.	Argemone altera
COLI remedia.	Rhaponticum
Colocynthis	Acantha leuce
Fimum Galerita	Thymus
Mel Petroselinum	Coriandrum
Ruta Sefamum	Smyrnum
Talus suis.	Libanotis Viscum
COLOREM com- mendantia.	Parthenion
Acetum scillite	Cannabis syluatica
Buphthalmos	Anagyris syluatica
Cerussa	Helxine
Cyminum satiuum	Pentaphyllon
LasERPitium	Peristerion supinus
Mastichinum	Papauer satiuum
Vnguentum rosaceum	Stratiotes aquaticus
Vinum	Cytisus
Vinum aromatite.	Ampelos leuce
COLLECTIO.	Vinum in communi
	Vinum adynamon
	Vinum cydonite.

COM



# C V R A T I V V S.

## COMITIALIS morbi remedia.

Cardamomum  
Balsamum Naphtha  
Populus nigra Ficus  
Iuncus odoratus  
Lepus terrestris  
Mustela c cur  
Vnguis asini  
Lichen equi  
Iecur hirci Hirudines  
Serum Lac humanum  
Coagulum Fel  
Sanguis Fimum  
Plantago  
Eryngion Ruta  
Seseli Mafsiliense  
Libanotis  
Sphondylion  
Peucedanum  
Laserpitium  
Galbanum  
Sagapenum  
Ammoniacum  
Trifolium  
Coniza Anthyllis  
Symphyton Cestron  
Pentaphyllon  
Papauer aphrodeles  
Viola purpurea  
Helleborum nigrum  
Hippophæstion  
Ampelos leuce  
Ampelos melana  
Oxymel  
Acetum scillite

Lapis selenites  
Lapis aetites  
Cotes.

## CONCEPTIONI contraria.

Epimedium  
Heliotropium maius  
Aerugo ferri  
Alumen  
Lapis ostracites  
Hermo. Cor. cap 267.

## C O N C E P T I O - nem facilitantia

Coagulum  
Lolium  
Staphylinos agrios  
Lapis samius.

## CONCOCTIO - ni vtilia.

Anethum Althæa  
Acetum scillite  
Balsamum Crocus  
Crocomagma  
Caros Cestron  
Calx viua Eruca  
Ligusticum Pulegium  
Papauer satium  
Resina Styrax  
Seseli Mafsiliense  
Sulphur Vinum  
Vinum resinatum  
Vinum absynthite  
Vinum tragoriganste.

## CONSTRICTO - riæ medicina.

Vide, Adstrictoriae me-  
dicæ



# INDEX

dicina

CONVULSIO-  
nis remedia.

Iris Illyrica

Acorus

Cardamomum

Asarum Costus

Iuncus odoratus

Balsamum Helcniun

Calamus odoratus

Sampfuchinum

Metopium

Bdellium Iuniperus

Cedrides Halimos

Lixiua à ficu Fimum

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Capparis Argemone

Rhaponticum

Gentiana

Aristolochia tertia

Centaurium maius

Acantha leuce

Abrotonum

Origanum Pulegium

Calamintha

Serpyllum

Eaccharis

Panaces heracleon

Libanotis

Peucedanum

Laserpitium

Sagapenon

Galbanum

Clinopodium

Chamaedrys

Alisma Cestron

Xyris Symphytum

Psyllium Phlomidet

Ampeloleuce

Vinum scilliticum

Vinum chamaedryte

Vinum tragoriganite

Vinum daucite

Vinum panacite.

CONDYLOMA-  
tum remedia.

Strigmenta à balneis

Myrteum Myrtus

Cotonea Ouum

Aloe Anethum

Libanotis

Ballote Stachys

Phalangion

Penthaphyllon

Vitis sativa Ferrum

Plumbum elotum

Sandaracha.

CORDIS tremoris  
medicina.

Nardi spica.

CORIANthro  
contraria.

Vinum in comuni

Dioscor. lib. 6. cap. 9.

CORPORA defun-  
cta à corruptione diu-  
tuetur

Cedria.

CORPVS macre-  
scentia.

Canc



# C V R A T I V V S.

anchamum.		CROCEVM colo-
COXA E doloris re-		rem facit
media.		Rhaponticum.
trigmenta à palæstris.		CRVDITATIS
COXENDICVM		remedia.
doloris remedia.		Balsamum
Asparagus		Strigmenta à balneis
Agaricus	Alchæa	Gentiana
Abrotonum		Vinum scilliticum.
Aster Atticus		CRVSTAS generat
Acetum scilliticum		Lana vsta.
Centaureum minus		CVLICES fugan-
Calamintha		tia.
Coris	Cestron	Cupressus
Cucumis sylvestris		Coniza
Erysimum		Ebulus
Euphorbium		Absynthium
Fimur	Garus	Hiberis
Helenium		Plumbum vstum.
Ammoniacum		CVTEM albicantia.
Hypericon	Hiberis	Rapum sylvestre.
Heliochrysos		CVTEM erugantia.
Iris Illyrica	Lolium	Oleum amygdalinum
Lupinum sativum		styrax.
Laserpitium		CVTEM lenientia.
Naphtha	Onos	Amygdala amara
Populus alba		Oleum sicyonium
Panaces heracleon		Vnguentum relinum
Peucedanum		Succus peponis
Pentaphyllon	Ruta	Terra Chia.
Scammonium		CVTIS vitia tol-
Vinum asarite	Xyris.	lentia.
CRASSITVDI-		Adarce Ampelos leuce
nē extenuātia.		Amygdalæ amaræ
Porrum		Cochleæ terrestres
Staphis agria.		Costus
		Chamaeleon niger
		Iris



# INDEX

Iris Illyrica	Lac	Ficus	Galba
Ficus	Linum	Galbanum	Hedera
Lupinus		Hyoscyamus	
Lotus syluestris		Hyssopus	
Mel Ponticum		Lascripitium	
Oleum raphaninum		Leucacantha	
Picca		Myrica	Morus
Sanguis leporis		Melanthion	
Spuma argenti.		Melissophyllon	
CVTIS pruritus remedia.		Naphtha	
Lac.		Olea Aethiopica	
<b>D</b> ENTIVM dolo- ris remedia.		Picca	Plantago
Amurca		Panaces heracleon	
Halicacabus		Pyrethrum	
Asparagus		Peucedanum	
Allium	Anagallis	Pentaphyllon	
Aristolochia		Rhus	Rana
Acantha leuce		Sepia	
Absynthium		Senecta serpentis	
Arction	Acetum	Strychno hypnoticon, sive somniferum	
Acetum scillite		Vnguentum rosaceum	
Alumen	Batrachion	Vermes terreni.	
Cedria	Cytinus	<b>D</b> ENTIVM stupo- ris remedia.	
Cochleæ terrestres		Portulaca.	
Capparis		<b>D</b> ENTITIONI in- fantium vtilia.	
Chelidonium maius		Leporis cerebrum	
Chamaeleon niger		Butyrum cum melle.	
Clematis daphnoides		<b>D</b> ENTIFRICIA.	
Cucumis anguinus, sive syluestris		Purpura	Buccinum
Characias		Ceruinum cornu	
Colocynthis		Halevonium	
Ephemeron		Corallium.	
Helleborus niger		<b>D</b> ENTIBVS stupo- rem	



# C V R A T I V V S.

rem adferentia.	Althæa	Viscum
adma.	Galbanum	
DENTES firmantia.	Ammoniacum	
entiscus	Lapis Gagates.	
oliuæ colymbades	DOLORVM inue-	
Myrrha	teratorum remedia.	
Oleum omphacinum.	Sinapi	
DENTES albica-	Lana succida	
re facit.	Ligusticum.	
Malcyonium.	DOLORES lateris.	
DENTES vitiatos	Vide, laterum dolores.	
extrahentia.	DOLOREM ne sen-	
Amurca	tiant qui vrendi se-	
Oleum oleastri.	candive sunt.	
DENTES mouentia.	Mandragoras	
Oleum oleastri.	Lapis memphites.	
DEPILES facientia.	DORYCNI curatio	
scolopendria	Diosc. lib. 6. cap. 6.	
Characias.	DRACONIS mari-	
DESQVAMATIS	ni morsus.	
vtilia.	Mullus piscis	
Strigmenta gymnasto-	Vrina	Ocymum
rum	Abfynthium	
Lana succida.	Plumbum elotū & cre-	
DESTILLATIO-	matum	
nes coercentia.	Sulphur	
Trinum	Diosc. lib. 6. cap. 61.	
Styrax	DRYINI morsus	
Naphtha	curatio.	
Et in verbo, Pituitæ de	Diosc. lib. 6. cap. 65.	
stillationis remedia.	DVRITIEM emol-	
DILACRYMA-	lientia.	
tionones emendantia.	Amaracinū vnguentū	
Picca	Bdellium	
Pinus.	Buphthalmos	
DISCVSSORIAE	Cyprinum	
medicinæ.		
Androsamon		

Cap



# INDEX

Capparis		Ferrum	Galla
Erysimon	Aegilops	Omphacium	
Ficus	Fimum	Hypocistis	
Glans	Galiopsis	Hedera	Hippuris
Hydropiper		Lentiscus	Lycium
Ammoniacum		Lotus	
Lens	Linum	Lixiua ex ficu	
Lapis alabastrites		Lac schiston	
Megaliu		Linum	Lapathum
Mclanthion		Lyfimachia	
Mandragoras		Myrrha	Macer
Porrum		Malum punicum	
Panaces heracleon		Melissophyllum	
Pentaphyllon		Naphtha	
Paronychia		Nymphæa	
Pyrites	Styrax	Nuclei acinorum	
Sanguis	Smyrnion	Oryza	Omphacium
Terra cimolia		Oxalme	Portulaca
Vinacei		Plantago	Phyllitis
DYSENTERICO-		Polemonium	
rum remedia		Pentaphyllon	
Adipum medicina		Papauer ceratite, siue	
Asparagus Argemone		corniculare	
Agaricum		Quercus	
Althæa	Alcea	Rubrica, siue terra lēnia	
Alisma		Silurus	Sanguis
Aizoon maius		Sium	Scordium
Butyrum	Cupressus	Synphyton	
Cotonea	Cornu	Stœba	
Ceruinum cornu		Sideritis achillea	
Coagulum	Cera	Salsugo	Tragion
Clematis daphnoides		Vitis satiuā, siue vini-	
Elatine		fera	Vinacci
Eupatorium		Vinum cydonite	
Fornogracum		Et in verbo, Intestino-	
Faba Aegyptia		rum remedia.	
		Ebriet	



# C V R A T I V V S.

<b>E</b> B R I E T A T I vti- lia.	Palimpissa
Amygdalus amara	Panaces heracleon
Brassica fatiua	Psyllion
Absynthium.	Plumbum clotum
<b>E</b> L E P H A N T I A E remedia.	Resina
Cedria	Styrax
Erinaceus terrestris	Viscum.
Serum	<b>E</b> N T E R O C E L A E remedia.
Sel animalium	Hippuris, siue equisetū.
Zythum	<b>E</b> P H E L I D I S vti- lia.
Calamintha.	Plantago
<b>E</b> L E P H A N T I A S gignentia.	Balanus myrsifolia
Vinum sicyte.	Cici.
<b>E</b> M O L L I E N T E S medicinæ.	<b>E</b> P I N Y C T I D I S morbi remedia.
Adipum medicinæ.	Olca syluestris
Bdellium	Myrtus
Cinnamomum	Amygdalæ amaræ
Gypros	Grossi
Cistos	Fimum
Cerussa	Brassica fatiua
Chalcantum	Plantago
Calx viua	Cucumis
Ocsypus	Porrum
Fœnogræcum	Absynthiū
Gleucinum	Coriandrū cum melle
Ammoniacum	passaque vua
Irinum	Viscum
Lana succida	Heliotropium maius
Linum	Vua passa.
Lapis Gagates	<b>E</b> P I P H O R A E re- media.
Metopium	Asarum
Myrrha Eæotica	Malobathrū
Medullæ animalium	Cotonca
Naphtha	Crimnon
	Coriandrum
	Lilium
	Ambrosia
	Vua passa
	Terra samia.
	<b>E</b> R V C I S pinorum conuenit
	S:



# INDEX

Vnguentum melium

Diosc. lib. 6. cap. 2.

ERYPTIONVM

remedia.

Serum

Lepinum satium

Beta Portulaca

Pentaphyllon

Balanus myrepica

Vinum myrsinite

Alumen.

EXCREATIONIS

crassa pectoris

remedia.

Pix liquida

Dracunculus minor

Tordylon.

EXCRESCEN-

tia deprimētia.

Alumen Cerussa

Ginis vitis

Diphryges

Brinaceus marinus

Lapis Asius

Ochra Pumex

Pyrites Scordion

Spuma argenti Sal.

EXTENVATO-

ria medi-

cinae.

Artemisia

Anthemis

Iris Illyrica

Hyssopus

Lapis hematites

Pulegium

Panaces heracleon.

EXTRACTORIAE

medicinae.

Galbanum

Viscum Thapsia

Scoria argenti.

FACIES ne à sole

aduratur.

Ouum.

FACIEI vitia aufe-

rentia.

Ampelos agria

Halcyoniuna

Adarces

Brassica sativa

Bulbus esculentus

Balanus myrepica

Cinnamomum

Cochlear terrestres

Cyclaminos

Eruum Ficus

Hedera Iris Illyrica

Lepus Lilium

Lotus sylvestris

Mastichinum

Mel sardoum

Oleum amygdalinum

Oleum raphaninum

Pepo Polygonaton

Spuma argenti

Sisymbrium aquaticum

Thapsia.

FACIEI rugas au-

ferentia.

Cacalia.

FASTIDIUM ge-

ner



# C V R A T I V V S.

nerantia.	Costus	Cucurbita
Vinum catorchite	Clymenon	
Diosc. 6. in præfat.	Fœniculus	Hypericon
<b>F A T I G A T I O-</b>	Hyoscyamus	
num remedia.	Heliotropium maius	
Adeps.	Lac humanum	
<b>FAVOS</b> rumpentia.	Lagopus	
Eruum	Myrrha	Ouum
Vua passa	Oleum sicyonium	
Peponis radix	Portulaca	Piper
Grosi.	Panaces heraclcon	
<b>FAVCIVM</b> morbi	Polygonon mas	
remedia.	Pentaphyllon	
Acetum	Peristerion supinus	
Acetum scillite	Rhaponticum	
Cacalia	Ruta	Smyrnion
Acthiopis	Sapapenon	
Ficus	Saxifraga	
Laserpitium	Trifolium	Vua
Mel	Vinum melitite	
Papauer satium	Vinum rhoite	
Syrax.	Vinum hyssopite.	
<b>FAVCES</b> asperas	<b>FEBRIS</b> quartana	
facientia.	remedia.	
Characias	Araneus	Buglosson
Cimolia terra.	Cimices lecti	Dipsacū
<b>FEBRIBVS</b> con-	Hypericon	
traria.	Heliotropion maius	
Mala punica.	Pentaphyllon	
<b>FEBRIFVGIA.</b>	Verbenaca supina	
Centaurium minus	Trifolium	Ruta.
Coniza.	<b>FELLE</b> suffusis vti-	
<b>FEBRIVM</b> remedia.	lia.	
Agaricum	Adiantum	
Aristolochia tertia	Vinum asarite.	
Anthemis	<b>FELLE I</b> humoris	
Anchusa		
Aphronitrum		
Balsamū		
Buglossum		



# INDEX

remedia.	rantia.
Abfynthium	Malus Zythum
Centaurium minus.	Phaseolus.
FERITATEM ani	FLUXIONVM
maliū mitigantia.	remedia.
Oenagra.	Fuligo butyri
FERRVMINAN-	Eryfimon
di vim habentia.	Lichen in petris
Spuma argenti	Ocymum Portulaca
Rubrica finopis	Pepo Squama aris
Spongia	Papauer fatium
Lapis morochthus.	Acantha Arabica
FILIVM masculū	Chium vinum
generantia.	Acetum Ebenus
Phyllon Orchis	Liciū Lixiua ex ficu
Crataegonos.	Vinum rhoite
FISTVLARVM	Vinum terebinthinum
remedia.	Vinum pissite
Adeps Arifaron	Vinum melampsythiū.
Cinnamomum	FOETVS necantia.
Characias	Vide, Partus necantia.
Chalcites lapis	FOEMINAS steri-
Dracunculus minor	lescentia.
Dipfacus	Lepus terrestris
Helleborum nigrum	Hedera.
Orchis Serapias	FORMICAE mor-
Omphacinum	bi remedia.
Papyrus Plantago	Cicer Characias
Pentaphyllon	Chamaſyce
Stratiotes terrestris.	Batrachion Dipfacū
FLATVS discutien-	Heliotropium malus
tia.	Lacerta Ruta
Cinnamomum	Thus Vitis fatiua.
Ocymum	FRACTVRAE re-
Vinum stichadite.	media.
FLATVM adgene-	Fuligo pictoria.
	FVNG



# C V R A T I V V S.

**FVNGORVM** ve-  
natorum re-  
media.

Verbenaca

Finum

Mel

Rhaphanus

Abfynthium

Meliffophyllon

Fungi

Vinum in comuni

Acetum

Chalcanthum

Sal

Pyrorum ligni cinis

Aphronitrum

Cinis vitium

Lapis Afius

Diofc. lib. 6. cap. 23.

**FVRVNCVLO-**  
rum remedia.

Ficus

Groffi

Triticum

Rhaphanus

Asphodelus

Galbanum

Pygnoكوم

Sal

Aphronitrum.

**FVRVRES** tollen-  
tia.

Allium

Adiantum

Alumen

Fœnogræcum

Fel animalium

Groffi

Linum

Lilium

Myrtus

Malua

Oleum oleaftri

Oleum anygdalinum

Oleum myrtinum

Oxalme

Olea

Salix

Vnguentum melinum

Vnguentum telinum

Vrina

Vinum myrsinite

Allium

Beta.

**G**ANGRAENAE  
morbi remedia.

Ampelos leuce

Brassica fatiua

Bulbus esculentus

Cinnamomum

Characias Galiopsis

Iuglans

Lixiua è ficu

Lilium

Lens

Lupinum fatium

Laserpitium

Rhus

Rhaphanus

Vrtica

Vua passa.

**GENITALIVM**  
morbi remedia.

Asparagus

Amurca

Aloe

Aster atticus

Cyprinū Cotyledon

Fœnogræcum

Flos falis

Linum

Malum punicum

Polygonon

Sampfuchinum

Vinum terebinthinū.

**GENITALIVM**

virus extin-

guentia.

S 3



# INDEX

Alumen.	Aristolochia tertia
GENARVM mor-	Aloc Acetum
bi remedia.	Acetum scillit
Aloc	Alumen Butyrum
Aerugo aurificum	Canchamum Cytinus
Aerugo ferri	Chalcitis lapis
Ammoniacum	Aerugo aurificum
Lapis schistos	Aerugo ferri
Mituli Naphtha	Galla Lycium
Olea sylvestris.	Lepus terrestris
GENITVRAE pro-	Lac schiston
fluuii in somno	Lapis alabastrites
remedia.	Myrrha Mastiche
Lactuca sylvestris	Oleum omphacinum
Nymphæa	Pruna Plantago
Hermol. Cor. cap. 932.	Pumex Rosa
GENERATIO-	Rubus Staphis agria
nem deprimentia.	Sal Tribulus
Clymenon	Vua œnanthe
Heliotropium malus	Vinum rhetinite.
Mentha Thelypteris	GLABROS aut depi-
Xyphion Asplenon.	les facientia.
GENITVRAM ex-	Scolopendra
tinguentia.	Characias.
Cannabis sativæ semen	GLADIORVM aciē
Anethum.	perstringentia.
GENITVRAM	Malum sylvestre.
augentia.	GLANDIS membri
Semen coriandri.	remedia.
Coriandrum.	Mel.
GENITALIVM	GRAVEDINIS
torporem in-	remedia.
ducentia.	Styrax.
Cleuta.	GVRGVLIONI
GINGIVARVM	vtilia.
morbi remedia.	Silurus.

GVT



# CURATIVVS.

GUTTVRIS re-  
media.

Edellium  
Ficus After Atticus  
Vinum halofanthinum  
GYPSI curatio.  
Lixiua ex ficu  
Diosc. lib. 6. cap. 24.

**H**AE MORRHOI-  
darū remedia.

Amaracinum  
Allium Anonis  
Aloe Cape  
Irinum Libanotis  
Lapis Arabicus  
Ouum Palma  
Plumbum clotum  
Rhus Rubus.

HAEMORRHOI-  
darum curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 69.  
HALITVS oris re-  
media.

Agallochum  
Anisum Bromos  
Citrum Malobathrū  
Myrrha Mastiche  
Vinum selenite.

HASTVLA S' infi-  
xas corpori ex-  
trahentia.

Oxyacantha.  
HEPATICORVM  
remedia.

Vide, Iecinoris morbo-  
rum remedia.

HERBAE quæ peri-  
munt.

Diosc. lib. 6. in præfat.  
HERNIAE medicinae  
Cinnamomum  
Cupressus Cytinus  
Pentaphyllon  
Psyllium Xyphion.  
HERPETIS con-  
traria.

Strychnon satium  
Acetum.

HIRVDINVM  
visus restauratia.  
Chelidonium maius.

HIRVDINES  
pellentia.  
Acetum.

HIRVDINIS  
curatio.  
Diosc. lib. 6. cap. 32.

HOMINEM ne-  
cantia.

Juniperi ramenta  
Smilax seu taxus.

HOMINIS morsus  
remedia.

Iuglans.  
HORRORES excu-  
tientia.

Vide, Rigorem excu-  
tientia.

HVLGERANTES  
medicinae.

Buprestis Salamandra  
Batrachion Ruta



# INDEX

Lonchitis	Hedyfaron	Gentiana	
Clematis		Iris Illyrica	Isatis
Portulaca agrestis		Indicus lapis	
Ampeloleuce.		Lixiua cū cinere ficus	
HVLCERV M re-		Lentiscus	Lycium
media.		Lana combusta	
Amygdala amara		Lolium	Lens
Anemone	Amylum	Lupinus	Libanotis
Anagallis	Aristolochia	LasERPitium	
Aloe	Anthemis	Lilium	Myrtus
Althæa	Anchusa	Mel	Mandragoras
Astragalus	Aconiton	Nasturtium	
Arction	Acetum	Narcissus	
Arsenicum	Alumen	Olea sylvestris	
Brassica sativa	Beta	Oleum amygdalinum	
Bulbus esculentus		Orobus	Orchis
Ballote		Oenagra	Omphacium
Caries lignorum		Plantago	Pix
Cistos	Chelidonium	Palma	
Centaurium		Purpura combusta	
Chamaeleon niger		Pepo	Panaces
Coriandrum		Peucedanum	Prasion
Chamaedrys		Pentaphyllon	
Chamaepitys		Peristercon supinus	
Chamaelea		Papauer ceratitis , id	
Cadmia	Cinis vitis	est corniculare	
Corallium		Psyllium	
Dracunculus		Plumbum clotum	
Elelisphacon		Pumex	
Eupatorium		Rhamnus	Ruta
Ebulus	Acs vstum	Stratiotes terrestris	
Ficus	Fimum	Scordion	
Acrugo aurificum		Sandaracha	Sal
Fel	Glans	Spongia	Thus
Grossi	Hedera	Viscum	Thelypteris
Goed, id est, coriandrū		Testæ fornacum	
			Vrt



# CVRATIVVS.

Vrtica.	Ruta	Scilla
HVMORVM malo- rum medicina.	Sampſuchus	
Metopiũ vnguentum	Staphylinus	
Nardinum	Smyrnion	
Amygdalæ dulces	Strychnon hypnoticũ, ſiue ſolanum ſomni- ficum	ſal
Mel	Trifoliũ	Tithymalus
HYDROPICO- rum remedia.	Vitex	Vrina
Aſarum	Anurca	Vinum ſcillite
Halicacabus	Allium	Vinum rhetinite
Absynthium	Aniſum	Vinum cedrite
Androſaces	Alisma	Vinum aſarite
Ampelos agria		Vinum panacite.
Aqua maris		HYOſCYAMI cu- ratio.
Acetum	Aphronitrũ	Dioſc. lib. 6. cap. 15.
Nalcyonium		TECINORIS reme- dia.
Bupreſtis	Cyperus	Acorus
Cinnamomum		Nardi ſpica
Calamus odoratus		Nardum Gallicum
Cochleæ terreſtres		Amomum
Cicer		Iuncus odoratus
Chamæleon albus		Agallochum
Chamædryſ		Picea
Ceſtron	Cotyledon	Pinus
Cucumis anguinus		Daphnoides
Cici		Palma elate
Helleborum nigrum		Amygdalæ amaræ
Ebulus	Ficus	Lac humanum
Erinaceus terreſtris		Scandyx
Hippophaes		Struthium
Hippophæſton		Anagallis
Hyſſopus	Laſerpitiũ	Agaricum
Lathyris	Origanum	Rhaponticum
Plantago	Pancratiũ	Gentiana
Polium	Rhaphanus	Glycyrrhiza
		Eryngium
		Absynthium



# INDEX

Serpyllum	Sphōdyliū	Lilium	Lens palustris
Ammoniacum		Lapis smyris	
Anthemis		Myrtus	Malua
Chamapitys		Mandragoras	
Vettonica	Eupatoriū	Portulaca	Plantago
Hyoscyamus		Parthenion	
Pentaphyllon		Polygonon mas	
Chrysocome		Pentaphyllon	
Papauer ceratitis, siue		Peristereon rectus	
cornutum		Papauer satium	
Epipactis	Isopyron	Psyllium	Rhamnus
Vinum cydonite		Rosa	Ruta
Vinum pifsite		Rubus	Idæa
Vinum absynthite		Salix	Sanguis
Vinum nardite		Seris	
Vinum asarite		Strychnon, siue solanū	
Vinum ex syluestri asa		satium.	
ro		Stratiotes aquaticus	
Vinum chamælates		Vrina.	
Rubrica sinopis.		ILEI morbi remedia.	
IGNIS sacri re-		Oleum vulgare	
media.		Strychnos halleacabus.	
Asarum	Acacia	IMPETIGINIS	
Acinos herba		morbi remedia.	
Anchusa	Lycopsis	Amygdalæ amaræ	
Aizoon maius		Lapathon	
Erafsica satiuā		Lichen in petris	
Acetum	Feta	Lolium	Thus
Baccharis	Bechion	Myrrha	Nasturtium
Crocus	Cupressus	Snapi	Propolis.
Coriandrum	Cicuta	INCYSSIS vtilia.	
Cotyledon	Cici	phlomides.	
Chalcitis laps		INFANTES mor-	
Aerugo ferri		tuos vtero cii-	
Harundo	Helxine	cientia.	
Isatis	Lens	Dictamnus.	

INF



# CVRATIVVS.

## INFANTIBVS

vtilia.

Athara Aſter Atticus

Strychnum fatium

Smilax aſpera.

## INFANTIVM pu-

pillæ vt glauca,

non nigræ red-

dantur.

Auellana.

## INFLATIONES

facientia.

Allium

Capparis

Glans

Laſerpitium

Porru

Bulbus eſculentus.

## INFLATIONVM

remedia.

Aſpalathus

Amygdalæ amaræ

Absynthium

Aniſum

Anethum

Anthemis

Althæa

Coſtus

Cicer

Cyminum

Eryngion

Epithymum

Heleniũ

Hyſſopum

Hieracium maius

Iuncus odoratus

Iuniperus

Lac

Liguttiſicum

Hordeũ

Ocymum

Peucedanum

Rapa ſylueſtris

Rhaponticum

Triticum

Thymoxalme

Vrtica

Vinaceſ

Vinum

Vinum piſſite

Vinum abſynthite

Vinum ſcilliticum

Vinum chamædryite

Vinum tragoriganite

Vinũ ſylueſtris nardi.

## IEFLAMMATIO

num remedia.

Coriandrum

Adeps

Aſphodelus

Argemone

Anagallis

Artemiſia

Aizoon maius

Acetum

Butyrum

Brasica ſylueſtris

Bechion

Brion thalaſſion

Casſia

Cotyledon prima

Elatine

Ebulus

Faba

Ficus

Harundo

Hyoſcyamus

Irinum

Laurus

Linum

Lupinum fatium

Lonchitis

Lichen in petris

Lens paluſtris

Lapis

Melilotus Mædragoras

Naphtha

Ocymum

Ochra

Picea

Plaſ



# INDEX

Platanus	Portulaca	Irinum	Lac
Pulegiū	Parthenion	Linum	Mastichinum
Polygonon mas		Malua	Hordeum
Papauer erraticum		Palma	Portulaca
Rosa	Rhus	Rosaceum	Rosa
Susinum	Sabina	Ruta	Salix
Sesamum		Spartum	
Sonchos	Scordion	Vinum Surrentinum	
Symphytum		Triticum	
Stratiotes aquaticus		Et in verbo, Dysentericorum remedia.	
Triticum	Tribulus	INTERTRIGO vt tollatur.	
Vinacel	Xyris.	Vitex	Corium.
INGVINVM morbi remedia.		ISCHIADICORUM remedia.	
Vide Genitalium.		Asarum	Balsamum
INGENIVM promptum facientia.		Cardamomum	
Ouum.		Silurus	Finum
INSANIAM inducentia.		Nasturtium	Thlaspi
Hyoscyamus		Rhaponticum	
Strychnon hypnoticon		Thymus	
Mandragoras.		Ammonia cum	
INSANIENTIVM remedia.		Leontopetalon	
Betonica		Erythrodanum	
Helleborum nigrum.		Ascyron	
INSOMNIA inducentia.		Androsamum	
Vide, Somniferæ medicinæ.		Chamæpitys	
INTESTINORVM remedia.		Polemonia	
Agallochū	Anthemis	Ocymoides	
Cochleæ terrestres		Aethiopis	
Hippuris		Arction	
		Chamæcissos	
		Spartum	
		Colocynthis	
		Oxymeli	
			Vinum



# CVRATIVVS.

Vinum panacite  
salugo Adarces.

Dioscorides libro 6. in  
præfat.

IVMENTIS con-  
traria.

LACRYMA-  
tiones emen-  
dantia.

Gramen cilicum  
Nerion.

Vide, dilacrymationes  
emendantia.

IVMENTORVM  
scabiem emen-  
dantia.

LACTIS vberta-  
tem facientia.

Amurca Alysson

Argemone Anethum

Lupinum satium

Ampeloleuce

Oleum piscinum

Cicer Circea

Oleum lentiscinum.

Echion Fœniculus

IVMENTORVM

Halimos Hordeum

vlcera emen-  
dantia.

Lactuce Malua

Oleum picinum

Melanthion

Alysson

Ocymum

Thelypteris.

Sonchos Vitex.

LABIORVM scissu-  
ra remedia.

LACTIS coagu-  
lati curatio.

Adeps Lycium.

Diosc. lib. 6. cap. 26.

LAC coagulantia.

LASSITVDINVM  
remedia.

Balsamum Ficus.

Anethinum

LAC extinguentia.

Adeps Clymenon

Cicuta.

Laurinum

LACRYMAS  
trahentia.

Ammoniacum sal

Acrugo aurificum.

Lapis gagates

LACERTAE mor-  
sus remedia.

Vinum chamælates.

Portulaca

LATERVM morbi  
remedia.

Seps, siue lacerta calchi  
dica in vino epota.

Acorus Agallochum

LACRYMAE quæ  
perimunt.

Asphodelus

Aristolochia tertia

Ampeloleuce

Balsamum

Brass



# INDEX

Brassica fatiua	Eruum	Galbanum
Bdellium	Melâthion	Rhaphanus
Cyprinum	Finum	Sanguis leporinus
Centaurium maius		Sisymbrium syluestre
Gentiana	Galbanum	Spuma argenti
Hordeum		Triticum cum aceto.
Leucacantha	Myrrha	LEPRAE remedia.
Naphtha	Phu	Allium
Panaces heraclion		Ancimone
Petroselinon		Aristolochia
Prasium, siue marrubiū		Acantha
Pseudobunion		Anchusa
Ruta	Sagapenum	Acetum
Terebinthina		Ampelos leuce
Thapsia	Vrtica	Halcyonium
Vinum cedrite		Alumen
Vinum hyssopite		Adarce
Vinum stichadite		Buprestis
Vinum tragoriganite		Brassica fatiua
Vinum aromatite		Cochleæ terrestres
Vinum acorite		Clematis
Vinum glycyrrhite.		Fraxinus
LENDES necantia.		Cucumis anguinus
Cedria	Mel	Helleborum nigrum
Myrica	Beta	Acrugo aurificum
Allium		Ficus
Alumen		Fel
LENTIGINIS maculae remedia.		Hordeum
Alysson	Halcyonium	Iuniperus
Aqua maris		Lolium
Ampeloleuce		Lapathum
Brassica fatiua		Lepidium
Bulbus esculentus		Myosotis
Balanus myrepica		Oleum oleastri
Cinnamomum		Oleum cicinum
		Olea Aethiopica
		Oryza
		Salamandra
		Serum
		Sinapi
		Struthion
		Scammonia
		Sulphur
		Terebinthina
		Thapsia
		Terra melia



# CURATIVVS.

Vlmus	Yrina	Piper	Struthion
Vitis fatiua.		Hedera	Cyclaminos
LEPORIS ma-		Pancration	
rini remedia.		Capparis	Lepidium
Fiber	Cornus	Agaricum	
Lapis ophites		Rhaponticum	
Halcyonium		Aristolochia tertia	
Chamaeleon niger		Crocodilion	
Cicer		Absynthium	
Cucumis anguinus		Hyssopum	
Characias		Tragoriganum	
Helleborum nigrum		Pulegium	
Ficus	Glutinum	Dictamnus	
Laserpitium	Olca	Sison	Anison
Pruna		Smyrnion	
Rhaponticum		Peucedanum	
Ruta	Sal	Sagapenum	
Vitis fatiua		Ammoniacum	
Vinum cethalassome-		Viscum	Polium
num.		Chamaedrys	Leucoion
LIENIS morbi		Nymphæa	Asplenon
remedia.		Hemionitis	
Iris Illyrica		Erythrodanum	
Nardum Gallicum		Vettonica	
Myrice	Acorus	Lonchitis altera	
Canchamum		Polemonia	
Oleum amygdalinum		Clymenon	Xyris
Lycium	Vitex	Anchusa	Vrtica
Cotonca	Linum	Adiantum	Pteris
Ficus Aegyptia		Ampelos leuce & agria	
Lac humanum		Aqua maris	
Lupinum sativum		Vitis fatiua	
Rhaphanus		Acetum scilliticum	
Lapathum	Sinapi	Vinum panacite	
Brassica sativa		Ferrum	Corallium
Nasturtium		Lapis Asius	Coris
			Hcr



# INDEX

Hernol. Cor. cap. 124.  
 LINGVAE vtilia.  
 Olea Aethiopica.  
 LIPPITVDI-  
 nis remedia.  
 Ebenus  
 Lapis hamatites  
 Plantago Spongiae.  
 LIQVORES qui  
 perimunt.  
 Dioscorides libro 6. in  
 praefat.  
 LIVOREM emen-  
 dantia.  
 Allium Aqua maris  
 Iuglans  
 Lana succida  
 Rhaponticum  
 Sinapi  
 Lupinum satium  
 Thapsia.  
 LOCORVM mulie-  
 brium remedia.  
 Anethum Althæa  
 Fœnogræcum  
 Linum Leucoion  
 Trifolium  
 LVMBRICOS  
 necantia.  
 Coriandri semen  
 Absynthium scriphium  
 Brassica sativa  
 Chamæleon albus  
 Calamintha  
 Myrrha Portulaca  
 Oleum cicinum  
 Thelypteris  
 Lupinum satium.  
 LVMBORVM affe-  
 ctuum remedia.  
 Asparagus Capparis  
 Chamæpeuce  
 Echion Harundo  
 Leucacantha  
 Papaver cornutum  
 Sampsuchinum  
 Smyrnion.  
 LVPOS necantia.  
 Aconitum pardalian-  
 ches  
 Aconitum alterum  
 Apocynum.  
 LVSCIOSORVM  
 remedia.  
 Fel animalium.  
 Sanguis.  
 LVXATIS vtilia.  
 Asparagus Acantha  
 Aphronitrum  
 Bulbus esculentus  
 Fimum  
 Harundo  
 Heliotropion.  
 Iuglans Lilium  
 Narcissus  
 Polypodium  
 Vitex  
 Vrtica  
 Vitis sativa  
 Vinum pissite  
 Sampsuchus  
 Sal.

MAC



# C V R A T I V V S.

**M**ACIEI corporis remedia. Apium Asclepias

Erinaceus. Hemerocallis

**M**ACVLAS tol- Althæa

lentia. Chamæpitys

Oleum balaninum. Epimedium Cici

**M**ACVLAS rube- Hyoscyamus

scere facientia. Vinacci

Crocodilea, id est, Cro- Aqua maris

codili terrestris simū. Fax vini

**M**ALIS medicamen- Terra samia.

tis contraria. **M**AMMAE virginum

Adeps Ruta Cicuta Cotis.

Pentaphyllon **M**ASCVLVM

Antirrhinon. filium gene-

**M**ALORVM quæ rantia.

Acacia Plantago Crataegonos

Polygonon mas Phyllon Orchis.

Helxine Cicuta **M**ATRICIS mor-

trychnum satium bi remedia.

Aizoon maius Malua

Polymbades oliuæ Oleum balaninum

abina. Præonia.

**M**AMMARVM **M**AXILLARVM

morbi remedia. doloris remedia.

Farum Ceruinum cornu.

Uglans **M**EATVS ape-

Trysimon Thus rientia.

Ens Ochra Allium Cyperus.

Sphodelus Eruum **M**ECONIO

Sentha contraria.

Cammonia Passum & protropon vi-

andaracha num

Riticum Acetum Oxymel.

Accharis **M**ELICERIDVM

morbi remedia.

**T**



# INDEX

Serum		Chondrylla	
Parthenion		Lactuca sylvestris	
Helleborum nigrum		Caucalis	Eruca
Epithymum		Ocymum	Cepe
Acetum scilliticum		Orobanche	Allium
Amonum		Porrum	
Melilotus.		Ampeloprasum	
MENSTRA		Nasturtium	
prouocantia.		Thlaspi	
Iris Illyrica		Struthion	
Meu	Cyperus	Cyclamino	
Asarum	Casia	Asphodelus	
Cinnamomum		Capparis	
Costum		Anemone	
Iuncus odoratus		Hedera	
Balsamum		Agaricum	
Canchamon		Aristolochia tertia	
Helenium	Myrrha	Centaureum maius &	
Sampfuchinum		minus	
Amaracinum		Eryngion	
Abrotonum		Absinthium	
Styrax	Naphtha	Origanum	
Cedrides	Myrice	Tragoriganum	
Tilia	Hypocistos	Pulegium	
Lycium	Acacia	Elelisphacos	
Vitex		Calamintha	
Olea sylvestris		Thymus	
Lotus		Serpyllum	
Amygdala amara		Sampfuchus	
Ficus		Eaccharis	Ruta
Cochlea terrestres		Panaces heracleon	
Fiber	Buprestis	Ligusticum	
Oesypus	Fimum	Seseli Malsiliense	
Cicer	Rhaphanus	Tordylon	
Lapathum		Sison	Anisum
Brassica sativa		Forniculus	



# CVRATIVVS.

Orcoselinum		Heliotropion malus
Petroselinum		Vinum scilliticum
Hippomarathrum		Vinum absynthice
Hipposelinum		Vinum hyssopite
Smyrnion		Vinum aromatice
Daucus	Libanotis	Vinum daucite
Melanthion		Vinum panacite
Laserpitium		Vinum helleborite
Sagapnon		Vinum di&amnite
Euphorbion		Staphylinus.
Clynopodium		MENSTRVA
Chamædrys	Lilium	gistentia.
Melissophyllum		Lentisci succus
Prasium	Stachys	Myrica
Trifolium		Oxyacanthos
Polium	Seordion	Thuis
Artemisia		Palma
Leucoion		Malum punicum
Anthemis	Præonia	Myrtus
Erythrodanum		Lepus terrestris
Anagyris		Fuligo butyri
Alifina	Coris	Coagulum
Hypericon		Sanguis
Cestron	Medion	Acinos
Xyphion	Tragion	Acantha Arabica
Heliochrysos		Hieracium maius
Mandragoras		Nymphæa
Vrtica	Myrtus	Præonia
Adiantum		Limonion
Myrtus fylvestris		Medion
Laurus Alexandrina		Sideritis achilleos
Daphnoides		Rubus
Chamædaphne		Idæa radix
Helleborus niger & al-		Tragos
bus		Lyfimachia
Ampelos melana.		Oxyſchænos
		Heliochrysos
		Papauer ſatium
		Mandragora
		Aizon maius

T



# INDEX

Aerugo ferri  
Vinum rhenitice  
Fax vini  
Lapis Aſius  
Morochthus  
Hamatites  
Oſtracites  
Terra ſamia.

MENTEM com-  
mouentia.  
Coriandrum  
Orcoselinum

METALLA quæ  
perimunt.  
Dioſc. lib. 6. in præfat.  
MOLLIENTES  
medicinæ.

Vide, Demollientes.  
MORBI regii  
medicinæ.

Vide, Regii morbi.  
MORBORVM quæ  
ſerpunt remedia.  
Vide, Malorum quæ  
ſerpunt.

MVLIERVVM deſi-  
derio quo ſatiſſiat.  
Acorum  
Picca Pinus  
Adeps bubulus.

MVLIERVVM  
infirmorum  
remedia.

Amomum  
Balaſamum  
Suſinum

Sefeli Maſſilienſe.  
MVRES necantia.  
Chamaeleon albus  
Aconitū pardalianches  
Helleborus candidus  
Hermol. Cor. cap. 23.  
MVRS aranei mor-  
ſus remedia.

Mus araneus  
Abſynthium  
Chryſogonon  
Dioſc. lib. 6. cap. 62.  
MVRS morſus  
remedia.

Groſſi Allium.  
MVSCAS necantia.  
Lyſimachia.  
MYRMECIAS  
tollentia.

Ficus.  
NARIVM morbi  
remedia.  
Malum punicum.  
NAVSEAM diſcu-  
tientia.

Tragoriganum  
Pulegium  
Fœniculus.  
NAVSEAM mo-  
mentia.

Laurinum  
Suſinum.  
NERVORVM mor-  
bi remedia.  
Oleum ſicyonium  
Oleum clæomeli

Laur



# CVRATIVVS.

Laurinum		NODIS vtilia.
Cyprinum		Bdellium.
Gleucinum		NOMARVM mor-
Amaracinum		bos curantia.
Metopium	Bdellium	Asparagus
Lixiua ex ficu		Sabina Papyrus
Erinaceus terrestris		Cistos
Gochlea terrestres		Olca syluestris Olca
Vipera		Oliuæ colymbades
Vermes terreni		Malum punicum
Lac humanum		Smarides
Triticum	Poterium	Fel animalium
Peucedanum		Vrina Lilium
Laserpitium		Plantago Arisaron
Lilium	Satyrium	Asphodelus
Melissophyllon		Maron Prasium
Althæa	Coccus	Orchis serapias
Erigeron	Cacalia	Britannica
Narcissus		Peristereon supinus
Hippophaëston		Galiopsis
Vini qualitas		Vua ænanthe
Aqua maris		Omphacinum
Acetum scilliticum		Acetum Oxalme
Vinum stichadite		Squama æris
Vinum thymite		Acrugo aurificum
Pax vini	Fiber.	Chalcites lapis
NERVOS laudentia.		Flos salis
Malus	Hedera	Lapis ostracites.
Vinum		NVBECVLAS
Vinum gypsatum		oculorum emen-
Mesagite.		dantia.
NERVOS tollentia.		Vide, Oculorum reme-
Mel fardoum.		dia.
NIGREDINES		NYCTILOPARVM
abstergit		morbi remedia.
Sabina.		Vide, Luscioforum re-



# INDEX

medla.		Oleum vulgare	
<b>O</b> B M V T E S C E R E		Elæomeli	
facientia.		Oleum amygdalinum	
Mandragora.		Myrrha	Thus
<b>O</b> C V L O R V M epi-		Fuligo thuris & resinæ	
phoræ remedia.		& picis	
Asarum		Picea	Cupressus
Malabathrum		Sabina	Platanus
Cotonea	Sesamum	Populus alba	
Lens	Cucurbita	Myrice	Acalis
Anemone		Ebcnus	Rosa
Argemone		Lycium	Acacia
Myosotis		Salix	
Gentiana		Olea sylvestris	
Baccharis	Ruta	Olea	
Apium	Hemerocallis	Olea Aethiopica	
Rubus idæa		Palma Thebaica	
Papauer sativum		Cytinus	Myrtus
Phlomis		Cerasia	
Aster atticus		Halicacabus	Mituli
Viola purpurea		Cochleæ terrestres	
Cici.		Scorpius marinus	
<b>O</b> C V L I S contraria.		Vipera	
Lactuca		Senecta serpentis	
Porrum	Ocymum	Sepia	
Coriandrum		Mullus piscis	
Anethum.		Ouum	Hirundines
<b>O</b> C V L O R V M mor-		Ceruinum cornu	
borum remedia.		Lac humanum	
Acorum	Cassia	Costus	
Cinnamomum		Fuligo butyri	
Amomum		Lana vsta	Ocsypus
Balsamum		Fel animalium	
Canchamum		Sanguis	
Crocum		Vrina	Mel
Crocomagma		Amylum	
			Faba



# CVRATIVVS.

Raba	Lens	nutum
Brassica sativa		Hyoscyamus
Portulaca		Mandragoras
Seris	Pepo	Aconitum pardalian-
Lactuca sylvestris		ches
Ocymum	Cape	Aizoon maius
Sinapi	Piper	Helleborus albus
Zingiber		Cici Chamæsyce
Cyclaminos		Capnos
Asphodelus		Lotus sativa
Dracunculus maior		Sesamoides maius
Dracunculus minor		Aes vstum
Argemone		Vua œnanthe
Anagallis		Vinum Surrentinum
Chelidonium maius		Acetum scilliticum
Othonna		Cadmia
Centaurium minus		Squama æris
Tragacantha	Aloë	Acrugo aurificum
Abfynthium		Plumbum elotum
Abrotonum		Stimmi Cinnabaris
Ruta	Sampfuchus	Chalcitis lapis
Melilotus		Alumen Pumex
Ruta Galatica, siue syl-		Sal Flos salis
vestris		Fæx vini Spongia
Panaces heracleon		Corallium
Fœniculus		Pyrites
Libanotis		Hæmatites
Sagapenon		Galactites Thyites
Ammoniacum		Morochthus
Sarcocolla		Sapphirus
Chamadrys		Geodes
Prasium	Stœbe	Samius.
Tribulus	Erinos	OPISTHOTONI
Gramen Parnasium		corum, id est, cerui-
Rubus	Elatine	cis rigore laboran-
Papaver sativum, & cor		tium remedia.



# INDEX

Acanthion		id est, difficulter spi-
Eryngion		rantibus remedia.
Laserpitium		Helenium
Sagapenon		Myrrha
Satyriion	Coris.	Cupressus
O P I I remedia.		Daphnides
sal		Cotonca
Diosc. lib. 6. cap. 17.		Struthion
O R I S halitus re-		Cyclaminos
media.		Dracunculus maior
Vide, Halitus oris re-		Abrotonum
media.		Hyssopus
O R I S vlcerum re-		Calamintha
media.		Thymus
Cyperus	Aspalathus	Baccharis
Fuligo picis	Cyprus	Seleli Malsiliense
Tilia	Acacia	Hieracium maius
Olea syluestris		Smyrnion
Castanea		Sphondylium
Malum punicum		Peucedanum
Mæna		Melanthion
Lac schiston	Butyrū	Ammoniacum
Plantago	Aloë	Melissophyllon
Origanum		Bechion
Leucoion		Botrys
Orchis serapias		Anemone
Anthemis		Hippuris
Periclymenon		Vrtica
Rubus		Elaterium
Staphis agria		Hippophæstion
Vua ænanthe		Vinum panacite.
Omphacium		O S S I V M squamas
Acetum scilliticum		extrahentia.
Sandaracha		Aristolochia
Alumen	sal.	Ampelos leuce.
O R T H O P N O I C I S		O S S A fracta conso-
		lidan



# CVRATIVVS.

lidantia.		Helxine
Vetonica	Xyris.	Ocymastrum
OVES necantia.		Ammoniacum
Nerion,		Isatis
OXYPARA ingre-		Plantago
dientia.		Xyphion.
Ligusticum		PANTHERAS ne-
Caros	Anethum.	cantia.
PALPEBRA-		Aconitum pardalian-
rum remedia.		ches.
Vnguentum rosaceum		PAPAVERIS cu-
Mastiche	Resina	ratio.
Fuligo picis		Dioscor.lib.6. cap. 17.
Grossi		& 13.
Lixiua ex ficu		PAPVLARVM
Vrina	Alumen	remedia.
Chondrylla		Vrina
Vide supra, Genarum		Flos aris.
morbi remedia.		PARALYTICO-
PALPEBRARVM		rum remedia.
pili euulsi ne rena-		Capparis
scantur.		Erythrodanum
Tellinae		Colocynthis
Sanguis	Capnos.	Ampelos melana
PALLIDVM colo-		Vinum scilliticum
rem facientia.		Aphronitrum.
Hieracium minus		PARTVS necantia.
Aloc.		Daphnides
PANORVM remedia		Coagulum
Atriplex	Acetum	Adeps hircinus & ouil-
Bulbus esculentus		lus & bubulus
Coriandrum cum faba		Nasturtium
fracta		Thlaspi
Coniza	Ficus	Ruta
Galiopsis		Hedysaron
Olca syluestris		Helleborus albus &
		niger
		Colocynthis
		Ampelos leuce



# INDEX

Vinum phthorium.

PARTVS quibus  
iuvatur.

Iris Illyrica

Cinnamomum

Balsamum

Vnguentum tclinum

Irinum

Amaracinum

Myrrha

Picea

Olca Aethiopica

Ocsypum

Fimum

Cicer

Lupinum satium

Allium

Cyclaminos

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Hedera

Gentiana

Centaurium maius

Centaurium minus

Pulegium

Elelisphacos

Calamintha

Baccharis

Panaces heracleon

Staphylinus

Thynni falsi caro

Seseli Mafsiliense

Smyrnion

Peucedanum

Sagapenum

Galbanum

Fiber

Clinopodium

Ammoniacum

Chamaedrys

Prasium

Bechion

Artemisia

Coniza

Leucoion

Onosma

Anthemis

Anchusa

Mandragoras

Laurus Alexandrina

Ampelos leuce

Heliotropium maius

Vinum panacite

Vinum helleborite

Alumen

Sulphur

Lapis la sps

Aetites

Samius.

PARONYCHIA.

rum, id est, vnguium

morborem remedia.

Thus cum melle

Olca sylvestris

Myrtus

Ebur

Paronychia

Vua cenanthe

Aerugo ferri

PAROTIDVM, id

est, aurium apostema

tum remedia.

Ficus

Fim



# C V R A T I V V S.

Linum		Terebinthina
Linum	Faba	Iuniperus
Capathum		Ficus
Plantago		Pomum
Erysimon		Nasturtium
Viscum	Althæa	Piper
Syllium		Chelidonium minus
Trychnon satium		Rhaponticum
Vrtica		Stichas
Galioipsis		Thymus
Terra cimolia.		Ruta
It in verbo, Aurium		Libanotis
medicina.		Sagapenum
PA V E S C E N-		Ammoniacum
tium remedia.		Scordion
Linum		Bechion
Melicratum		Vrtica
Hydromel.		Isopyrum
PECORIS scabiem		Vinum cedrite
emendantia.		Vinum aromatite
vide, Iumentorum sca-		Vinum nectarite
biem.		Vinum daucite.
PECORI utilia.		PEDICVLOS ne-
diantum.		cantia.
PECVS necantia.		Allium
Merion		Alumen
Conitum lycoctonon.		Mel
PECVS mortuum		Cedria.
extrahentia.		PEDVM qui à frigo-
Ristolochia.		re alserunt remedia.
PECTORIS morbi		Cyclaminos.
remedia.		PEDVM rimarum
corus	Meu	remedia.
ostum	Myrrha	Scilla
uncus odoratus		PERFRICTIO-
iridydes		nis medicina.
		Iris



# INDEX

Iris Illyrica	Asphodelus
Cyperus	Scilla
Balsamum	Batrachion
Oleum	Arction
Ficus Aegyptia	Cotyledon prima
Vinum stichadite.	Aqua maris
PERCVSSISA fe-	Alumen.
ris vtilia.	PERIPNEVMO-
Balsamum	niacorum remedia.
Paliurus	Abrotonum
Mustela	Tragoriganum.
Ouum	PESTILENTIAE
Argemone	contraria.
Hippomarathrum	Myrrhis, id est celiso-
Coagulum	lium.
Sanguis	Vinum omphacite.
Piper	PHALANGIO-
Elaphoboscon	rūictus remedia.
Phyllitis.	Cinnamomum
PERNIONVM re-	Terebinthus
media.	Myrica
Vnguentum melinum	Myrtus
& telinum	Lixiua ex ficu
Thus cum suillo adipe	Canceri
Acacia	Malua
Ficus	Asparagus
Canceri	Lactuca syluestris
Pulmo marinus	Hedera
Vngues asini	Abrotonum
Adeps	Daucus
Eruum	Sphondylium
Rapa sativa	Aparine
Beta	Phalangium
Cyclaminos	Myrrhis
Dracunculus maior	Aqua maris
Dracunculus minor	Diosc. lib. 8. cap. 8.

Phag



# CVRATIVVS.

HAGEDAENAE

morbi remedia.

el Fimum

racunculus minor

atis

namaleon niger

inaces

aphylinus

tafitis

maracias

mpelos leuce

num

etum

umen

Flos salis.

HARICO veneno

contraria.

num Albanum

osc. lib. 6. cap. 19.

PHLEGMATIS

contraria.

antago.

HRENETICO-

rum remedia.

ocinum

rex

baragus

pyllum

niza tertia

ucoion.

PHTHIRIASIS, si

ue pedicularis mor

bi remedia.

gmenta gymnasto-

rum

rica

Hedera

Staphis agria

Sandaracha.

PHTHISICORVM

remedia.

Pix

Adeps

Porrum

Agaricum

Rhaponticum

Acantha

Prasium

Cestrum

Lapis Asius.

PILI genarum ne

defluant.

Spica nardi

Cochleæ terrestres

Oesypus

Chondrylla

Armenius lapis.

PILI palpebrarum

euulsi ne rena-

scantur.

Tellinae

Sanguis

Capnos.

PILI alarum euulsi

ne renascentur

Fabæ.

PITVITAE crassæ

remedia.

Iris Illyrica

Sesamum

Hyssopus

Thymoxalme.



# INDEX

PITVITAE reme-  
dia.

Cinnamomum

Styrax

Vlmus

Auellana

Ouum

Serum

Vrina

Hordeum

Linum

Faba

Lupinum satium

Agriorhaphanus

Portulaca

Cucurbita

Cæpa

Sinapi

Piper

Cyclaminos

Dracunculus maior

Capparis

Anemone

Anagallis

Centaurium minus

Tragacantha

Hyssopus

Origanus

Tragoriganum

Pulegium

Thymus

Ruta

Pyrethrum

Sphondylium

Melanthium

Parthenion

Naphtha

Clematis

Sideritis achilleos

Hyoscyamus

Helleborum nigrum

Sesamoides maius

Cucumis

Elaterium

Staphis agria

Thapsia

Hippophaës

Hippophaëston

Cici

Characia

Lathyris

Scammonia

Thymelæa

Ebulus

Apios

Colocynthis

Epithymon

Empetron

Ampelos leuce

Polypodion

Heliotropium maius

Vua passa

Aqua maris

Vinum rhetinite

Vinum aromatite

Vinum mandragorite

Vinum scammonite

Sulphur Peplus

PITYOCAMPA-

rum citatio

Diosc. lib. 6. cap. 2.

PLAGARVM vibi-

ces emendantia.

Susnon.

PLAN



# CURATIVVS.

PLANTAE quæ pe-  
rimunt

Diosc. lib. 6. in præfat.

PLEVRETICO-  
rum remedia.

Staphylinus

Laserpitium

Aethiopsis.

PODAGRAE mor-  
bi remedia.

Amomum

Naphtha

Populus nigra

Amurca

Salix

Ficus

Cochleæ terrestres

Mustela

Marinus pulmo

Lac humanum

Adipum medicinae

Sanguis scilicet men-  
struus

Fimum

Hordeum

Lens

Rapa sativa

Brassica sativa

Seris

Cucurbita

Aros

Asphodelus

Bulbus esculentus

Pulegium

Panaces Heracleon

Libanotis

Scordion

Leucoion

Androsaces

Helxine

Papaver sativum

Hyoscyamus

Lens palustris

Aizoon maius

Bryon thalassion

Phycos marinus

Cucumis anguinus

Balanus myrcefica

Ebulus

Heliotropium maius

Vua passa

Acetum Ferrum

Sulphur Sal

Lapis Asius

Lapis gagates

Testa siue terræ forn-  
cum.

POLYPI morbi re-  
media.

Dracunculus maior

Dracunculus minor.

PRESTERIS ser-  
pentis morsus re-  
media.

Omotarichos

Rubus.

PRAEPUTIO-  
rum morbi re-  
media.

Aloe.

PRAECORDIO-  
rum remedia.

Scor



# INDEX

Scordion	Lepus marinus
Vinum thymite	Hedera
Vinum daucite.	Ampelos leuce
PRAECIPIT A-	Dryopteris
tis ex alto vtilia.	Arsenicum.
Iris Illyrica	PSORAE morbi
Vitex	remedia.
Asparagus	Cardamomum
Anisum	Oleum amygdalinum
Cannabis sativa.	Lycium
PROFLUVII ge-	Olea
niturae remedia.	Palma elate
Vide Geniturae proflu-	Ficus
uii in somno.	Erinaceus marinus
PRVRIGINEM	Cicer
facientia.	Lupinum satium
Scolopendra	Batrachion
Ephemeron	Chelidonium minus
Opium.	Origanum
PRVRIGINEM	Pentaphyllon
emendantia.	Staphis agria
Vrina Eruum	Balanus myrepica
Lapathum	Ampelos leuce
Aloe	Vitis sativa
Origanum	Aqua maris Sal.
Pulegium	PSYLLII curatio.
Elelisphacos	Diosc. lib. 6. cap. 10.
Melilotus	PTERYGII morbi
Balanus myrepica	remedia.
Acetum	Acacia
Alumen	Rhus
Sulphur	Malum punicum
Sal.	Myrtus
PSILOTHRVM,	Ficus
siue vnguentum de-	Glycyrrhiza
pilatorium.	Aloe

Pras



# CVRATIVVS.

praſium  
 pentaphyllon  
 Characias  
 Ampelos leuce  
 Zua cœnanthe  
 acetum  
 Alumen  
 Sal  
 Ferri rubigo.  
 PVBERTAS ne  
 erumpat.  
 Hyacinthus.  
 PVL MONIS mor-  
 bi remedia.  
 Puncus odoratus  
 Balsamum  
 Cedria  
 Amygdalus amara  
 Ficus  
 Lac  
 Pulegium  
 Ruta  
 Sagapenum  
 Symphyton  
 Pentaphyllon  
 Chryſocome  
 Vrtica  
 Thapſia  
 Melicratum  
 Vinum hyſſopite  
 Vinum aromatite.  
 PVLICES necantia.  
 Vnguentum telinum  
 Crocinum  
 Butyrum.  
 PVTREDINVM ge

nitalium remedia.

Aspalathus.

PVTREDINES

purgantia.

Irinum

Cinnamomum

Pix

Sal.

QVADRVPED-  
 um ſcabiem  
 emēdantia.

Vide Iumentorum ſca-  
 biem.

QVARTANAE fe-  
 bris remedia.

Vide, Febris quartanæ  
 remedia.

RADICES quæ pe-  
 rimunt.

Dioſc. lib. 6. in præfat.

RAVCEDINIS re-  
 media.

Tragacantha.

REDVVIAS ſa-  
 nantia.

Ferri rubigo.

REFRIGERAN-  
 tes medicinæ.

Vnguentum melinum

Cupreſſus

Rhodiſes

Roſa

Acacia

Ouum

Sonchos

Seris



# INDEX

Lactuca  
 Caros  
 Coriandrum  
 Hieracium maius  
 Polygonum duplex  
 Clymenon  
 Periclymenon  
 Helxine  
 Papauer satium  
 Psyllium  
 Cicuta  
 Lens palustris  
 Aizoon duplex  
 Erigeron  
 Phacos thalassion  
 Potamogeton  
 Cytisus  
 Ebulus  
 Acetum  
 Omphacomeli  
 Pompholyx  
 Plumbum clotum  
 Spuma argenti  
 Cerussa  
 Corallium  
 Terra  
 Lapis samius  
 Terra ampelitis.

## REGII morbi remedia.

Nardi spica  
 Schistos  
 Ceruinum cornu  
 Finum  
 Cicer  
 Lapathum

Atriplex  
 Asparagus  
 Erysimon  
 Scilla  
 Chelidonium  
 Aloe  
 Absynthium  
 Origanum  
 Hippomarathrum  
 Libanotis  
 Sphondylium  
 Laserpitium  
 Prasium  
 Scordion  
 Asplenon  
 Anthemis  
 Paonia  
 Erythrodanum  
 Chamapitys  
 Pentaphyllon  
 Hyacinthus  
 Halicacabus  
 Chamacissos  
 Osyris  
 Myrtus sylvestris  
 Elaterium  
 Vinum chamaedryte  
 Vinum calaminthite  
 Vinum nardite  
 Sulphur.

## RENV M doloris remedia.

Amygdala amara  
 Asparagus  
 Anagallis  
 Agaricus

Anth



# CV RAT I V V S.

Anthyllis	Vua passa
Anchusa	Vinum
Halcyonium	Vinum cydonite
Cardamomum	Vinum holosanthinum
Calamus odoratus	Erinaceus terrestris
Cicer	Cassia Fœniculus
Cinnamomum	Vinum absynthite
Chamæpitys	Vinum nardite
Passum	Vinum aromatite
Glycyrrhiza	Oleum balaninum.
Juncus odoratus	R H A G A D V M
Laurinum	remedia.
Lac	Pix
Lotus sativa	Lycium
Meu	Vitex
Pistacia	Cancr.
Nardus Gallica	R H E V M A T I-
Nuclei pini	simis vtilia.
Oleum amygdalarum	Acetum
Palma elate	Cupressus
Portulaca	Daphnoides
Plantago	Ficus
Porrum	Fæx vini
Petroselinum	Macer
Peucedanum	Oleum olcastri
Pæonia	Ouum
Rhaponticum	Persica
Saccharum	Portulaca
Scandyx	Plantago
Myrrion	Staphis agria
Symphyton	Triticum
Stratiotes aquaticus	Vini qualitas
Tragacantha	Vinum labruscæ
Cordylon	Vinum ex pyris
Urina	Vinum myrtite.
Uetonica	R I C I N O S necantia.



# INDEX

Cedria.	Fimuri
RIGORES seu hor-	Dracunculus maior
rores febrium ex-	Dracunculus minor
curientia.	Asphodelus
Gleucinum	Bulbus esculentus
Piper	Capparis
Panaces heracleon	Rhaponticum
Staphylinus	Gentiana
Vinum cedrite	Aristolochia
Pyrethrum.	Centaureum
RIMARVM sedis	Acantha
remedia.	Leucacantha
Vide, Sedis rimarum.	Abrotonum
ROSIONIS re-	Origanum
media.	Calamintha
Lac schiston.	Serpyllum
Pæonia.	Baccharis
RVCTVM mouëtia.	Panaces heracleon
Mastiche	Libanotis
Rhaphanus	Laserpitium
Anethum	Sagapenum
Smyrnion	Galbanum
Vinum daucite.	Polycnemom
RVPTORVM re-	Clinopodium
media.	Althæa
Acorus	Cestron
Cardamomum	Symphyton
Asarum	Holosteum
Calamus odoratus	Xyris
Helenium	Hippuris
Edellium	Heliochryson
Iuniperus	phlomidis
Cedrides	Ampelos leuce
Halimos	Vinum daucite
Lixiua ex ficu	Vinum tragoriganite
Fel	Vinum panacite
	Lapis



# C V R A T I V V S.

Lapis schistos.	Amylum
<b>S</b> AGITTAS infixas	Portulaca
extrahentia.	Plantago
Vide, Spicula infixa.	Porrum
SALIVAM cuo-	Erysimon
cantia-	Agaricum
Pyrethrum.	Aloc
SALAMANDRAE	Rhaponticum
veneni remedia.	Centaarium
Diosc. lib. 6. cap. 4.	Acantha leuce & Ara-
SANGVINEM ex-	bica
creantibus vtilia.	Ferula
Iuncus odoratus	Althæa
Aspalathus	Cestron
Thus in potu datum	Lysimachia
Lentiscus	Symphytum
Mastiche potu data	Polygonon mas
Naphtha	Symphytum alterum
Cupressus	Clymenon
Macer	Aethiopis
Myrica	Isopyrum
Hypocistis	Adiantum
Rosa	Vitis sativa
Lycium	Vua
Salix	Omphacium
Quercus	Vinum phœnicite
Palma	Corallium
Malum punicum	Lapis hematites
Myrtus	Terra samia.
Cichorium	SANGVINEM si-
Amygdalus amara	stentia.
Ouum	Thus
Cervinum cornu	Cupressus
Fimum	Galla
Coagulum	Persea
Triticum	Cochleæ terrestres



# INDEX

Rana	Gypsum.
Araneus	SANGVINEM com-
Ouum	cretum discutientia.
Coagulum	Lixiua ex ficu
Sanguis	Thymus
Fimum	Heliochryson.
Faba	SANGVINEM per
Plantago	vrinam expellentia.
Porrum	Eruium
Isatis	Cantharides
Elelisphacos	Ammoniacum.
Mentha	SANGVINEM per
Serpyllum	nares expellentia.
Ruta	Crocodilium.
Cyminum satium	SANGVINEM per
Storbe	vrinam reddentium
Ferula	remedia.
Clymenon	Cyminum sylvestre.
Hippuris	SANGVISVGAS
Sideritis achilleos	necantia.
Pentaphyllon	Oxalme
Phoenix herba	Diosc. lib. 6. cap. 32.
Astragalus	SANDARACHAE
Lichen in petris	curatio.
Idæa radix	Diosc. lib. 6. cap. 29.
Gallion	SARDONIAE
Stratiotes terrestis	curatio.
Vua cœnanthe	Diosc. lib. 7. cap. 14.
Acetum	SCABIEM iumento-
Vinum terebinthinum	rum emendantia.
Plumbum elotum	Vide, iumentorum sca-
Stimmi	biem.
Cinnabaris	SCABIEI morbi
Alumen	remedia.
Sulphur	Argemone prima
Spongia	Chamaeleon niger

Hel



# C V R A T I V V S.

Helleborus niger		Sampfuchum
Oesypum	Sal	Hieracium maius
Oleum olcastri		Delphinion
Sinapi		Laserpitium
Sulphur		Atractilis
Vnguentum melinum.		Lychnis vtraque
SCOLOPENDRAE		Millefolium
morsus remedia.		Phalangium
Grosi		Polemonia
Scolopendra		Chamaezyce
Asphodelus		Heliotropium
Sal.		Scorpioides
Diosc. lib. 6. cap. 59.		Aqua maris
SCORPIONIS ictus		Vinū tethalassomenum
remedia.		Vinum cydonite
Cyperus		Sulphur
Amomum		Sal
Cardamomum		Lapis sapphirus.
Cinnamomum		Diosc. lib. 6. cap. 60.
Daphnoides		SCORPIONES ne-
Myrtus		cantia.
Ficus		Cancr.
Cancr		SCORPIONIS ma-
Scorpius terrestris		rini ictus remedia.
Smarides		Vrina
Mullus piscis		Asphodelus
Locustæ		Plumbum syncerum &
Lacerta		crematum
Mures domestici		Sulphur.
Fimum		Diosc. lib. 8. cap. 61.
Lapathum		SCORPIONES tor-
Sonchos		pefacientia.
Seris		Delphinion
Lactuca syluestris		Lychnis syluestris
Ocyinum		Lens palustris.
Abrotonum		SECUNDINAS



# INDEX

trahentia.		media.
Balsamum		Thus
Sampsuchinum		Lentiscus
Abrotonum		Pix
Picea	Schistos	Amurca
Fiber		Malum punicum
Iecur mergi		Myrtus
Linum		Canceri
Aristolochia tertia		Ouum
Thymus		Ocsypum
Pulegium		Adeps
Prasium		Lens
Stachys		Malua
Artemisia		Althæa
Oenanthe		Portulaca
Hemerocallis		Sonchos
Erythrodanum		Anagallis
Anagyris		Melilotus
Myrtus		Lascepitium
Adiantum		Aster Atticus
Ampelos leuce		Viola purpurea
Vinum dictamnite.		Cucumis anguius
SEDIS rimarum		Colocynthis
remedia.		Acetum
Strigmenta balnearum		Oxalme
Meu	Aloe	Vinum terebinthinum
Dipsacos		Flos æris
Leucoion.		Plumbum elotum.
SEDIS inflammatio-		SEMINA quæ
nis remedia.		perimunt.
Oleum cicinum		Diosc. lib. 6. in præfat.
Amaracinum		SENSIBVS nocetia.
Lens	Libanotis	Vinum annosum.
Symphyton		SENSVS recreantia.
Erigeron		Lapis Samius.
SEDIS morbi re-		SE PIS bestiolar mor-
		fus



# CURATIVVS.

ius remedia.	Anchusa
Portulaca	Ocimoides
Oxymel.	Hyacinthus
SERPENTIVMve	Mandragoras
nenis contraria.	Nerion
Paliurus	Adiantum
Vitex	SERPENTES
Cancri	fugantia.
Hippopotamus	Iuniperus
Fiber Mustela	Cornu ceruinum
Gallinaceus	Adeps
Cantharides	Nasturtium
Chondrylla	Dracunculus maior
Nasturtium	Abrotonum
Dracunculus	Origanum
Asphodelus	Calamintha
Rhaponticum	Peucedanum
Aristolochia tertia.	Melanthion
Origanum sylvestre	Galbanum
Baccharis	Polium
Ruta	Oenanthe
Phlomos, siue verba-	Lyfimachia
scum	Aster Atticus
Panaces chironium	Vinum conizite
Staphylinus	Lapis gagates.
Smyrnion	SERPENTIVM
Aparine	morsus remedia.
Chamaedrys	Iris Illyrica
Lychnis sativa, siue co-	Asarum
ronaria	Cinnamomum
Erythrodanum siue Ru-	Balsamum
bia	Pix Naphtha
Sparganion	Iuniperus
Polygonon mas	Platanus
Clematis daphnoides	Erica Glandes
Polemonia	Pistacia



# INDEX

Ficus Aegyptia	Sagapenum
Pastinaca piscis	Prasion
Rana	Phyllitis
Gobius	Trifolium
Fel	Scordion
Omotarichos	Cestron
Fimum	Periclymenos
Marinus pulmo	Echion
Mel	Ocymoides, siue ocy-
Eruum	maltrum
Dictamnus	Rubus
Rhaphanus	Eupatorium
Agaricum	Heliochryson
Brassica sativa	Adiantum
Cyclaminos	Peristercon supinus
Ampeloprason	Ebulus
Dracunculus minor	Ampelos leuce
Asphodelus	Vitis sativa
Anagallis	Vinum
Acantha leuce	Acetum
Abrotonum	Oxymeli
Asclepias	Vinum conizite
Origanum	Vinum panacite
Lilium	sal Cinis vitis
Calamintha	Lapis ophites.
Clinopodium	SERPENTES ne
Serpyllum	feriant.
Leontopetalon	Cervi medulla.
Panaces heracleon &	SERPENTES ne-
asclepion	cantia.
Cyminum sativum &	Anchusa onocheles
sylvestre	Vinum cedrite.
Ammi	SICCANTES me-
Foeniculum	dicina.
Daucus	Ammi
Libanotis	Bromos

Cist



# CVRATIVVS.

Cistos	Glycyrrhiza
Cyminum satium	Symphytum.
Ebulus	SMILACI contraria.
Aes vstum	Vide, Taxo contraria.
Arena litoris	SOMNIFERAE
Libanotis	medicinae.
Mentha	Amygdalæ amaræ
Pompholyx	Halicacabus, siue sola-
Spodium	num vesicarum
Rubus	Anisum
Terra Chia	Amomum
Rubrica sinopis	Cistos tertia, siue lada-
Fæx vini	num
Diphryges.	Baccharis
SINGVLTVM pel-	Dorycnion
lencia.	Hyoscyamus
Fiber	Lactuca
Sisymbrium	Iris Illyrica
Rhaponticum	Opium
Mentha	Mandragoras
Aristolochia tertia	Papauer rhœas, siue fa-
Anethum	tium
Cyminum sylvestre	Porrum
Alysson	Styrax
Asplenon	Smilax hortensis
Clymenon	Strychnon hypnoticon
Saxifragum.	siue solanum somni-
SIRIASIS remedia.	ficum
Cucurbita	Vitex
Pepo	Vinum nouum
Heliotropium maius.	Lapis memphites.
SITIM generantia.	SOMNVN disc-
Cape Allium	trientia.
Capparis	Sphondylium
Vini qualitas.	Peucedanum.
SITIM extinguentia.	SOMNIA imaginosa
	&



# INDEX

& mala inducentia.	Silurus
Faba	Triticum
Lens	Tragion
Pygnoكوم	Xyphion
Smilax leuis.	Xyris
SORDES purgantia.	Lacerta.
Irinum	SPISSANDI vim
Cortex thuris	habentia.
Sabina.	Acacia Malus
SPASTICORVM	Cotonea
remedia.	Malum sylvestre
Fiber.	Amygdalus amara
SPASMI remedia.	Baccharis
Vide, Conuulsionis re-	Britannica
media.	Polygonon mas & fœ-
SPIRITVM, id est,	mina
flatum generantia.	Clymenon
Gentiana.	Medion
SPIRANTIBVS	Rubus
difficulter vtilia.	Helxine
Vide, Orthopnoicis.	Idæa radix
SPIRITVS discurrē	Hippuris
tes coercentia.	Psyllium
Bdellium.	Bryon thalassium
SPIRANTIBVS vi	Potamogeton
tam auferentia.	Acetum
Cedria.	Vinum Hadrianum
SPICVLA infixæ cor	Aerugo aurificum
pore extrahentia.	Vinū nigrum labruscæ
Anagallis	Vinum Tyburtinum
Harundo	Cadmia
Aristolochia	Pompholyx
Dictamnus	Squama æris
Propolis	Pumex
Narcissus	Corallium
Oxyacantha	Rubrica synopsis

Lap



# CURATIVVS.

Lapis hæmatites.	Terebinthina
<b>SPLENETICIS</b>	Cedrides
utilia	Melimela
Vide, Lienis morbi re-	Pruna
media.	Arbutus
<b>SPVMAE</b> argenti	Iuglans
contraria.	Auellana
Vinum in commune.	Ficus
<b>SQVAMAS</b> ossium	Hordeum
extrahentia.	Lens
Aristolochia tertia	Malua
Peucedanum.	Porrum
<b>STAPHYLOMATIS</b>	Brassica fatiua & mari-
remedia.	na
Palma Thebaica	Cape
Lapis schistos	Nasturtium
Lapis sapphiros.	Capparis
<b>STERNVTAMEN-</b>	Absynthium
tum mouentia.	Absynthiū scriphiū
Iris Illyrica	Balanus myrepica
Fiber Sinapi	Vua
Parmice	Thymelæa
Struthion	Ebulus
Batrachion	Prasium
Daphnoides	Galbanum
Helleborus albus.	Aqua maris
<b>STERILES</b> fœmi-	Vinū tethalassomenum
nas facientia.	<b>STOMACHI</b> mor-
Vide, Generationem de	bi remedia.
primentia.	Meu
<b>STIGMATVM</b>	Nardi spica
remedia.	Nardum Gallicum
Batrachion	Malabathrum
Mandragora.	Iuncus odoratus
<b>STOMACHO</b>	Agallochum
contraria.	Helenium

Oleum



# INDEX

Oleum balaninum	Lyncurion
Mastichinum	Saccharon
Vnguentum rosaceum	Faba Aegyptia
Susinum	Sifer
Nuclei pini	Lupinum sativum
Mastiche	Lapathum
Cupressus	Lampfana
Iuniperus	Brassica sativa
Laurus	Portulaca
Populus nigra	Sonchos
Rosa	Seris
Oliuæ colymbades	Cucumis
Palma	Lactuca
Palma clate	Gingidium
Malum punicum	Scandyx
Siliquæ	Aphace
Myrtus	Ampeloprasen
Cotonea	Allium
Mala Epirotica	Zingiber
Armeniaca	Scilla
Mespilus	Lotus
Pruna	Bulbus esculentus
Amygdalæ dulces	Agaricum
Pistacia	Rhaponticum
Iuglans	Gentiana
Morus	Acantha leuce
Persea	Aloe
Ficus Aegyptia	Absynthium
Ionia	Mentha
Cochleæ terrestres	Tragoriganum
Ouum	Pulegium
Lac	Melilotus
Lac humanum	Ligusticum
Caseus	Caros
Lana succida	Anethum
Oryza	Cuminum sylvestre
	Hieracium maius
	Apium

Pet



# CVRATIVVS.

Petroselinum	Vinum rhoite
Smyrnion	Vinum myrtite
Fœniculus	Vinum terebinthinum
Scordion	Vinum phœnicite
Artemisia	Vinum absynthite
Nymphæa	Vinum bunitc.
Cestron	Vinum dictamnite
Polygonon mas	Vinum calaminthite
Rubus	Vinum aromatite
Strychnon satium	Vinum nectarite
Cotyledon prima	Vinum nardite
Erigeron	Vinum ex syluestri nar
Adiantum	do
Aster Atticus	Vinum selenite
Viola purpurea	Ferrum
Thamædaphne	Flos salis
Colocynthis	Fæx vini
Vitis famia	Lapis alabastrites
Nuclei acinorum	Lapis samius.
Vua ænanthe	STRVMAE gut-
Omphacium	turis remedia.
Vini qualitas	Iris Illyrica
Phalernum	Grossi
Hydromel	Vipera
Thymoxalme	Mustela
Omphacomeli	Vnguis asini
Vinum	Finum
Vinum Surrentinum	Hordeum
Vinum omphacite	Lolium
Vinum nigrum ex la-	Fabæ
brusca floribus	Lens
Vinum melitite	Lupinum satium
Vinum scilliticum	Lapathum
Vinum cydonite	Andrachne, siue portu-
Vinum apiite	laca syluestris
Vinum anethinum	Plantago
	Piper

Capp



# INDEX

Capparis  
 Argemone  
 Coriandrum  
 Libanotis  
 Laserpitium  
 Aparine  
 Millefolium  
 Scordion  
 Lithospermon  
 Cotyledon prima  
 Galiopsis  
 Pseudobunion  
 Adiantum  
 Testæ siue terræ fornacum.  
**STRANGVLARUS** remedia.  
 Irinum  
 Absynthium.  
**STRANGVRIAE** morbi remedia.  
 Aspalathus  
 Cedrides  
 Locustæ  
 Asparagus  
 Sifymbrium  
 Medica  
 Panaces heracleon  
 Sefeli Mafsiliense  
 Hippofelinon  
 Hippomarathron  
 Polycnemion  
 Clinopodium  
 Oenanthe  
 Coniza  
 Asplenon

Cæpe  
 Onobrychis  
 Polygonon mas  
 Saxifragon  
 Xyris  
 Laurus Alexandrina  
 Tragion  
 Pseudobunion  
 Adiantum.  
**STYPTICAE** medicina.  
 Vide, Adstrictoriae medicina.  
**SVCGI** qui perimūt.  
 Diosc. lib. 6 in præfat.  
**SVDOREM** deprimentia.  
 Oleum  
 Oleum omphacinum  
 Oleum olcastri  
 Myrteum  
 Lentiscinum  
 Vnguentum melinum  
 Rhodides  
 Myrtus  
 Bulbus esculentus  
 Vinum myrsinite  
 Sulphur  
 Gypsum  
 Terra samia.  
**SVDORES** euocantia.  
 Metopium vnguentum  
 Smyrnion  
 Pyrethrum  
 Onobrychis  
 Flos salis

Anch



# C V R A T I V V S.

nchusa	Narcissus
ycopsis.	Ampelos leuce
S V E S necantia.	Diphryges.
hamæleon albus.	S V S P I R I O S O -
S V F F V S I O N V M	rum remedia.
morbi remedia.	Canthamum
cl Sanguis	Cyphi
agapenum	Oleum amygdalarum
Euphorbium	Pix
hamæfyce	Ficus
larena litoris.	Vulpinus pulmo
V G I L L A T O R V M	Eruum
remedia.	Plantago
acetum Sal.	Agaricum
S V P E R C I L I O -	Rhaponticum
rum raritati vtilia.	Aristolochia tertia
icea.	Hyssopum
S V P E R C I L I I S	Thymus
glabris vtilia.	Acinos
uligo resinæ.	Ruta
S V P P V R A T I O -	Galbanum
nis tuberculorum	Ammoniacum
remedia.	Prasium
crocomagma	Parthenium
alimpissa.	Anagyris
S V P P V R A T I O -	Adiantum Thapsia
num remedia.	Ampelos leuce
icus Aegyptia	Vinum passite
mel Hordecum	Vinum hyssopite.
colium	T A B I D I corporis
cucurbita	remedia.
ligusticum	Vide, Phthisicorum re-
myrnion	media.
Althæa	T A B E S C E N T I -
Mandragoras	bus vtilia.
rtica	Daphnoides

x



# INDEX

Vinum strobilite.

TAXO contraria.

Vinum in commune

Acetum.

Diosc. lib. 6. cap. 12.

TELA infixa corpori-  
bus extrahentia.

Vide, Spicula infixa.

TENASMI mor-  
bi remedia.

Lac schiston

Fœnograecum

Linum

Eruum.

TEREDINEM  
sentientia.

Ficus Aegyptia

Hyoscyamus.

TEREDINEM  
non sentientia.

Tilia.

Hermol. Cor. cap. 137.

TEREDINEM  
necantia.

Sal.

TESTIVM mor-  
bi remedia.

Vitex

Myrtus

Cicer

Faba

Erysimon

Asphodelus

Melilotos

Ruta

Cyminum

Lilium

Hyoscyamus

Erigeron

Vua passa

Geodes lapis

Terra samia

Cimolia.

THAPSIAE

contraria.

Diosc. lib. 6. in prafat.

& cap. 33.

THERIACAM

ingredientia.

Rapa sativa

Zingiber

Dictamnus

Apium.

THERIOMATVM

remedia.

Lupinum sativum

Elelisphacos.

THORACIS reme-  
dia.

Cerebrum gallinacei

Glycyrrhiza.

THYMOS ab-  
sumentia.

Smaris

Fimum

Thymus

Ruta

Heliotropium maius

Vitis sativa

Sal.

TIBIARVM vlce-  
rum remedia.

Hydropiper

Ampelos leuce.

TINEAS latas

pellentes



# CVRATIVVS.

pellentia.	Pix	Cedria
Cardamomum	Lycium	
Costum	Pruna	
Gallicorium	Morus	
Melimela	Ficus	
Iuglans	Hirundines	
Heliotropium minus	Lac schiston	
Vinum absynthite	Mel	Sinapi
Lupinum satium	Aloe	
Rafica fatiua	Origanum	
Portulaca	Britannica	
Chamaeleon albus	Periclymenos	
Hyssopum	Helxine	
Calamintha	Peristercon supinus	
Thymus	Ruta	Omphacium
Coriandrum	Vinum myrsinite	
Melilotum	Flos aris	
Bryon thalassion	Alumen	Sal.
Pteris	TORMINIS remedia.	
Thelypteris	Iris Illyrica	
Vinum cedrite	Acorus	Meu
Chalcanthum	Cardamomum	
Anchusa tertia.	Balsamum	
TINEAS rotun-	Agallochum	
das generantia.	Oleum	
Triticum.	Iuniperus	
TINEAS necantia.	Halimos	
Absynthium seriphion	Iuglans	
Mentha	Ficus	
Heliotropium minus	Fiber	
Cedria	Talus suis	
Aizoon maius.	Triticum	
TINEIS contraria.	Milium	
Citria.	Panicum	
TONSILLARVM	Eruum	
morbi remedia.	Atriplex	



# INDEX

Sisymbrium		corum remedia.
Piper	Scilla	TORPORIS remedia.
Agaricum		Fagus.
Rhaponticum		TORSIOMIS
Centaurium maius		remedia.
Eryngion		Tragoriganum.
Calamintha		TOXICO contraria.
Serpyllum		Glandes
Sampsuchus	Ruta	Sanguis.
Panaces heracleon		TREMOREM
Acetum		excitientia.
Cyminum satium		Vnguentum cinnamominum.
Scfeli Mafsiliense		TREMORIS remedia.
Cyminum fylueftre		Lepus terreftreis.
Elaphobofcon		TVERCVLORum fuppuratio.
Petroselinum		nis remedia.
Daucus		Strigmēta gymnaftorū
Libanotis		Morus Cape
Ferula		Asphodelus
Peucedanum		Panaces Afclepion
Afclepias		Laferpitium
Meliffophyllon		Viscum Thapfia
Phalangion		Mandragoras
Coniza		Ephemeron
Alifina		Cucumis anguinus
Chamæpitys		Vrtica
Gramen		Aerugo aurificum
Pfeudobunion		Lapis Afius
Chamædaphne		Terra cimolia.
Vinum fcillite		TVERA extenuantia.
Vinum cedrite		Triticum
Vinum hyffopite		Leontopodium
Vinum tragoriganite		
Vinum panacite		
Aphronitrum		
Et in verbo, Dyfenteri		

Scam



# CURATIVVS.

Cammonia	Sesamoides
Vinum nigrum & labru	Ephemeron
sca.	Phlomidis
TV MORVM	Cucumis anguinus
remedia.	Thapsia
Anagyris	Chamaesyce
Platanus	Pygnoconomum
Fagus	Aqua maris
Flex	Adeps
Hordeum	Faba
Grassica sativa & syluc-	Fax vini Spongia.
stris	TVSSIS remedia.
Cucurbita	Amygdala amara
Nasturtium	Asphodelus
Hydropiper	Apium sativum
Bulbus esculentus	Bdellium
fatis	Bromos
Chamaeleon	Cinnamomum
Tragoriganum	Calamus odoratus
Gampfuchum	Cupressus
Ligusticum	Cedrides
Daucus	Cistos
Libanotis	Chamaedrys
Melanthion	Tragacantha
Orchis serapias	Dracunculus
Orminum	Faba
Buphthalmus	Hippuris
Cannabis syluatica	Hyoicyamus
Polygonon mas	Iris Illyrica
Lagopus	Lycium
Helxine	Lasertitium
Pentaphyllum	Mel
Peristereon supinus	Melicratum
Hyoicyamus	Origanum
Psyllium	Paliurus
Xanthium	Peucedanum
	Prasium
	Papauer sativum

X 3



# INDEX

Ruta	Styrax	Myrrha	
Struthion		Lacerta	Linum
Smyrnion		Porrum	Cape
Sulphur		Bulbus esculentus	
Triticum		Pulegium	
Tragoriganum		Balanus myrepica	
Terebinthina		Cici	Sory.
Vua passa.		Ampelos leuce.	
TVSSIS veteris		VARICES sanantia.	
remedia.		Cirsion.	
Afarum		VENEFICIIS	
Myrrha		medetur	
Nuclei pini		Scilla.	
Mastiche		VENEREM cum vo	
Naphtha		luptate expedientia.	
Cerasia		Laurus Alexandrina.	
Amygdala amara		VENEREM co-	
Anellana		hibentia.	
Allium		Portulaca	
Ficus	Propolis	Lactuca	
Rhaphanus		Lactuca sylvestris.	
Scilla	Hyssopus	VENEREM sti-	
Centaurium maius		mulantia.	
Baccharis		Costum	Crocum
Seseli Malsiliense		Mastiche	
Daucus		Linum	
Sagapenon	Galbanū	Rapa sativa	
Scordion		Sifer	Eruca
Bechion		Porrum	Cape
Helxine		Nasturtium	
Phlomides		Dracunculus maior	
Acetum		Dracunculus minor	
Vinum hyssopite		Bulbus esculentus	
Sandaracha.		Mentha	
VAROS purgantia.		Staphylinus	
Oleum balaninum.		Anisum	Orchis
			Orc



# CURATIVVS.

Orchis ferapias	Oleum	Pix
Satyrion	Paliurus	Lycium
Satyrion alterum	Olca Aethiopica	
Orminum	Iuglans	
Xiphium	Lixiuia ex ficu	
Vrtica	Lepus terrestris	
Galiopsis.	Fiber	Eutyrum
VENENATA	Sanguis	Vrina
fugantia.	Rapa fatiua	
Vitex	Malua	
Dictamnus.	Erysimon	
VENAS excitantia.	Agaricum	
Vinum Phalernum.	Aristolochia secunda	
VENTRIS anima-	Abrotonum	
lia expellentia.	Ruta	Apium
Vide, Tineas latas.	Lascepitium	
VENTREM soluentia.	Leucas	
Vide, Aluum soluentia.	Polium	Cestron
VENENATORVM	Pentaphyllum	
ictus remedia.	Colchicon	
Cardamomum	Epipactis	
Nardum gallicum	Passum	
Helenium	Linum gypsatum	
Cinnamomum	Rubrica lemnia	
Bdellium	Terra samia.	
Ficus	VERMIBVS	
Propolis	contraria.	
Rhaphanus	Cedria.	
Triticum	VERRVCAS	
Eryngium	tollentia.	
Cyminum syluestre	Batrachion	
Althæa	Clinopodion	
Tribulus	Characias	
Praſium	Chamaesyce	Dipsacos
Smilax aspera	Ficus	Groſſi
Aqua maris	Cicer	Lacerta
Acetum.		
VENENORVM		
remedia.		
Cinnamomum		



# INDEX

Heliotropium		Ceruinum cornu	
Finum		Saccharum	
Staphis agria		Gramen	Malua
Scilla	Thymus.	Hippuris	
VERTIGINIS mor		Portulaca	
bi remedia.		Lotus syluestris	
Balsamum		Plantago	Vua passa
Lac humanum		Cucumis	
Peucedanum		Scandyx	Passum
Galbanum		Ochra	Porrum
Ampelos leuce		Bulbus vomitiuus	
Ampelos melana		Rhaponticum	
Acetum scilliticum		Glycyrrhiza	
Vinum scilliticum.		Tragacantha	
VERTIGINEM		Panaces heracleon	
adgenerantia.		Petroselinum	
Cardamonum		Smyrnion	
Balsamum		Peucedanum	
Hyoscyamus		Fœniculus	
Mandragoras		Nymphæa	
Falernum		Anthemis	Pæonia
Vinum rhetinte		Phalaris	
Mandragorite		Cape	
Aconitum	Cicuta.	Halcyonium	
VESICAE morbi		Cestron	
remedia.		Vinum terebinthinum	
Meu		Vinum scilliticum	
Nardum Gallicum		Vinum aromatite	
Nuclei pini		Vinum halosanthite	
Cupressus		Lapis morochthus.	
Laurus	Palma	VESPARVM ictus	
Palma etate		remedia.	
Myrtus	Lac	Laurus	Malua
Ficus	Ouum	Sisymbrium.	
Cochleæ terrestres		VESTIBVS ne ani-	
Cicadæ	Napum	malia noccant.	
		Abfyn	



# C V R A T I V V S.

Abſynthium

Heliocaryſos.

VIBICES plagarum  
emendantia.

Suſinum.

VIPERAE morſus  
remedia.

Cafia

Coſtum

Iuniperus

Macer

Fraxinus

Vrina

Caries lignorum

Triticum

Eruum

Ferula

Anchuſa

Onocheles

Ocimoides

Dioſc.lib.6.cap.63.

Herm.Cor.cap.721.

VIRIVM infirmi-  
tates roborantia.

Nuclei pini.

VISCO contraria.

Vinum in comuni

Acetum

Vinum abſynthite

Dioſc.lib.6.cap.21.

VISCERVUM mor-  
bi remedia.

Thus.

VITILIGINIS  
remedia.

Daphnoides

Myrtus

Ficus

Groſſi

Cochleæ terreſtres

Lepus terreſtris

Sepiæ

Faba

Beta

Lupinum ſatium

Chondrylla

Cæpa

Allium

Piper

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Aſphodelus

Capparis

Argemone

Gentiana

Telephion

Ruta

Chamaeleon niger

Libanotis

Lilium

Nymphæa

Cicuta

Erythrodanum

Helleborum nigrum

Cucumis anguinus

Balanus myrepſica

Narciſſus

Sulphur

Halcyonium

Terra melia.

VITRA fracta con-  
glutinantia.

Herm.Cor.cap.254.

VMBILICI re-  
media.

Lapis magnes.

VNGVIBVS vitilia.

Pix

Cupreſſus

Daphnoides

Olca

Oryza

Linum

Lapathum

Bulbus eſculentus

Batrachion

X 5



# INDEX

Chelidonium minus	Aes ystum
Viscum	Chrysocolle
Sandaracha	Rubrica leninia.
Alumen	VOMITIONES co
Sulphur	hibentia.
Fæx vini.	Arriplex
VOC E M claram red-	Apium
dentia.	Mentha
Myrrha	Eupatorium.
Styrax	VOMICA E morbi
Silurus.	remedia.
VOLVPTATES	Paliurus
animi augeſcentia.	Thlaſpi
Bugloſſum.	Struthion
VOLVCRVM mor	Eryngion
ſus remedia.	Bechion
Iecur aprinum.	Pſyllion
VOMITIONES	Mandragora
mouentia.	Acetum.
Irinum	VRENDI vim ha-
Laurus	bentia.
Cochleæ terreſtres	Miſy
Omotarichos	Melanteria.
Blattæ	VREDINE M fa-
Peſo	cientia.
Aſphodelus	Trifolium.
Capparis	VRINAE difficul-
Bulbus vomitorius	tem generantia.
Origanum	Dioſc. lib. 6. in præſat.
Ceſtrum	VRINAE harenosæ
Anagyris ſemen	& aſperæ remedia.
Papauer ſpumcum	Papauer ceratitis.
Mandragoras	VRINA M cruentam
Daphnoides	mouentia.
Helleborus albus	Clymenon.
Elaterion	VRINA M arceſ-
Silybon	ſcentia.
Balanus myrepſica	Eruum
Narciſſus	Galbanum.
Cici	VRINA M mo-
Melicratum	uentia.
	Acor



# CVRATIVVS.

Acorus	Meu	Erinaceus marinus
Cyperus		Cimices lecti
Cardamomum		Oues Buprestis
Nardi spica		Vermes terreni
Nardum Gallicum		Mel Hordeum
Afarum	Phu	Zythum
Malabathron		Milium
Casia		Panicum
Cinnamomum		Cicer Eruum
Costum		Rapa sativa
Juncus odoratus		Rhaphanus
Calamus odoratus		Rhaphanus agria
Balsamum		Sifer Bunion
Crocum		Brassica sativa
Crocomagma		Asparagus
Helenium		Sisymbrium aquaticum
Oleum amygdalinum		Crithmon
Vnguentum melinum		Cucumis Pepo
Susinum		Lactuca
Irinum		Gingidium
Amaracinum		Caucalis Eruca
Bdellium		Ocymum
Picea	Nuclei pini	Smilax hortensis
Lentiscus	Resina	Porrum
Terebinthus		Ampeloprasum
Cupressus		Capa Allium
Juniperus		Piper
Populus alba		Struthion
Paliurus	Tilia	Draunculus
Olea Aethiopica		Asphodelus
Glandes	Myrtus	Scilla Capparis
Palma elate		Agaricum
Siliqua	Cotonea	Crocodilion
Mala Epirotica		Centaurium maius
Cornus		Chamaeleon albus
Amygdala dulces		Acantha leuca
		Acanth



# INDEX

Acantha	Anonis	Saxifragon	
Eryngion		Xyris	Gramen
Absynthium		Gramen parnasium	
Abrotonum		Phoenix herba	
Tragoriganum		Hippuris	
Elelisphacos		Oxyscœnos	
Thymus		Heliochrysos	
Serpyllum		Astragalus	
Baccharis		Hyacinthus	
Ruta	Moly	Papauer rhœas	
Ligusticum		Strychnon hypnoticon	
Staphylinus		Cotyledon prima	
Tordylon		Vrtica	Arction
Sisum	Anisum	Vinum Lesbion	
Caros	Anethum	Hydromel	
Cyminum syluestre		Melicratum	
Opium		Vinum rhetinite	
Orcoselinum		Vinum catorchite	
Petroselinum		Vinum è cedro	
Daucus	Libanotis	Vinum è lauro	
Melanthion		Vinum absynthite	
Ammoniacum		Vinum calaminthite	
Chamædrys		Vinum aromatite	
Trifolium	Scordion	Vinum nectarite	
Androsaces		Vinum nardite	
Anthyllis		Vinum asarite	
Anthemis		Vinum syluestris nardi	
Lithosperma		Vinum daucite	
Erythrodanum		Vinum acorite	
Lonchitis	Althæa	Halcyonium	
Hypericon		Lapis hæmatites	
Choris		Lapis Iudaicus	
Chamæpitys		Corallium	
Cestron		Vinum chamæpyteos.	
Polygonon mas		VRTICAE herbæ	
Polemonia		pruritus remedia.	
		Herm	



# C V R A T I V V S.

Herm. Cor. cap. 707		Oenanthe
VSTIS vtilia.		Ficus Aegyptia
Vrtica siue acalyphe.		Fimum
V V AE faucium		Gentiana
remedia.		Glycyrrhiza
Pix	Galla	Glutinum
Pruna		Hippuris
Hirundines		Ifatis
Vrtica		Lana succida
Omphacium		Ligusticum
Acetum		Lilium
Flos æris		Lyfimachion
Alumen	Sal.	Minium sinopicum
VVL P E S necantia.		Myriophyllon
Apocynon.		Picca
VVL N E R V M re-		Palma
media.		Portulaca
Amurca		Porrum
Allium		Polycnemion
Argemone		Polium
Aristolochia		Polygonon mas
Aloe	Anthyllis	Polygonatum
Althæa		Pentaphyllum
Androsamon		Phœnix herba
Lycopsis	Acetum	Pteris
Butyrum		Peristereon
Brassica		Papauer
Coccus		Plumbum clotum
Chamæpitys		Scordion
Centaurion		Symphyton
Cyclaminos		Sideritis
Cytinus		Stratiotes aquaticus
Cupressus		Spongia
Dracunculus		Cochleæ terrestres
Dictamnus		Thus
Aerugo aurificum		Terra eretria

Vin



# INDEX

Vinum	Iuniperus
Vinum œnanthe	Laurus
Vnguentum citrinum	Myrica
Vlnus	Cistos
Vitex.	Rosa
VVLVAE mulic- ris remedia.	Lycium
	Acacia
Men	Amurca
Cyperus	Vitex
Nardi spica	Galla
Casia	Palma clate
Costum	Myrtus
Iuncus odoratus	Cotonea
Balsamum	Iuglans
Bryon	Cimices le&i.
Narcaphthum	Lac schiston
Oleum amygdalinum	Butyrum
Maltichinum	Oesypum
Vnguentum rosaceum	Coagulum
Melinum	Adeps
Sampfuchinum	Fœnograecum
Abrotoninum	Pinum
Susinum	Malua
Narcissinum	Portulaca
Crocinum	Plantago
Irinum	Sonchos
Gleucinum	Porrum
Amaracinum	Sinapi
Metopium	Piper
Cinnamomum	Agaricum
Myrrha	Rhaponticum
Styrax	Pulegium
Bdellium	Centaurium maius
Lentiscus	Melilotus
Pix	Ruta
Naphtha	Panaces heracleon

Am



# CVRATIVVS.

Ammi	Ageraton
Sphondylion	Vinum terebinthinum
Prucedanum	Vinum cedrite
Sagapenum	Vinum picatum, siue
Galbanum	pissite
Asclepias	Vinum chaniædryce
Lilium	Vinum daucite
Circæa	Vinum helleborite
Artemisia	Lapis gagates
Geranion	Peristercon rectus
Anthyllis	Hyoscyamus
Parthenion	Mandragoras
Præonia	Ebulus
Cestron	Ampelos leuce
Clematis daphnoides	Acetum
Chrysocome	Acetum scilliticum

INDICIS CVRATIVI  
FINIS.



Lugduni,  
*Excudebat Ioannes*  
*Frellonius,*  

---

1547.



